

التحضير الجيد للبكالوريا 2017 في مادة الرياضيات

الموضوع رقم (01)

التمرين الأول: (05 نقاط) مشاهدة التصحيح

المستوي المركب منسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس المباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) .

نعتبر العدد المركب a حيث $a = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + i \frac{\sqrt{3}-1}{4}$ والنقطة A_0 ذات اللاحقة $z_0 = 6+6i$.
من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n نعتبر النقطة A_n ذات اللاحقة z_n حيث: $z_n = a^n z_0$.
(1) أكتب كلا من z_1 و a^2 على الشكل الجبري.

(2) أكتب z_1 على الشكل الأسّي ثم بين أن: $a^2 = \frac{1}{2} e^{i\frac{\pi}{6}}$.

(3) عبر عن z_2 و z_3 بدلالة z_1 و a^2 ثم إستنتج الشكل الأسّي لكل من z_2 و z_3 .

(4) أرسم النقط A_0, A_1, A_2, A_3 و A_4 صور الأعداد z_0, z_1, z_2, z_3 و z_4 على الترتيب.

(II) من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $|z_n| = r_n$

(1) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $r_n = 12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1}$.

(2) إستنتج أن المتتالية $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(3) عين نهاية المتتالية $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ثم فسر النتيجة هندسيا.

التمرين الثاني: (04 نقاط) مشاهدة الحل

(a_n) و (b_n) متتاليتان عدديتان معرفتان أجل كل عدد طبيعي n :

$$a_{n+1} = 2a_n - 1 \text{ و } a_0 = 3 \quad b_{n+1} = 2b_n + 3 \text{ و } b_0 = 1$$

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $a_n = 2^{n+1} + 1$.

(2) هل العددين a_n و a_{n+1} أوليان فيما بينها؟

(3) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 5 ثم استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 2017^{1438} على العدد 5.

(4) أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $2a_n - b_n = 5$.

ب) استنتج عبارة b_n بدلالة n .

ج) عين القيم الممكنة لـ $PGCD(a_n; b_n)$.

د) عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $PGCD(a_n; b_n) = 5$.

موقع

الدراسة الجزائرية
eddirasa.com



التمرين الثالث: (04 نقاط) مشاهدة الحل

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ و $\alpha \in]0, \pi[$ عدد حقيقي حيث
نعتبر (S_α) مجموعة النقط $M(x, y, z)$ من الفضاء حيث :

$$OM^2 - 2 \cos(\alpha) [\overline{OM} \cdot (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})] + 3 - 4 \sin^2(\alpha) = 0$$

(1) أ) عين معادلة ديكرتية للمجموعة (S_α) .

(ب) بين أن المجموعة (S_α) هي سطح كرة يطلب تعيين مركزها I_α ونصف قطرها R_α .

(ج) استنتج مجموعة النقط I_α عندما يمسح العدد الحقيقي α المجال $]0, \pi[$.

(2) أ) عين سطوح الكرات (S_α) التي تمر من المبدأ.

(ب) بين أن المبدأ هو منتصف القطعة $[I_{\pi-\alpha}, I_\alpha]$ ، ماذا تستنتج بالنسبة إلى سطحي الكرتين (S_α) و $(S_{\pi-\alpha})$ ؟

(3) ليكن (P) المستوي ذي المعادلة الديكرتية : $x + y + z = 0$.

أ) عين إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة I_α على المستوي (P) .

(ب) أدرس تقاطع سطح الكرة (S_α) والمستوي (P) .

التمرين الرابع: (07 نقاط) مشاهدة الحل

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $D_f =]0; e[\cup]e; +\infty[$ بما يلي : $f(x) = \frac{1}{x(1-\ln x)}$

نسمي (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) . (الوحدة 2cm)

I. (1) أحسب $\lim_{x \rightarrow e^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow e^+} f(x)$ ثم فسر هندسيا النتيجة.

(2) أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

(3) بين أن : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ثم فسر هندسيا النتيجة .

(4) بين أنه من أجل $x \in D_f$ لدينا : $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2(1-\ln x)^2}$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول


تغيراتها.

II. نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال

$$g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x) :]0; +\infty[$$

وليكن (C_g) المنحني الممثل لها كما في الشكل الموالي .

(1) أ) حدد بيانيا حلول المعادلة $g(x) = 0$.



ب) يعطى جدول القيم التالي :

x	2.1	2.2	2.3	2.4
$g(x)$	-0.14	-0.02	0.12	0.28

بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما 1 والآخر α حيث $2.2 < \alpha < 2.3$.

أ) تحقق أنه من أجل $x \in D_f$:

$$f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)}$$

ب) أدرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

2) أرسم (Δ) و (C_f) .

III. أ) بين أن : $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx = \ln 2$ (لاحظ أن $\frac{1}{x(1 - \ln x)} = \frac{\frac{1}{x}}{1 - \ln x}$)

ب) أحسب بـ cm^2 المساحة A للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) والمستقيم (Δ)

والمستقيمين الذين معادلتيهما: $x = 1$ و $x = \sqrt{e}$.

👏 بالتوفيق 😊 والنجاح 🎉 في البكالوريا 😊 2017 🌸 🌸



موقع

الدراسة الجزائري
eddirasa.com



تصحيح التمرين الأول : الرجوع إلى نص التمرين

لدينا : $z_0 = 6 + 6i$ و $z_n = a^n z_0$ ، $a = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + i \frac{\sqrt{3}-1}{4}$

(I) كتابة كلا من z_1 و a^2 على الشكل الجبري :

لدينا :

$$z_1 = a \times z_0 = \left(\frac{\sqrt{3}+1}{4} + i \frac{\sqrt{3}-1}{4} \right) \times (6+6i) = \frac{6\sqrt{3}+6}{4} + i \frac{6\sqrt{3}-6}{4} + i \frac{6\sqrt{3}+6}{4} - \frac{6\sqrt{3}-6}{4}$$

$$z_1 = 3+3i\sqrt{3} \quad \text{إذن} \quad z_1 = \frac{6\sqrt{3}+6-6\sqrt{3}+6}{4} + i \frac{6\sqrt{3}-6+6\sqrt{3}+6}{4} = 3+3i\sqrt{3}$$

$$a^2 = \left(\frac{\sqrt{3}+1}{4} + i \frac{\sqrt{3}-1}{4} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}+1}{4} \right)^2 + 2i \times \left(\frac{\sqrt{3}+1}{4} \right) \left(\frac{\sqrt{3}-1}{4} \right) + i^2 \times \left(\frac{\sqrt{3}-1}{4} \right)^2$$

$$a^2 = \frac{3+1+2\sqrt{3}}{16} + 2i \times \left(\frac{3-1}{16} \right) - \frac{3+1-2\sqrt{3}}{16} = \frac{4\sqrt{3}}{16} + \frac{4}{16}i$$

$$a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}i$$

(2) كتابة z_1 على الشكل الأسّي :

لدينا : $z_1 = 3+3i\sqrt{3}$

حساب الطويلة : $|z_1| = |3+3i\sqrt{3}| = \sqrt{3^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{36} = 6$

تعيين عمدة للعدد z_1 :

$$\theta_1 = \frac{\pi}{3} [2\pi] \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} \cos \theta_1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\ \sin \theta_1 = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \text{نضع} \quad \arg(z_1) = \theta_1 \quad \text{إذن}$$

الشكل الأسّي للعدد z_1 هو $z_1 = 6e^{i\frac{\pi}{3}}$

تبيان أن : $a^2 = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}$

لدينا : $a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}i = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \times \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

ومنه $a^2 = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}$

(3) التعبير عن z_2 و z_3 بدلالة z_1 و a^2 :

لدينا : $z_2 = a^2 \times z_1$ و $z_3 = a^3 \times z_0 = a^2 \times a z_0 = a^2 z_1$

إستنتاج الشكل الأسّي لكل من z_2 و z_3 :


لدينا : $z_2 = a^2 z_1 = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{6}} \times 6e^{i\frac{\pi}{3}} = 3e^{i\frac{\pi}{2}}$

موقع

الدراسة الجزائري
eddirasa.com



$$z_7 = (a^2)^3 \times z_1 = \left(\frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right)^3 \times 6e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{8}e^{i\frac{\pi}{2}} \times 6e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{3}{4}e^{i\frac{5\pi}{6}}$$



(II) من أجل كل عدد طبيعي n نضع $|z_n| = r_n$

(1) تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $r_n = 12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}$

لدينا : $r_n = |z_n| = |a^n z_0| = |a^n| \times |z_0| = |a|^n \times |z_0|$

أي $r_n = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \times 6\sqrt{2} = 12 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}$

ومنه $r_n = 12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}$

(2) إستنتاج أن المتتالية $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية :

لدينا : $q = \frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+2}}{12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = q$ ومنه المتتالية $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية أساسها $q = \frac{\sqrt{2}}{2}$

وحدها الأول $r_0 = 12 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$

(3) تعيين نهاية المتتالية $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

لأن $-1 < q < 1$ أي $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = 0$ أي $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(12 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}\right) = 0$

التفسير الهندسي للنتيجة :

النقطة A_n تقترب من المبدأ O عندما n يؤول إلى $+\infty$.

موقع

الدراسة الجزائري
eddirasa.com



تصحيح التمرين الثاني : (04 نقاط) الرجوع إلى نص التمرين

أجل كل عدد طبيعي n لدينا :

$$a_{n+1} = 2a_n - 1 \text{ و } a_0 = 3 \quad \text{و} \quad b_{n+1} = 2b_n + 3 \text{ و } b_0 = 1$$

(1) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $a_n = 2^{n+1} + 1$

نسمي $P(n)$ هذه الخاصية .

(أ) من أجل $n=0$ لدينا : $a_0 = 3$ و $a_0 = 2^{0+1} + 1 = 3$ ومنه $P(0)$ صحيحة .

(ب) نفرض صحة $P(n)$ أي نفرض أن : $a_n = 2^{n+1} + 1$ ونبرهن على صحة $P(n+1)$ أي نبرهن أن

$$a_{n+1} = 2^{n+2} + 1$$

$$\text{لدينا : } a_{n+1} = 2a_n - 1 = 2 \times 2^{n+1} + 1 = 2^{n+2} + 1 \text{ ومنه } P(n+1)$$

(ج) حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $P(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n .

(2) دراسة أولية العددين a_n و a_{n+1} فيما بينهما :

$$\text{لدينا : } a_{n+1} = 2a_n - 1 \text{ ومنه } -a_{n+1} + 2a_n = 1$$

إذن يوجد عدداً صحيحان $(\alpha; \beta) = (-1; 2)$ بحيث $\alpha a_{n+1} + \beta a_n = 1$ حسب مبرهنة بيزو فإن : a_n و

a_{n+1} أوليان فيما بينهما.

(3) دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بقاى القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 5 :

لدينا :

$$2^0 = 1[5] \quad 2^1 = 2[5] \quad 2^2 = 4[5] \quad 2^3 = 3[5] \quad 2^4 = 1[5]$$

بقاى القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 5 تشكل متتالية دورية دورها $p=4$.

من أجل كل عدد طبيعي k لدينا :

n	$n=4k$	$n=4k+1$	$n=4k+2$	$n=4k+3$
$2^n = \dots[5]$	1	2	4	3

إستنتاج بقاى القسمة الإقليدية للعدد 2017^{1438} على العدد 5 :

$$\text{لدينا : } 2017^{1438} = 2^{1438}[5]$$

$$\text{أي } 2017^{1438} = 2^{4 \times 359 + 2}[5] \text{ ومنه } 2017^{1438} = 4[5]$$

إذن بقاى القسمة الإقليدية للعدد 2017^{1438} على 5 هو 4

(4) (أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $2a_n - b_n = 5$

نسمي $P(n)$ هذه الخاصية .

1. من أجل $n=0$ لدينا : $2a_0 - b_0 = 2 \times 3 - 1 = 5$ أي $P(n)$ صحيحة من أجل $n=0$

موقع

الدراسة الجزائرية
eddirasa.com



2. نفرض صحة $P(n)$ أي نفرض أن: $2a_n - b_n = 5$ ونبرهن على صحة $P(n+1)$ أي نبرهن أن:

$$2a_{n+1} - b_{n+1} = 5$$

$$\text{لدينا: } 2a_{n+1} - b_{n+1} = 2(2a_n - 1) - (2b_n + 3) = 4a_n - 2 - 2b_n - 3 = 4a_n - 2 - 2b_n - 3$$

ومنه $2a_{n+1} - b_{n+1} = 2(2a_n - b_n) - 5 = 2 \times 5 - 5 = 5$ أي $2a_{n+1} - b_{n+1} = 5$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة.

3. حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

أي من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $2a_n - b_n = 5$

(ب) استنتاج عبارة b_n بدلالة n :

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $2a_n - b_n = 5$ ومنه

$$b_n = 2a_n - 5 = 2(2^{n+1} + 1) - 5 = 2 \times 2^{n+1} + 2 - 5 = 2^{n+2} - 3$$

$$\text{أي } b_n = 2^{n+2} - 3$$

(ج) تعيين القيم الممكنة لـ $\text{PGCD}(a_n; b_n)$:

$$\text{ليكن } d = \text{PGCD}(a_n; b_n)$$

إذن $\begin{cases} d/a_n \\ d/b_n \end{cases}$ ومنه $d/(2a_n - b_n)$ أي $d/5$ وبالتالي $d \in \{1; 5\}$.

(د) تعيين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $\text{PGCD}(a_n; b_n) = 5$:

$$\text{يعني } \text{PGCD}(a_n; b_n) = 5 \text{ أي } \begin{cases} a_n = 0[5] \\ b_n = 0[5] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} a_n = 0[5] \\ 2a_n - 5 = 0[5] \end{cases}$$

$$\text{وبالتالي } a_n = 0[5]$$

$$2 \times 2^n = -1[5] \text{ ومنه } 2^{n+1} + 1 = 0[5] \text{ يعني } a_n = 0[5]$$

$$\text{أي } 2^n = 2[5] \text{ ومنه } 2 \times 2^n = 4[5]$$

$$\text{وبالتالي: } n = 4k + 1 \quad (k \in \mathbb{N})$$

👉 **تصحيح التمرين الثالث: الرجوع إلى نص التمرين**

$$\text{لدينا: } (S_\alpha): OM^2 - 2 \cos(\alpha) [\overline{OM} \cdot (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})] + 3 - 4 \sin^2(\alpha) = 0$$

(1) تعيين معادلة ديكارتية للمجموعة (S_α) :

$$\text{لدينا: } \overline{OM} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ و } \vec{k} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{وبالتالي: } OM^2 = x^2 + y^2 + z^2 \text{ و } \overline{OM} \cdot (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = \overline{OM} \cdot \vec{i} + \overline{OM} \cdot \vec{j} + \overline{OM} \cdot \vec{k} = x + y + z$$

$$\text{أي لدينا: } x^2 + y^2 + z^2 - 2 \cos(\alpha)(x + y + z) + 3 - 4 \sin^2(\alpha) = 0$$

ومنه : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x\cos(\alpha) - 2y\cos(\alpha) - 2z\cos(\alpha) + 3 - 4\sin^2(\alpha) = 0$ أي

$$(x - \cos(\alpha))^2 - \cos^2(\alpha) + (y - \cos(\alpha))^2 - \cos^2(\alpha) + (z - \cos(\alpha))^2 - \cos^2(\alpha) + 3 - 4\sin^2(\alpha) = 0$$

ومنه : $(x - \cos(\alpha))^2 + (y - \cos(\alpha))^2 + (z - \cos(\alpha))^2 - 3\cos^2(\alpha) + 3 - 4\sin^2(\alpha) = 0$

وبالتالي : $(x - \cos(\alpha))^2 + (y - \cos(\alpha))^2 + (z - \cos(\alpha))^2 - 3(1 - \sin^2(\alpha)) + 3 - 4\sin^2(\alpha) = 0$

أي $(x - \cos(\alpha))^2 + (y - \cos(\alpha))^2 + (z - \cos(\alpha))^2 - 3 + 3\sin^2(\alpha) + 3 - 4\sin^2(\alpha) = 0$

ومنه $(x - \cos(\alpha))^2 + (y - \cos(\alpha))^2 + (z - \cos(\alpha))^2 - \sin^2(\alpha) = 0$ معادلة للمجموعة (S_α)

ب) تبيان أن المجموعة (S_α) هي سطح كرة :

لدينا : $(x - \cos(\alpha))^2 + (y - \cos(\alpha))^2 + (z - \cos(\alpha))^2 - \sin^2(\alpha) = 0$

ومنه : $(x - \cos(\alpha))^2 + (y - \cos(\alpha))^2 + (z - \cos(\alpha))^2 = \sin^2(\alpha)$

ومما أنه من أجل $\alpha \in]0; \pi[$ فإن $\sin(\alpha) > 0$

فإن (S_α) سطح كرة مركزها $I_\alpha(\cos(\alpha); \cos(\alpha); \cos(\alpha))$ ونصف قطرها $R_\alpha = \sin(\alpha)$.

1) استنتاج مجموعة النقط I_α عندما يسمح العدد الحقيقي α المجال $]0; \pi[$:

لدينا : $I_\alpha(\cos(\alpha); \cos(\alpha); \cos(\alpha))$

$$\begin{cases} x = \cos(\alpha) \\ y = \cos(\alpha) \\ z = \cos(\alpha) \end{cases} \text{ : ومنه}$$

نضع : $\cos(\alpha) = t$ ومنه $\begin{cases} x = t \\ y = t; (t \in]-1; 1[) \\ z = t \end{cases}$ لأنه من أجل $\alpha \in]0; \pi[$ فإن

$$\cos(\alpha) \in]-1; 1[$$

وبالتالي مجموعة النقط I_α عندما يسمح العدد الحقيقي α المجال $]0; \pi[$ هي القطعة المستقيمة المفتوحة AB حيث

$$B(1; 1; 1) \text{ و } A(-1; -1; -1)$$

2) 1) تعيين سطوح الكرات (S_α) التي تمر من المبدأ O :

$(0 - \cos(\alpha))^2 + (0 - \cos(\alpha))^2 + (0 - \cos(\alpha))^2 - \sin^2(\alpha) = 0$ يعني $O \in (S_\alpha)$


أي $3\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 0$ ومنه $3\cos^2(\alpha) - (1 - \cos^2(\alpha)) = 0$

وبالتالي : $3\cos^2(\alpha) - 1 + \cos^2(\alpha) = 0$

ومنه : $4\cos^2(\alpha) - 1 = 0$ أي $\cos^2(\alpha) = \frac{1}{4}$

موقع

الدراسة الجزائرية
eddirasa.com



وبالتالي إما $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$ أو $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$

ومنه : $\alpha = \frac{\pi}{3}$ أو $\alpha = \frac{2\pi}{3}$

أي $(S_{\frac{\pi}{3}})$ و $(S_{\frac{2\pi}{3}})$ تمران من المبدأ O .

ب) تبيان أن النقطة O هي منتصف القطعة $[I_{\pi-\alpha}I_{\alpha}]$:

لدينا : إحداثيات منتصف القطعة $[I_{\pi-\alpha}I_{\alpha}]$ هي

$$\left(\frac{\cos(\alpha) + \cos(\pi - \alpha)}{2}, \frac{\cos(\alpha) + \cos(\pi - \alpha)}{2}, \frac{\cos(\alpha) + \cos(\pi - \alpha)}{2} \right)$$

ولدينا : $\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$

ومنه إحداثيات منتصف القطعة $[I_{\pi-\alpha}I_{\alpha}]$ هي المبدأ $O(0;0;0)$

الاستنتاج بالنسبة إلى سطحي الكرتين $(S_{\pi-\alpha})$ و (S_{α}) :

لدينا : $R_{\pi-\alpha} = \sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$ و $R_{\alpha} = \sin(\alpha)$

أي $R_{\pi-\alpha} = R_{\alpha}$ و لدينا كذلك منتصف القطعة $[I_{\pi-\alpha}I_{\alpha}]$ هي المبدأ $O(0;0;0)$

لستنتج أن $(S_{\pi-\alpha})$ و (S_{α}) متناظرتين بالنسبة إلى المبدأ $O(0;0;0)$.

(3) لدينا : $(P): x + y + z = 0$

أ) تعيين إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة I_{α} على المستوي (P) :

تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) المار من I_{α} والعمودي على المستوي (P) :

$$(\Delta): \begin{cases} x = \lambda + \cos(\alpha) \\ y = \lambda + \cos(\alpha) \\ z = \lambda + \cos(\alpha) \end{cases} ; (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$\begin{cases} x = \lambda + \cos(\alpha) \\ y = \lambda + \cos(\alpha) \\ z = \lambda + \cos(\alpha) \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

إحداثيات النقطة H هي حل للجملية

ومنه $\lambda + \cos(\alpha) + \lambda + \cos(\alpha) + \lambda + \cos(\alpha) = 0$ أي $3\lambda + 3\cos(\alpha) = 0$

ومنه $\lambda = -\cos(\alpha)$

$$\text{إذن إحداثيات النقطة } H \text{ هي } \begin{cases} x = -\cos(\alpha) + \cos(\alpha) = 0 \\ y = -\cos(\alpha) + \cos(\alpha) = 0 \\ z = -\cos(\alpha) + \cos(\alpha) = 0 \end{cases}$$

أي $H(0;0;0)$

موقع

الدراسة الجزائرية
eddirasa.com



ب) دراسة تقاطع المستوي (P) و سطح الكرة (S₀):

حساب المسافة بين النقطة I₀ المستوي (P) : أي $d(I_0; (P)) = \sqrt{3} \times |\cos(\alpha)|$

نصف قطر سطح الكرة (S₀) هو $R_0 = \sin(\alpha)$

(P) يمس سطح الكرة (S₀) يعني $R_0 = d(I_0; (P))$

ومنه $\sqrt{3} \times |\cos(\alpha)| = \sin(\alpha)$ يكافئ $\sqrt{3} \times \cos(\alpha) = \sin(\alpha)$ أو $\sqrt{3} \times (-\cos(\alpha)) = \sin(\alpha)$

أي $\sqrt{3} \times \cos(\alpha) - \sin(\alpha) = 0$ أو $-\sqrt{3} \times \cos(\alpha) - \sin(\alpha) = 0$

وبالتالي : $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \cos(\alpha) - \frac{1}{2} \sin(\alpha) = 0$ أو $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \cos(\alpha) + \frac{1}{2} \sin(\alpha) = 0$

ومنه $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = 0$ أو $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = 0$

أي $\alpha - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ أو $\alpha + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$

ومنه $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ أو $\alpha = \frac{\pi}{3}$

$\alpha \in$	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	π		
إشارة $d(I_0; (P)) - R_0$		+	0	-	0	+

الوضع النسبي :

- إذا كان $\alpha = \frac{\pi}{3}$ أو $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ فإن (P) يمس سطح الكرة (S₀) في المبدأ O.

- إذا كان $\alpha \in]0; \frac{\pi}{3}[\cup]\frac{2\pi}{3}; \pi[$ التقاطع خال .

- إذا كان $\alpha \in]\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}[$ فإن (P) يقطع (S₀) وفق دائرة مركزها O(0;0) ونصف قطرها

$$r = \sqrt{\sin^2(\alpha) - 3\cos^2(\alpha)} = \sqrt{1 - 4\cos^2(\alpha)}$$

تصحيح التمرين الرابع: الرجوع إلى نص التمرين

لدينا : $f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)}$ معرفة على $D_f =]0; e[\cup]e; +\infty[$

I. 1) حساب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم التفسير الهندسي للنتيجتين:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \ln x) = 0^+$

موقع

الدراسة الجزائرية
eddirasa.com



$$\lim_{x \rightarrow e^-} (1 - \ln x) = 0^+ \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = -\infty \text{ و}$$

التفسير الهندسي : $x = e$ مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f) يوازي محور الترتيب .

2) حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم تفسير النتيجة هندسيا :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - \ln x) = -\infty \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = 0$$

التفسير الهندسي للنتيجة : $y = 0$ مستقيم مقارب أفقي للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

3) تبيان أن : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ثم التفسير الهندسي للنتيجة :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x - x \ln x} = +\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - x \ln x) = 0^+ \end{cases} \text{ لأن}$$

التفسير الهندسي : $x = 0$ مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f) يوازي محور الترتيب .

4) تبيان أنه من أجل كل $x \in D_f$ لدينا : $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2}$ ثم إستنتاج إتجاه تغير الدالة f

وتشكيل جدول تغيراتها:

من أجل $x \in]0; e[\cup]e; +\infty[$ لدينا :

$$f'(x) = -\frac{1 \times (1 - \ln x) + x \times \left(-\frac{1}{x}\right)}{[x(1 - \ln x)]^2} = -\frac{1 - \ln x - 1}{x^2(1 - \ln x)^2} = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2}$$

إستنتاج إتجاه تغير الدالة f :

دراسة إشارة المشتقة : إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $\ln x$ لأن $x^2(1 - \ln x)^2 > 0$

جدول إشارة $f'(x)$:

x	0	1	e	$+\infty$
$\ln x$	-	0	+	+
$f'(x)$	-	0	+	+

جدول تغيرات الدالة f :

x	0	1	e	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	+
$f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

لدينا : $g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$ المعرفة على $D_f =]0; +\infty[$

.II

موقع

الدراسة الجزائرية
eddirasa.com

(1) تحديد بيانيا حلول المعادلة $g(x)=0$:

المنحني (C_g) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين متمايزتين وبالتالى المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين متمايزين.

(ب) تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما الآخر α حيث $2.2 < \alpha < 2.3$:

لدينا: $g(1)=1-1^2 \times (1-\ln 1)=1-1=0$ أي العدد 1 حل للمعادلة $g(x)=0$.

ولدينا: الدالة g مستمرة و متزايدة تماما على المجال $[2.2; 2.3]$

ولدينا كذلك: $g(2.2) \times g(2.3) = -0.22 \times 0.12 < 0$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2.2 < \alpha < 2.3$.

(2) تحقق أنه من أجل $x \in D_f$: $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}$

من أجل $x \in]0; e[\cup]e; +\infty[$ لدينا: $f(x) - x = \frac{1}{x(1-\ln x)} - x = \frac{1-x^2(1-\ln x)}{x(1-\ln x)} = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}$

(ب) دراسة الوضع النسبي للمنحني (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x$:

• جدول إشارة $g(x)$:

x	0	1	α	$+\infty$		
$g(x)$		+	0	-	0	+

• جدول إشارة $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}$:

x	0	1	α	e	$+\infty$	
$g(x)$		+	0	-	0	+
$1-\ln x$		+	+	+	0	-
$f(x)-x$		+	0	-	0	+


الوضع النسبي للمنحني (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) :

- إذا كان $x \in]0; 1[\cup]\alpha; e[$ فإن (C_f) فوق (Δ) .

- إذا كان $x \in]1; \alpha[\cup]e; +\infty[$ فإن (C_f) تحت (Δ) .

- إذا كان $x=1$ أو $x=e$ فإن (C_f) يقطع (Δ) .

(3) رسم (Δ) و (C_f) :



$$\text{III. (أ) تبيان أن : } \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx = \ln 2$$

لدينا :

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\frac{1}{x}}{1-\ln x} dx = -\int_1^{\sqrt{e}} \frac{\frac{1}{x}}{1-\ln x} dx = [-\ln|1-\ln x|]_1^{\sqrt{e}} = [-\ln(1-\ln x)]_1^{\sqrt{e}}$$

لأنه من أجل $x \in [1; \sqrt{e}]$ لدينا $1-\ln x > 0$ أي $|1-\ln x| = 1-\ln x$

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx = [-\ln(1-\ln \sqrt{e})] - [-\ln(1-\ln 1)] = -\ln\left(1-\frac{1}{2}\right) = -\ln\frac{1}{2} = \ln 2$$

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx = \ln 2$$
 وبالتالي

(ب) حساب المساحة A للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_r) والمستقيم (Δ) والمستقيمين الذين معادلتها: $x=1$ و $x=\sqrt{e}$

من أجل $x \in [1; \sqrt{e}]$ المستقيم (Δ) يقع فوق (C_r) وبالتالي المساحة

$$A = \int_1^{\sqrt{e}} (x - f(x)) dx = \int_1^{\sqrt{e}} x dx - \int_1^{\sqrt{e}} f(x) dx = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_1^{\sqrt{e}} - \ln 2$$

$$A = \left(\frac{1}{2}e - \frac{1}{2} - \ln 2\right) \text{ u.s.} = 0.17 \text{ cm}^2$$
 أي

إنتهى تصحيح الموضوع التجريبي الأول

الأستاذ ثابت إبراهيم لا تنسونا

بخالص الدعاء للوالدين والأهل.

