

المجال التعليمي رقم (01): التخصص الوظيفي للبروتيناتالوحدة التعليمية الرابعة٦٥ دور البروتينات في الدفاع عن الذات**النشاط ٩: سبب فقدان المناعة المكتسبة (SIDA)****١- الخلايا المستهدفة من طرف فيروس VIH :**

لمعرفة الخلايا المستهدفة من طرف هذا الفيروس نجري الدراسة التالية :

- المرحلة (1) : (لاحظ الوثيقة (1) و (2) ص 107) :

1. يمتاز غشاء الخلية المصابة بوجود تبرعمات غشائية كثيرة بالنسبة لغشاء الخلية السليمة .
2. يعود مظهر الخلية المصابة (تبرعمات غشائية كثيرة) لتطور الفيروس داخل الخلية ثم خروجه منها بظاهرة الطرح الخلوي .

- المرحلة (2) : (لاحظ الوثيقة (2) و (3) ص 108) :**١. تحليل المنحني :**

١. تزايد عدد الخلايا LT_4 نسبياً و تناقص عدد الخلايا LT_4 .

الاستنتاج :

الخلايا المصابة هي الخلايا المفتوحة LT_4 .

٢. تعليل سبب استهداف الفيروس للخلايا LT_4 :

ذلك لاحتواء الخلايا LT_4 على بروتين غشائي CD_4 الذي يوجد بينه وبين البروتين الغشائي للفيروس (gp120) تكامل بنوي (قالب له) و الذي يمثل أحد أهم مكونات VIH .

٢- تطور فيروس VIH و LT_4 :**- المرحلة (1) :** (لاحظ الوثيقة (5) و (6) ص 108) :**١. استخراج الجزيئات المكونة لفيروس VIH :**

١. (gp120) ، (gp24/25) ، (gp41) ، طبقة فوسفوليبيدية ، إنزيم الاستنساخ العكسي ، ARN .

الاستنتاج :

الداعمة الوراثية لفيروس VIH هي ARN .

٢. تحديد دور الجزيئات المكونة للفيروس في إصابة LT_4 :

- (gp120) ، و (gp41) : يتثبت فيروس VIH على المستقبلات CD_4 للخلايا LT_4 عن طريق جزيئة غликوبروتينية هي (gp120) و يدخل إلى داخل الخلية بواسطة الـ (gp41) .

- الـ ARN و إنزيم الاستنساخ العكسي : يدخل إلى داخل الخلية الـ ARN و إنزيم النسخ العكسي و يتحول إلى الـ ARN الفيروسي إلى ADN بفضل إنزيم النسخ العكسي ثم يندمج مع ADN الخلية . LT_4

3. وصف دورة الـ VIH في الخلية المفاوية : LT₄

تلعب جزئية (gp120) الدور الرئيسي في إصابة الخلايا المفاوية LT₄ ، حيث يتثبت على CD₄ الموجود على غشاء الخلية المفاوية LT₄ وبفضل الـ (gp41) يدخل الفيروس إلى داخل الخلية المفاوية حيث تدخل فقط المادة الوراثية وإنزيم الاستنساخ العكسي ، ثم يندمج الـ ADN الفيروسي المتشكل من تحول الـ ARN الفيروسي بفضل إنزيم النسخ العكسي مع ADN الخلية LT₄ و يستعمل مكونات الخلية في نسخ نفسه عدة مرات مكرراً مادته الوراثية و كذلك نسخ و ترجمة بروتيناته و إنزيماته ، ثم ينظم نفسه و يخرج من غشاء الخلية فيروساً كاملاً بالترعم نحو الخارج .

- المرحلة (2) : (لاحظ الوثيقة (7) ص109) :

1. **تحليل المنحنين** : يمكن تقسيم المنحنين إلى ثلاثة مراحل :

- مرحلة الإصابة الأولية: مدتها عدة أسابيع ، تتميز بتناقص عدد الخلايا المفاوية LT₄ و بداية ظهور أجسام مضادة ضد (gp120) أي ضد فيروس الـ VIH .

- مرحلة الترقب: تمتاز بكثرة الأجسام المضادة ضد الـ VIH و يرافق ذلك تزايد طفيف للخلايا المفاوية LT₄ .

- مرحلة العجز المناعي: تتميز بانعدام الخلايا المفاوية LT₄ و زيادة شحنة الفيروس .

2. استخراج سبب العجز المناعي :

يعود إلى تناقص حاد للخلايا المفاوية LT₄ التي تساهم بنسبة كبيرة في الرد المناعي .

3. يصيب فيروس السيدا أيضاً البالعات الكبيرة لاحتواء أغشيتها على البروتين الغشائي CD₄ .

الخلاصة:

- يهاجم فيروس فقدان المناعة البشرية VIH ، (Virus de l'Immunodéficiency Humaine) الخلايا المفاوية المساعدة LT₄ و البلعميات الكبيرة و بلعميات الأنسجة ، وهي خلايا أساسية في التعرف و تقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية ، لدى بتناقص عدد الخلايا المساعدة في مرحلة المرض إلى أقل من 200 خلية في ملم³ .

- تبدو أغشية الخلايا المفاوية المساعدة غير مستوية و عليها تبرعمات عديدة و هو مظهر نمطي للخلايا المصابة بالفيروسات .

عن موقع www.fanit-mehdi.com

البريد الإلكتروني: info@fanit-mehdi.com

الهاتف: 0774 07 85 49