

المجال التعليمي رقم (01): التخصص الوظيفي للبروتينات

دور البروتينات في الاتصال العصبي

الوحدة التعليمية الخامسة

النشاط 5: آلية الإدماج العصبي**1- أنواع المشابك:** (لاحظ الوثيقة (1) ص 148) :**تعريف المشبك:**

المشبك هو منطقة اتصال وظيفي بين خليتين قابلتين للتنبية و قد يكون بين خليتين عصبيتين أو بين خلية عصبية و خلية عضلية أو بين خلية عصبية و خلية غدية و هو يتكون من غشاء قبل مشبكي و غشاء بعد مشبكي و شق مشبكي .

تجربة (1): (لاحظ الوثيقة (2) و (3) ص 149) :**1. مقارنة التسجيلات الناتجة من التسجيل (1) و (2):**

التنبية (1) : زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي و توليد كمون بعد مشبكي (يساوي أو أكبر من عتبة زوال الاستقطاب) يؤدي إلى انتشار كمون عمل .

التنبية (2) : نسجل فرط في الاستقطاب للغشاء بعد المشبكي .

2. يسمى التسجيل الملاحظ في (ج) إثر التنبية (1) بكمون بعد مشبكي تنبیهي (PPSE) و ذلك لتسجيل

زوال استقطاب ينتشر ، بينما التسجيل الملاحظ في (ج) و الناتج عن التنبية (2) فيدعى بكمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSI) و ذلك لتسجيل فرط في الاستقطاب و هو لا ينتشر .

3. بناء على ما سبق فإن نوع المشبكين (أ) و (ب) من الوثيقة (2) هو :

المشبك (أ) هو مشبك تنبیهي ، أما المشبك (ب) هو مشبك تثبيطي .

تجربة (2):

(لاحظ الوثيقتين (4) و (5) ص 150) :

1. من مقارنة التسجيلين (أ) و (ب) نستنتج أن لكل مشبك من المشبكين السابقين مبلغ خاص به حيث

يؤثر الـ GABA في المشبك (ب) .

2. تفسير التسجيل (ب):

- حقن الـ GABA في الفراغ المشبكي للمشبك (ب) بدون تنبیه يؤدي إلى تسجيل فرط استقطاب .

- أثناء الراحة غياب الـ GABA و تواجد شوارد (Cl^-) بنسبة عالية

- عند التنبية تظهر مادة الـ GABA في الفراغ المشبكي (للمشبك (ب)) و تناقص نسبة (Cl^-) .

- نستنتج أن التنبية يسبب تحرير الـ GABA و تناقص شوارد الكلور (Cl^-) في الشق المشبكي للمشبك

(ب) .

3. وصف آلية عمل المشبك (ب) بالربط بين معطيات (ج) و (د):

تسجيل فرط في الاستقطاب يعود لتحرير المبلغ الكيميائي الـ GABA في الشق المشبكي ثم تثبيته

على مستقبلات نوعية (قنوية) وانفتاح القناة أدى إلى دخول شوارد (Cl^-) و تسجيل المنحنى (ب)



(فرط الاستقطاب) ، الرسم التخطيطي الذي يوضح هذا في الصفحة رقم 163 .

4. دور البروتينات الغشائية المولدة للـ PPSE و PPSI :

البروتينات الغشائية المولدة للـ PPSE دورها إدخال شوارد Na^+ وتثبيت الوسيط الكيميائي (الأستيل كولين) وتسجيل كمون عمل بعد مشبكي ينتشر .
البروتينات الغشائية المولدة للـ PPSI دورها إدخال شوارد Cl^- و تثبيت الوسيط الكيميائي (GABA) و تسجيل فرط في استقطاب و عدم انتشار كمون عمل بعد مشبكي .

الاستنتاج :

- إن وجود مشابك تنبيهية أو تثبيطية مرتبط بانفتاح قنوات مختلفة على الغشاء بعد المشبكي ، بحيث :
- مستقبلات قنوية للـ Na^+ لها وظيفة تنبيهية .
 - مستقبلات قنوية للـ Cl^- التي تنشط الـ GABA لها وظيفة تثبيطية حيث يسمح انفتاح هذه المستقبلات القنوية بدخول Cl^- للخلية بعد المشبكية محدثاً فرطاً في لاستقطاب الغشاء و المخططين التاليين يلخصين ما سبق :

مخطط (1) : تأثير مبلغ كيميائي منبه (الأستيل كولين) :**مخطط (2) : تأثير مبلغ كيميائي مثبط (الـ GABA) :****2- إدماج الكمونات بعد المشبكية : (لاحظ الوثيقة (6) ص 151) :**

1. تحديد عدد نوع المشابك المتصلة بالخلية بعد المشبكية :
الشكل (ب) : عدد المشابك (1) ، نوعه مشبك عصبي منبه .
الشكل (أ) : عدد المشابك (3) ، وهي عصبية عصبية حيث الأول مثبط ، أما الثاني و الثالث فهما منبهان .
2. مصدر الكمونيين (1) و (2) المسجلين في المحورين الأسطوانيين للخليتين بعد المشبكتين في الشكلين (أ) و (ب) يعود لدمج مختلف المشابك على مستوى المحورين الأسطوانيين ، بحيث :
التسجيل (1) : منحني كمون عمل + فرط في الاستقطاب \Leftarrow منحني كمون عمل .
التسجيل (2) : ثلاث منحنيات كمون عمل \Leftarrow منحني كمون عمل .
3. للعصبون بعد المشبكي القدرة على تجميع الكمونات التي تصل إليه في نفس الوقت ، إما تجميعاً فضائياً (الشكل (أ)) أو تجميعاً زمنياً (الشكل (ب)) بحيث :
- تجميع فضائي : إذا كانت الكمونات قبل المشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية و التي تصل في نفس الوقت للعصبون بعد المشبكي .
- تجميع زمني : إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة (تقريباً في نفس الوقت) من نفس الليف قبل المشبكي .

3- آلية الإدماج :

(أ) حالة مشابه ذات ميزة تنبيهية : (لاحظ الوثيقة (7) ص 152) :

1. مقارنة النتائج المحصل عليها :

- الحالة (1) و (2) تنبيهين متتاليين لعصبون قبل مشبكي منبه عند تنبيهين متتاليين و متباعدين لا نسجل كمون عمل ، أما عند تنبيهين متتاليين متقاربين فنسجل كمون عمل .
- الحالة (3) و (4) ناتجين عن تنبيه لعصبونيين قبل مشبكيين حيث لا نسجل كمون عمل إذا كان التنبيهان متتاليان و متباعدان ، ونسجل كمون عمل عندما يكون التنبيهان متقاربان .

2. النتيجة :

التنبيهان المتباعدان لا يؤديان إلى توليد كمون عمل في الخلية بعد المشبكية لكن التنبيهان المتقاربان من نفس المشبك أو من مشبكين مختلفين يولدان كمون عمل مما يدل على الإدماج و التجميع .

(ب) حالة مشابه ذات ميزة تنبيهية و أخرى تثبيطية : (لاحظ الوثيقة (8) و (9) ص 152) :

1. تحديد المشبك التنبيهي و المشبك التثبيطي : المشبك E_1 تنبيهي و المشبك I_1 تثبيطي .

2. مقارنة مختلف التسجيلات :

المشبك المثبط يقلل من سعة الكمون بعد المشبكي (أقل من العتبة) و بالتالي لا يتولد كمون عمل في الخلية بعد المشبكية أي أن المحصلة غير كافية لتوليد كمون عمل على شكل موجة زوال استقطاب متنقلة لذا يجب زوال الاستقطاب الناتج عبارة عن كمون غشائي محلي .

النتيجة :

تتحصل على كمون عمل إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية و التثبيطية أثناء الإدماج عتبة توليد كمون عمل بينما إذا كانت المحصلة أقل من العتبة فلا يتولد كمون عمل (المخطط التحصيلي للمنعكس العضلي على المستوى الجزيئي و الشاردي ص 165) .

الخلاصة :

- يمكن أن يترجم تأثير المبلغ الكيميائي العصبي على الغشاء بعد المشبكي بـ :
 - زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون عمل بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) وهو المشبك التنبيهي .
 - فرط استقطاب الغشاء بعد الذي يتسبب في ظهور كمون عمل بعد مشبكي تثبيطي (PPSI) و هو المشبك التثبيطي .
- يدمج العصبون بعد المشبكي مختلف الكمونات بعد المشبكية و ذلك بعملية تجميع ، قد يكون تجميع فضائي أو تجميع زمني .
- نتحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي بمعنى تولد كمون عمل في العنصر بعد المشبكي إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية و التثبيطية عتبة توليد كمون العمل و على عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة أي أن :
 - $PPSI + PPSE < \text{عتبة كمون العمل}$ ← تولد كمون عمل و انتشاره .
 - $PPSE + PPSI > \text{عتبة كمون العمل}$ ← عدم تولد كمون العمل .

عن موقع www.fanit-mehdi.com

البريد الإلكتروني: info@fanit-mehdi.com

الهاتف : 0774 07 85 49