

2016/02/29

» اخبار الثانوي الثاني في مادة الرياضيات »

الدورة: ساعتان

الأقسام: 2 علوم تجريبية

التمرين الأول: (8 نقاط)

$$\begin{cases} u_1 - u_4 = -6 \\ u_1 + u_5 = 28 \end{cases} \quad (I) \quad \text{متالية حسابية حدتها الأول } u_0 \text{ و أساسها } r \text{ بحيث:}$$

1) عين أساس هذه المتالية و حدتها الأول .

2) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n .3) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث :

$$\begin{cases} v_0 = 6 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n - 1 \end{cases} \quad (II) \quad \text{نعتبر المتالية } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المعرفة بـ:}$$

1) أحسب : v_2, v_1 .2) نعتبر المتالية $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ: $w_n = v_n + 2$.أ - برهن أن (w_n) هي متالية هندسية يطلب تعين أساسها و حدتها الأول .ب - أكتب عبارة w_n بدلالة n ثم استنتج عبارة v_n بدلالة n .ت - أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث :ث - استنتاج عبارة S'_n بدلالة n حيث :

التمرين الثاني: (12 نقطة)

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 2x - 3} \quad \text{دالة عددية لمتغير حقيقي } x \text{ معرفة على } \mathbb{R} - \{-1; 3\} \text{ بالشكل:}$$

و ليكن C تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجانس (O, i, j) .

1) بين أنه مهما يكن $\{ -1; 3 \}$ عداد حقيقيان ثابتان b, c حيث $f(x) = 1 + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-3}$ يطلب تعبينهما.

2) أدرس تغيرات الدالة f و شكل جدول تغيراتها.3) بين أن المنحني C يقبل ثلاث مستقيمات مقاربة يطلب تعبينهن معادلاتها.4) عين نقط تقاطع المنحني C مع محوري الإحداثيات.5) بين أنه مهما يكن $x \in D_f$ و $2-x \in D_f$ فإن :6) أكتب معادلة المماس (D) للمنحني C في النقطة التي فاصلتها 2.7) أنشئ C و (D).8) عين بيانيا عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x) = 6$.

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= w_{n+1} + 2 \\ &= \frac{1}{2}w_n - 1 + 2 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}w_n + 1 \quad \textcircled{1}$$

$$= \frac{1}{2}(w_n + 2) = \frac{1}{2}w_n$$

ومنه هي متالية متقدمة

$$\text{إسماها } \frac{w_n + 2}{2} = \frac{1}{2}w_n + q \quad \text{وهو } q = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{0.5} \quad w_0 = w_0 + 2 = 8.$$

بـ w_n بـ w_0 في العام

$$w_n = w_0 \cdot q^n$$

$$= 8 \times (\frac{1}{2})^n \quad \textcircled{0.5}$$

استنتاج بـ w_n

$$v_n = w_n - 2$$

$$v_n = 8(\frac{1}{2})^n - 2 \quad \textcircled{0.5}$$

تـ S_n حساب المجموع

$$\begin{aligned} S_n &= w_0 + w_1 + w_2 + \dots + w_n \\ &= w_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 8 \times \frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$S_n = 16(1 - (\frac{1}{2})^{n+1}) \quad \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} S_n &= v_0 + v_1 + \dots + v_n \\ &= (w_0 - 2) + (w_1 - 2) + \dots + (w_n - 2) \\ &= w_0 + w_1 + \dots + w_n - 2(n+1) \\ &= 16(1 - (\frac{1}{2})^{n+1}) - 2(n+1) \quad \textcircled{1} \end{aligned}$$

التربيع الثاني

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 2x - 3} \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$$

برهان أنه متسابق

$$f(x) = 1 + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-3}$$

التمرين الأول: متالية حسابية د حيث

$$\begin{cases} U_1 - U_4 = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_1 + U_5 = 28 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_0 + r - (U_0 + 4r) = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_0 + r + U_0 + 5r = 28 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3r = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2U_0 + 6r = 28 \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = 2 \quad \textcircled{0.5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_0 = 8 \quad \textcircled{0.5} \end{cases}$$

كتابه بـ v_n في العام

$$U_n = U_0 + nr$$

$$\textcircled{1} \quad U_n = 8 + 2n$$

(3) حساب المجموع

$$S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$= \frac{n+1}{2}(U_0 + U_n)$$

$$= \frac{n+1}{2}(8 + 8 + 2n)$$

$$S_n = (n+1)(8+n) \quad \textcircled{1}$$

$$\begin{cases} U_0 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n - 1 \end{cases}$$

$$U_1 = \frac{1}{2}U_0 - 1 = 2 \quad \textcircled{0.5}$$

$$U_2 = \frac{1}{2}U_1 - 1 = 0.$$

(2) يعنى المتالية (w_n) المعرفة د

$$w_n = v_n + 2$$

(3) يعنى أن (w_n) هي متالية

متقدمة

٨) الممرين السادس (٦) لعددوا إشارة حلول المعادلة $f(x) = 6$

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المترافق مع المسمى ٦
إذن: المعادلة تقبل حلين م碣دين في الإشارة.