

الاختبار الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول:

- اكمل الجدول:

الصيغة نصف المصنفة	اسم المركب	صيغة مجمعة
$\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3 - CH - CH_2 - CH_3 \end{array}$
.....	- ثانوي مثل هكسان (2,3)
.....	- ليثيل، 3- مثل بنتان
$\begin{array}{c} CH_3 - CH - CH_3 \\ \\ CH_3 - CH - CH_3 \end{array}$
.....	4-مثيل هكسين

التمرين الثاني:

قارورة من الخل الشفاف التجاري (حمض الأيتانويك CH_3COOH) كتب على ملصقتها 5% و $d = 1.02$.1- بين ان التركيز المولى للحمض في قارورة الخل التجاري هو: $C_0 = 0.85 mol/L$.2- بغرض معرفة صحة المعلومات الموجودة على الملصقة تأخذ حجما $V_0 = 10ml$ من الخل التجاري وتضيف اليها 90ml من الماء المقطر، تأخذ $V_a = 20ml$ من محلول المخفف ثم نعايره بمحلول لبنيروكسيد الصوديوم ($Na^+ + OH^-$) تركيزه $C_b = 0.1 mol/l$ مع إضافة قطرات من كاشف ملون فينول فتالين، عند التكافؤ نجد أن $V_{BE} = 17ml$.

أ- انكر الخطوات المتتبعة في عملية المعايرة.

ب- اكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث بين ($Na^+ + OH^-$) وحمض الخل CH_3COOH .

ج- ما هو دور الكاشف الملون فينول فتالين؟

د- احسب C_0 تركيز الحمض المخفف، واستنتج C_0 تركيز محلول في القارورة.

هـ- هل النتائج المكتوبة على الملصقة صحيحة؟ علـ.

معطيات: $M_0 = 16 g/mol$. $M_H = 1 g/mol$. $M_C = 12 g/mol$

يتفاعل الماء الأكسجيني H_2O_2 مع شوارد الترترات $C_4H_4O_6^{2-}$ في وسط حمضي منتجًا غاز ثاني أكسيد الفحم CO_2 والماء.

لدراسة هذا التفاعل نزع حجم $V_1 = 50mL$ من الماء الأكسجيني H_2O_2 تركيزه C_1 مع حجم V_2 من محلول ترترات صوديوم بروتسبيوم $KNaC_4H_4O_6$ تركيزه المولى $C_2 = 0.06mol/L$ مع إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز.

1- عرف كلاما من المذكود والمرجع.

2- علما ان الثانيات الداخلة في التفاعل هي $(CO_2/C_4H_4O_6^{2-})$ و (H_2O_2/H_2O) بين ان معادلة التفاعل الحاصل هي:



3- أنشئ جدول لتقدم التفاعل.

4- حجم غاز CO_2 المنطلق عند نهاية التفاعل هو $V_{CO_2} = 192.5mL$

$$(x_{max}) = \frac{V_{CO_2}}{4V_M}$$

ب) بالاستعانة بجدول تقدم التفاعل بين ان H_2O_2 هو المتفاعل المحدد علما ان التفاعل تام.

ج) استنتج قيمة C_1 تركيز الماء الأكسجيني.

5- بين ان تركيز شوارد الترترات $C_4H_4O_6^{2-}$ يعطى بالعلاقة: $[C_4H_4O_6^{2-}] = 0.03 - 0.104 V_{CO_2}$ ثم احسب قيمته عند نهاية التفاعل.

6- للذاك من قيمة C_1 تركيز الماء الأكسجيني H_2O_2 نأخذ منه حجم $V_1 = 50mL$ ونعايره بواسطة محلول ثاني كرومات البروتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})$ تركيزه المولى $C' = 0.4mol/l$ ، فكان حجم المضاف عند نقطة التكافؤ هو: $V' = 8.3mL$.

أ- ارسم مخطط للتركيب المستعمل للمعايرة مع توضيح مكان تواجد كل محلول.

ب- عرف نقطة التكافؤ وكيف تشكل عليها؟

ج- اكتب معادلة تفاعل المعايرة ، يعطى: $(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$ ، (O_2/H_2O_2) ،

د- استنتج العلاقة بين: C' ، V' ، V_1 ، C_1 و V .

ـ احسب C_1 وقارنها مع المحسوبة سابقاً.

$$V_M = 24L/mol$$