

## إختبار مادة الرياضيات للفصل الثاني ج مع ت

التمرين الأول: (6ن)

- اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال من الأسئلة التالية، مع التعليل.

I. دالة معرفة على  $R$  بالعبارة:  $f(x) = (x+1)^2$  معناه:

1. الدالة  $f$  متزايدة تماماً على المجال  $[-1; -\infty)$

2. الدالة  $f$  متناقصة تماماً على المجال  $(-\infty; -1]$

3. الدالة  $f$  ثابتة على المجال  $(-\infty; -1)$

II. إذا كان  $x = \frac{2020\pi}{3}$  حيث  $x$  عدد حقيقي فإن:

$$\cos(x) = \frac{-1}{2} . 1$$

$$\cos(x) = \frac{1}{2} . 2$$

$$\cos(x) = \frac{-\sqrt{3}}{2} . 3$$

III. ليكن  $\cos(x) = \frac{-1}{2}$  إذا كان  $x \in [\pi; \frac{3\pi}{2}]$  فإذا كان فإن:

$$\sin(x) = \frac{1}{2} . 1$$

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} . 2$$

$$\sin(x) = \frac{-\sqrt{3}}{2} . 3$$

IV.  $x_1$  و  $x_2$  عدوان حقيقيان من المجال  $[0; \frac{\pi}{2}]$  فإذا كان  $x_1 < x_2$  فإن:

$$\sin(x_1) > \sin(x_2) . 1$$

$$\sin(x_1) < \sin(x_2) . 2$$

$$\sin(x_1) = \sin(x_2) . 3$$

(إقلب الصفحة)

## التمرين الثاني: (7ن)

لتكن:  $A(x) = (x - 3)(2x - 1) + x^2 - 9$

1. أنشر وسط العبارة  $A(x)$ .
2. أكتب العبارة  $A(x)$  على الشكل النموذجي.
3. حل المعادلة  $A(x)=0$ , ثم استنتج تحليلًا للعبارة  $A(x)$  الى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
4. استنتاج جدول إشارة العبارة  $A(x)$ .

5. نضع:  $E(x) = \frac{A(x)}{x+2}$

- جد القيم الممنوعة للعبارة  $E(x)$
- إنطلاقاً من جدول إشارة العبارة  $A(x)$  إستنتاج جدول إشارة العبارة  $E(x)$
- استنتاج حلول المتراجحة:  $E(x) \leq 0$

## التمرين الثالث: (7ن)

المستوي منسوب الى معلم متعمد وتجانس  $(\vec{0}; \vec{i}, \vec{j})$

لتكن  $C, A, B$  ثلاث نقاط من المستوى حيث:

1. عين إحداثيتي  $D$  علماً أن  $\vec{CD} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}$
2. مثل النقط  $A, B, C, D$  على المستوى.
3. أكتب معادلة المستقيم  $(\Delta)$  الذي يشمل النقطة  $C$  و  $\overrightarrow{AB}$  هو شعاع توجيهه.
4. أحسب أطوال أضلاع المثلث  $ABC$ , ما نوع المثلث؟ (مع التعليل)
5. نقطة  $N$  حامل محور الفوائل.
- عين إحداثيتي النقطة  $N$  حتى تكون النقط  $N, A, B$  على إستقامة واحدة.
- ما نوع الرباعي  $CDNB$ ؟ (مع التعليل)

إنتهى...

## التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

### حل التمرين الأول: (6ن)

I. دالة معرفة على  $\mathbb{R}$  | بالعبارة:  $f(x) = (x+1)^2 - 3$  معناه:

2. الدالة  $f$  متناقصة تماماً على المجال  $[-\infty; -1]$

التعليق:

- دراسة إشارة  $x+1$ :

$$x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

- جدول إشارة  $x+1$ :

$x$	$-\infty$	$-1$	$+\infty$
$x + 1$	-	∅	+

لتكن  $x_1, x_2 \in ]-\infty; -1]$

حيث  $x_1 < x_2$

يكافئ  $x_1 + 1 < x_2 + 1$

يكافئ  $(x_1 + 1)^2 > (x_2 + 1)^2$

يكافئ  $(x_1 + 1)^2 - 3 > (x_2 + 1)^2 - 3$

يكافئ  $f(x_1) > f(x_2)$

ومنه الدالة  $f$  متناقصة تماماً على  $]-\infty, -1]$  (و.ه.م)

II. إذا كان  $x = \frac{2020\pi}{3}$  حيث  $x$  عدد حقيقي فإن:

$$\cos(x) = \frac{-1}{2} \cdot 2$$

التعليق:

نعتبر  $M(\frac{2020\pi}{3})$

$$2020 = 673 \times 3 + 1$$

$$\frac{2020\pi}{3} = \frac{673\pi \times 3}{3} + \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{2020\pi}{3} = 336 \times 2 + \pi + \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{2020\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$$

ومنه:  $\cos\left(\frac{2020\pi}{3}\right) = ?$

أي:  $\cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = ?$

وبحسب القاعدة التي تقول

$$\cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

ونحن نعلم أن  $\frac{\pi}{3}$  هي زاوية شهيرة.

أي  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

ومنه  $\cos(x) = \cos\left(\frac{2020\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$  (و.ه.م)

ليكن  $\cos(x) = -\frac{1}{2}$  إذا كان  $x \in [\pi; \frac{3\pi}{2}]$  فإن:

$$\sin(x) = \frac{-\sqrt{3}}{2} \cdot 3$$

التعليق:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \sin^2 x = 1$$

$$\sin^2 x = 1 - \frac{1}{4}$$

$$\sin^2 x = \frac{4-1}{4}$$

$$\sin x = \pm \sqrt{\frac{3}{4}}$$


$$\begin{cases} -\frac{\sqrt{3}}{2} & \text{(مقبولة)} \\ +\frac{\sqrt{3}}{2} & \text{(مرفوضة)} \end{cases}$$

ومنه  $\sin x = \frac{-\sqrt{3}}{2}$  لأن:  $x \in [\pi; \frac{3\pi}{2}]$

-  $x_1 < x_2$  و  $x_2$  عددان حقيقيان من المجال  $[0; \frac{\pi}{2}]$  إذا كان فإن:

$$\sin(x_1) < \sin(x_2).2$$

التعليق:



ومنه إذا كان  $x_1 > x_2$   
 $\sin x_1 > \sin x_2$   
حل التمرين الثاني: (7ن)

1. نشر وتبسيط العبارة  $A(x)$ :

$$A(x) = (x - 3)(2x - 1) + x^2 - 9$$

$$A(x) = x(2x - 1) - 3(2x - 1) + x^2 - 9$$

$$A(x) = 2x^2 - x - 6x + 3 + x^2 - 9$$

$$A(x) = 3x^2 - 7x - 6$$

2. كتابة العبارة  $A(x)$  على الشكل النموذجي:

$$A(x) = 3x^2 - 7x - 6$$

لدينا:  $a=3, b=-7, c=-6$

$$A(x) = a[(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{\Delta}{4a^2}]$$

ومنه  $\Delta = b^2 - 4ac$

حيث  $\Delta = 121$

$$A(x) = 3\left[\left(x - \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{121}{36}\right]$$

نجد لها  $A(x)=0$

3. حل المعادلة  $A(x)=0$

بما أن  $\Delta = 121 > 0$

إذن للمعادلة حلان مختلفان (متايزان) هما:

$$x_1 = \frac{\sqrt{\Delta} - b}{2a} = 3$$

$$x_2 = \frac{-\sqrt{\Delta} - b}{2a} = \frac{-4}{6}$$

- تحليل العبارة  $A(x)$

$$A(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$A(x) = 3(x - 3)\left(x + \frac{4}{6}\right)$$

ن0.5

ن1.5

4. استنتاج جدول إشارة العبارة  $A(x)$

$$x - 3 = 0$$

$$x = 3$$

$$x + \frac{4}{6} = 0$$

$$x = -\frac{4}{6}$$

$x$	$-\infty$	$\frac{-4}{6}$	3	$+\infty$
$x - 3$	-	-	○	+
$x + \frac{4}{6}$	-	○	+	+
$A(x)$	+	○	-	○

:E(x).5

ن0.5

- القيم الممنوعة للعبارة  $E(x)$

القيم الممنوعة للعبارة  $E(x)$  هي القيم التي تعدد المقام.

$$x + 2 = 0$$

$$(قيمة ممنوعة) \quad x = -2$$

نـ 1.5

استنتاج جدول إشارة العبارة  $E(x)$  -

$x$	$-\infty$	$-2$	$-\frac{4}{6}$	$3$	$+\infty$
$A(x)$	+	+	0	-	0
$x + 2$	-	0	+	+	+
$E(x)$	-	+	0	-	0

استنتاج حلول المتراجحة:  $E(x) \leq 0$  -

$$S = \left] -2; \frac{-4}{6} \right] \cup [3; +\infty[$$

حل التمرين الثالث: (7ن)

1. تعين إحداثياتي النقطة D

لدينا:  $\overrightarrow{CD}(\begin{smallmatrix} 4 \\ -4 \end{smallmatrix})$ 

$$\overrightarrow{CD}(\begin{smallmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{smallmatrix}) \quad \overrightarrow{CD}(\begin{smallmatrix} x_D + 4 \\ y_D - 1 \end{smallmatrix})$$

ومنه:


$$\begin{cases} x_D + 4 = 4 \\ y_D - 1 = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_D = 4 - 4 \\ y_D = -4 + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_D = 0 \\ y_D = -3 \end{cases}$$

أي:  $D(0 ; -3)$

2. تمثيل النقط:



3. معادلة المستقيم  $(\Delta)$ :

لدينا:  $C(-4; 1)$

لتكن  $M(x; y) \in (\Delta)$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 - 2 \\ 4 - 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{MC} \begin{pmatrix} x_C - x_M \\ y_C - y_M \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{MC} \begin{pmatrix} -4 - x \\ 1 - y \end{pmatrix}$$

ومنه  $\overrightarrow{BC}$  و  $\overrightarrow{AB}$  مرتبطان خطياً

$$-3(1 - y) - 3(-4 - x) = 0$$

$$-3 + 3y - (-12 - 3x) = 0$$

$$-3 + 3y + 12 + 3x = 0$$

$$(\Delta) \boxed{3x + 3y + 9 = 0}$$

4. حساب أطوال أضلاع المثلث ABC:

$$AB = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$BC = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$AC = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$$

- نوع المثلث ABC: (متساوي الساقين، وقائم في B)

التعليق:

$$\text{لدينا: } AB = BC = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

ومنه المثلث ABC هو مثلث متساوي الساقين.

نحسب النسب:

$$AB + BC = \sqrt{18} + \sqrt{18} = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$$

$$AC = 6 \text{ cm}$$

بما أن  $AB+BC=AC$

حسب نظرية فيثاغورس العكسية المثلث ABC قائم في B.

نستنتج أن: المثلث ABC متساوي الساقين، وقائم في B.

5. N نقطة من حامل محور الفواصل:

- تعين إحداثياتي النقطة N:

حتى تكون النقط N,A,B على إستقامية واحدة يجب أن يكون  $\overrightarrow{BA}$  و  $\overrightarrow{BN}$  مرتبطان خطياً.

ملاحظة: لدينا من المعطيات N نقطة من حامل محور الفواصل أي  $N(x; 0)$

$$\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} x_A - x_B \\ y_A - y_B \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -1 - 2 \\ 4 - 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{BN} \begin{pmatrix} x_N - x_B \\ y_N - y_B \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{BN} \begin{pmatrix} x_N + 1 \\ 0 - 4 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{BN} \begin{pmatrix} x_N + 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

ليكون  $\overrightarrow{BN}$  و  $\overrightarrow{BA}$  مرتبطان خطياً يجب أن يكون:

$$(-3) \times (-4) - 3(x_N + 1) = 0$$

$$12 - 3x_N - 3 = 0$$

$$-3x_N = -9$$

$$x_N = 3$$

$$N(3 ; 0)$$

ومنه

التعليق:

$$\text{لدينا: } \overrightarrow{CD} \left( \begin{smallmatrix} 4 \\ -4 \end{smallmatrix} \right)$$

$$\overrightarrow{BN} \left( \begin{smallmatrix} 3+1 \\ 0-4 \end{smallmatrix} \right)$$

$$\overrightarrow{BN} \left( \begin{smallmatrix} 4 \\ -4 \end{smallmatrix} \right)$$

$$\overrightarrow{BN} \left( \begin{smallmatrix} x_N - x_B \\ y_N - y_B \end{smallmatrix} \right)$$

$$\overrightarrow{BN} \left( \begin{smallmatrix} 3+1 \\ 0-4 \end{smallmatrix} \right)$$

بما أن  $\overrightarrow{CD}$  و  $\overrightarrow{BN}$  شعاعان متساويان إذن  $CD$  و  $BN$  متوازيان ومنه الرباعي متوازي أضلاع.

نحسب أطوال الرباعي  $CDNB$ : (ملاحظة: الحساب يكون باستعمال القاعدة)

$$CD = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$BN = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$BC = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$ND = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

ومنه طول الرباعي هو  $CD = BN = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \text{ cm}$

وعرض الرباعي هو  $BC = ND = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$

من (1) و (2) نستنتج أن الرباعي  $CDNB$  هو مستطيل.

وليس مربع لأن

$$CD \neq ND \text{ و } CD \neq BC$$

$$BN \neq ND \text{ و } BN \neq BC$$

إسنتاج عام: الرباعي  $CDNB$  متوازي أضلاع ومستطيل في نفس الوقت.