

التمرين الأول:

تمت محاكاة رمي زهر نرد ذي 6 أوجه.

يمثل الجدول التالي توزيع تواترات ظهور الأوجه الستة بالنسبة إلى عينة ذات المقاس 20 .

الوجه	1	2	3	4	5	6
التواتر	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1

أحسب كلا من الوسط الحسابي \bar{x} ، التباين V و الانحراف المعياري σ .

التمرين الثاني:

يعطى جدول تغيرات دالة f المعرفة على المجال $[-1; 3]$ كما يلي:

x	-1	0	2	3
$f(x)$	0	2	-2	0

باستعمال المعلومات المتوفرة في هذا الجدول:

(1) عين $f(0)$.

(2) هل النقطتان $A(-1; 0)$ و $B(2; -2)$ تنتميان إلى منحني الدالة f ؟

(3) قارن بين $f(1,5)$ و $f(1,8)$ ثم بين $f(-0,5)$ و $f(-0,8)$.

(4) ارسم تمثيلا بيانيا ممكنا للدالة f .

(5) استنتج رسم التمثيل البياني للدالة g المعرفة على المجال $[-1; 3]$ بـ : $g(x) = -f(x)$.

التمرين الثالث:

نعتبر الدالة f المعرفة على $[-1; +\infty) \cup (-\infty; -1]$ بـ :

.1. عين عددين حقيقيين a و b بحيث من أجل كل x من $[-1; +\infty) \cup (-\infty; -1]$ ، $f(x) = a + \frac{b}{x+1}$

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعدد و متجانس $(O; \bar{i}, \bar{j})$.

(أ) برهن أن النقطة $A(-1; 2)$ مركز تناول لمنحني (C_f) .

(ب) عين إحداثي نقطي تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.

(ت) بين أن المنحني (C_f) هو صورة منحني الدالة "مقلوب" بواسطة تحويل نقطي يطلب تعينه.

(ث) أنشئ (C_f) في المعلم $(O; \bar{i}, \bar{j})$.

4. أدرس إشارة $f(x)$ على المجموعة $[-1; +\infty) \cup (-\infty; -1]$.

5. دالة h معرفة على $[-1; +\infty) \cup (-\infty; -1]$ بـ : $h(x) = |f(x)|$

(C_h) التمثيل البياني للدالة h في المعلم السابق

اشرح كيف نستخرج المنحني (C_h) انطلاقا من المنحني (C_f) ثم أنشئه.