


التمرين الأول: (4 نقاط)



- 1 - يمثل المنحنى البياني المقابل تغيرات التحويل الحراري Q المقدم لعينة من معدن بدلالة كتلتها m لرفع درجة حرارتها من 30°C إلى 60°C .
- أ / اكتب عبارة التحويل الحراري المقدم لهذه العينة.
 - ب / اكتب معادلة البيان الممثل في الشكل المقابل.
 - ج / استنتج السعة الحرارية الكتليلية لهذا المعدن ثم تعرف عليه اعتمادا على الجدول أدناه.

- 2 - نأخذ قطعة من النحاس كتلتها $m = 2\text{kg}$ عند الدرجة 400°C وندخلها في وعاء يحتوي على $0.5L$ من الماء عند الدرجة 30°C ، نقيس درجة الحرارة للجملة (قطعة نحاس+الماء) عند التوازن فنجد لها 100°C .
- أ / أحسب التحويل الحراري الذي يحدث لقطعة النحاس ، ما هي إشارته ؟ على
 - ب / ما هو التحويل الحراري الذي يتسبّب الماء باعتبار الجملة (نحاس + ماء) معزولة حراريا .
 - ج / ما هو حجم الماء الذي يبقى في حالته السائلة ؟

$$\text{يعطى: } C_{\text{eau}} = 4185 \text{ J/Kg.}^{\circ}\text{C} , \rho_{\text{ماء}} = 1 \text{ kg/L} , L_v = 2261 \text{ kJ/kg}$$

المعدن	Fe	Cu	Pb
السعة الحرارية الكتليلية ($\text{J/kg.}^{\circ}\text{C}$)	460	387	130


التمرين الثاني:

- 1 - نحضر محلولا مائيا لحمض النتريك HNO_3 انطلاقا من محلول تجاري S_0 تركيزه المولي C_0 يحمل المعلومات التالية :
- $$P = 100\% , d = 1,51$$

- أ / ماذا نقصد به : P و d .
- ب / تأكّد أن التركيز المولي $C_0 \approx 24 \text{ mol/L}$.

- 2 - للتأكد من قيمة C_0 نأخذ بواسطة ماصة عيارية حجما $V_0 = 2.5 \text{ ml}$ و نضعه في حوجلة عيارية سعتها 1L نكمّل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار لنحصل على محلول الحمضي (H_3O^+ ; NO_3^-) تركيزه المولي C_a (تركيزه المولي H_3O^+)
- أ / ماذا تسمى هذه العملية ، عرفها .
 - ب / ما هو الهدف منها ؟

- 3 - نأخذ حجما $V_a = 20 \text{ mL}$ من محلول الحمضي المحضر سابقا و نضيف إليه قطرات من كاشف أزرق البروموتيمول ، ثم نعايره بواسطة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم ($\text{K}^+; \text{OH}^-$) تركيزه المولي $C_b = 0.1 \text{ mol/L}$ عن طريق قياس الناقليّة الكهربائيّة G للمزيج التفاعلي في البישير فنحصل على البيان في الشكل - 1 -
- أ / ذكر بالبروتوكول التجريبي لعملية المعايرة ، مع ذكر الأدوات اللازمة .
 - ب / اكتب معادلة التفاعل بين محلول الحمض التتريك و محلول هيدروكسيد البوتاسيوم مبينا أنه تفاعل حمض - أساس .
 - ث / حدد الثنائيتين (أساس / حمض) الداخلتين في التفاعل .
 - ج / استنتاج تركيز محلول الحمضي المعاير C_a ، ثم تأكّد من قيمة التركيز C_0 المحسوبة سابقا .
 - ح / هل يتغيّر لون كاشف أزرق البروموتيمول أثناء المعايرة ؟ علل مبينا لون الكاشف في كل مرحلة من عملية المعايرة
 - خ / ما هي الأفراد الكيميائية الموجودة في البيشير عند التكافؤ ؟ احسب تركيزها .
 - د / حدد بيانيا ناقليّة المزيج التفاعلي عند نقطة التكافؤ ، ثم تأكّد من قيمتها حسابياً علماً أن ثابت خلية جهاز قياس الناقليّة $K = 1\text{cm}$



الشكل - ١ -





المعطيات :

$$M_H = 1 \text{ g/mol} , M_N = 14 \text{ g/mol} , M_O = 16 \text{ g/mol} , \lambda_{K^+} = 7.35 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 / \text{mol} , \lambda_{NO_3^-} = 7.14 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 / \text{mol}$$




لونه في المحلول الأساسي	لونه في المحلول الحمضي	اللون الأصلي لازرق البروموتيمول
أزرق	أصفر	أخضر

التمرين الثالث : (4 نقاط)

١ - اكمل المعادلات النصفية التالية ، ثم بين إن كانت معادلة نصفية للأكسدة أو الارجاع :



٢ - حدد الثنائية (*OX / Red*) في المعادلات النصفية التالية :



بالتوسيع