



الموسم الدراسي: 2020/2021

التاريخ: 2021/06/01

المدة الزمنية: ساعتين

ثانوية الحمير الجديدة

المستوى: السنة الأولى جلع مشترك علوم و تكنولوجيا

إختيار مادة الرياضيات للفصل الثاني

التمرين الأول: 4 نقاط

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

نعتبر النقط $E(\alpha; \alpha+5)$ و $C(-1; -2)$, $B(-2; 3)$, $A(3; 2)$

- هل النقط A, B, C في استقامة؟ مع التعليل.
- عين إحداثيي النقط F نظيرة النقط B بالنسبة للنقط A .
- أوجد قيمة العدد الحقيقي α حتى يكون الرباعي $ABEC$ متوازي أضلاع.

- اكتب معادلة للمستقيم (D) الذي يشمل النقط B و يوازي المستقيم $(d): y = 2x - 7$.
- سؤال إضافي:

لتكن المستقيمت (Δ_m) المعرفة بمعادلتها $(\Delta_m): y = (\frac{m^2 - 3m + 7}{2})x + (5m - 1)$, حيث m عدد حقيقي.

هل توجد قيمة للعدد الحقيقي m يكون من أجلها المستقيم (Δ_m) يوازي المستقيم (d) ؟

التمرين الثاني: 10 نقاط

لتكن الدالة التالفة f المعرفة على \mathbb{R} حيث: $f(2) = 6$ و $f(-3) = 1$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- عين عبارة الدالة التالفة f .

- أنشئ (C_f) في المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. لتكن الدالة المعرفة على \mathbb{R} بالعبارة: $g(x) = x^2 + 6x + 8$.

و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 حل في \mathbb{R} المعادلة: $g(x) = 0$. ثم استنتج نقاط تقاطع (C_g) مع حامل محور الفواصل.

2 عين السوابق الممكنة للعدد -1 بالدالة g .

1 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x نـ $g(x) = (x+3)^2 - 9$.

0.5+1.5 ادرس اتجاه تغير الدالة g على كل من المجالين $]-\infty; -3]$ و $]-3; +\infty[$. ثم شكل جدول تغيراتها.

0.5 اشرح كيف يمكن إنشاء (C_g) التمثيل البياني للدال g انطلاقا من التمثيل البياني للدالة مربع في المعلم المتعامد و

المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

أقلب الصفحة

1.5 0.5+0.5	<p>(4) أنشئ (C_g) التمثيل البياني للدالة g في نفس المعلم السابق مع (C_f) التمثيل البياني للدالة التالفة f.</p> <p>(5) حل بيانيا المعادلة $f(x) = g(x)$ و المتراحة $g(x) \geq 3$.</p> <p>التمرين الثالث: 6 نقاط</p>
0.75+0.75 0.75+	<p>(1) وقع على الدائرة المثلثية النقاط M_1, M_2, M_3 المرفقة للأعداد الحقيقية 2021π و $\frac{-345\pi}{4}$ و $\frac{2405\pi}{6}$ على الترتيب.</p>
0.75+0.25 0.25+	<p>(2) استنتج القيم المضبوطة لكل من $\sin\left(\frac{2405\pi}{6}\right)$ و $\tan\left(\frac{-345\pi}{4}\right)$ و $\cos(2021\pi)$.</p>
1	<p>(3) أحسب $\sin(x)$ إذا علمت أن $\cos(x) = \frac{-3}{5}$ و $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.</p>
1.5	<p>(4) بين أن $A(x) = 1$ حيث:</p> $A(x) = 2 \cos(2021\pi - x) + \cos(2020\pi - x) - \cos(x + 13\pi) + \sin\left(\frac{17\pi}{2}\right)$

عطلة سعيدة