

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الثانوية: حسين براهمي

المستوى: ثانية ثانوي

المعامل: 5

مديرية التربية لولاية قسنطينة

المادة: الرياضيات

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 1 سا

الفرض الخامس

التمرين الأول(14ن):

نعتبر كثيري الحدود $Q(x) = x^2 + 5x + 6$ و $P(x) = 3x^3 + 11x^2 - 2x - 24$

(1) أ- تحقق من أن $(P(x))$ هو جذر لـ $Q(x)$ ثم يستنتج حينئذ كل جذور $Q(x)$.

ب- حل في \mathbb{R} المعادلة: $0 = Q(x)$. (1ن).

(2) نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي:

أ- اختزل عبارة u_n من أجل كل عدد طبيعي n . (1.5ن).

ب- أثبت أن (u_n) متتالية حسابية يُطلب تعين حدّها الأولى وأساسها. (1ن+0.5ن).

(3) ليكن المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

أكتب u_n بدالة n ثم أوجد قيمة n بحيث: $S_n = 1022$. (1ن+2.5ن).

(4) لتكن المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ: $v_n = 2^{u_n}$

أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعين أساسها وحدّها الأولى. (1ن+0.5ن).

ب- أحسب بدالة n المجموع: $S'_n = 2^{u_0} + 2^{u_1} + \dots + 2^{u_n}$. (1ن).

التمرين الثاني(6ن):

لتكن المتتاليتان العدديتان (u_n) و (v_n) المعرفتان من أجل كل عدد طبيعي:

$v_n = 3n$ و $u_n = 2^n$

(1) أثبت أن (u_n) متتالية هندسية و (v_n) متتالية حسابية. (1.5ن+1ن).

(2) لتكن (w_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ:

$w_n = \alpha 2^n + 3n$ حيث: $\alpha \in \mathbb{R}^*$

أحسب بدالة n و α المجموع: $S'' = w_0 + w_1 + \dots + w_{n-1}$. (2.5ن).

ملاحظات هامة جدا: 1) يمنع إستعمال الآلة الحاسبة من نوع CASIO أو KAJIB.

2) يمنع منعاً باتاً التسطيب و الكتابة تكون إما بالأزرق أو الأسود.

3) لا تكتب و لا تلطف هذه الورقة لأنك سترجعها مع ورقة الإجاب