



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

**الموضوع الأول**

**التمرين الأول: (04 نقاط)**

يحتوي صندوق على خمس كرات بيضاء، ثلاثة حمراء وكرتين سوداويين متشابهة لا نفرق بينها باللمس.  
نسحب عشوائيا وفي آن واحد أربع كرات من الصندوق.

نعتبر الحادثتين : A "الحصول على كرة حمراء واحدة فقط", B "الحصول على كرة بيضاء على الأقل".

$$(1) \text{ بين أن: } P(A) = \frac{1}{2} \text{ , ثم أحسب } P(B) \text{ احتمال الحدث } B .$$

(2) نعتبر المتغير العشوائي  $X$  الذي يرفق بكل مخرج عدد الكرات الحمراء المسحوبة .  
أ) عين قيم المتغير العشوائي  $X$ .

$$P(X=2) = \frac{3}{10} \quad P(X=0) = \frac{1}{6}$$

(3) عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي  $X$  ثم أحسب أمثلة الرياضي  $E(X)$

(4) أحسب الانحراف المعياري  $\sigma(X)$

**التمرين الثاني: (04 نقاط)**

أجب بصح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات التالية:

$$(1) \text{ الدالة } f \text{ المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ: } f(x) = \ln(x^2 + 2x + 3)$$

من أجل كل عدد حقيقي  $x$  لدينا:  $f(-2-x) = f(x)$

(2) (متتالية هندسية أساسها  $e$  وحدتها الأولى  $u_0 = e^{-\frac{1}{2}}$  حيث نضع من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ,

$$\frac{n^2+1}{2} \text{ يساوي: } S_n, S_n = \ln(u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n)$$

(3) الدالة  $g$  المعرفة على المجال  $[0; +\infty]$  بـ:  $g(x) = 2x + 1 + \frac{1}{x^2}$ , دالتها الأصلية  $G$  على المجال

$$[0; +\infty] \text{ والتي تتعدم من أجل القيمة 1 معرفة بـ: } G(x) = x^2 + x - \frac{1}{x} - 1$$

(4) يتكون فريق عمل من 4 إناث و3 ذكور، يراد تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء . احتمال أن تكون اللجنة

من الجنسين هو:  $\frac{6}{7}$

**التمرين الثالث: (04 نقاط)**

أ. (المتالية العددية المعرفة بحدتها الأولى  $u_0 = \alpha$  (عدد حقيقي) ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$ :

$$u_{n+1} = \frac{46}{47}u_n + 43$$

جد قيمة  $\alpha$  حتى تكون المتالية  $(u_n)$  ثابتة.

II. نفرض أن:  $\alpha = 2022$

نعتبر المتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  كمايلي:  $V_n = U_n - 2021$

(1) بين أن المتالية  $(v_n)$  هندسية يطلب تعين أساسها وحدتها الأول

(2) أكتب عبارة  $v_n$  بدلالة  $n$ , ثم استنتج  $u_n$  بدلالة  $n$ .

(3) أدرس اتجاه تغير المتالية  $(u_n)$ .

(4) أحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$(5) \text{ نضع من أجل كل عدد طبيعي } n, \quad S_n = \frac{u_0}{v_0} + \frac{u_1}{v_1} + \dots + \frac{u_n}{v_n}$$

- أحسب  $S_n$  بدلالة  $n$ , ثم أحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$

#### التمرين الرابع: (08 نقاط)

أ. نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على المجال  $[0; +\infty]$  كمايلي:

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ .

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة  $g$  وشكل جدول تغيراتها.

(3) بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث:  $1.31 < \alpha < 1.32$  ثم استنتاج إشارته.

II. لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $[0; +\infty]$  كما يلي:  $f(x) = x - e + \frac{1 - \ln x}{x}$  المنحني الممثل

للدالة  $f$  في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتاجنس  $(\bar{o}; \bar{i}; \bar{j})$  (وحدة الطول  $2cm$ )

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  وفسر النتيجة الأولى هندسياً.

(2) أثبت أن المنحني  $(C_f)$  يقبل مستقيم مقارب مائل  $(D)$  يطلب تعين معادلته.

(3) أدرس الوضعية النسبية للمنحني  $(C_f)$  والمستقيم  $(D)$ .

$$(4) \text{ بين أنه من أجل كل } x \text{ من } [0; +\infty] \text{ فإن: } f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

(5) استنتاج اتجاه تغير الدالة  $f$ , ثم شكل جدول تغيراتها.

$$(6) \text{ أثبت أن: } f(\alpha) = 2\alpha - e - \frac{1}{\alpha}, \text{ ثم استنتاج حصراً للعدد } f(\alpha).$$

(7) أ) بين أن المنحني  $(C_f)$  يقبل مماساً  $(T)$  يوازي المستقيم  $(D)$  في نقطة يطلب تعين احداثياتها.

ب) أكتب معادلة ديكارتية للمماس  $(T)$ .

(8) أنشئ  $(T)$  والمنحني  $(C_f)$ .

(9) نسمى  $A(\alpha)$  مساحة الحيز من المستوى المحدود بالمنحني  $(C_f)$  والمستقيم  $(D)$  والمستقيمين اللذين معادلتيهما

$$x = e \quad x = \alpha$$

$$- \text{ بين أن: } A(\alpha) = 2(\alpha^2 - 1)^2 cm^2$$

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

## التمرين الأول: ( 04 نقاط)

جمعية خيرية تتكون من 7 رجال و 5 نساء من بينهم رجل اسمه أنس ، نريد تشكيل لجنة بها 3 أعضاء.

1) ما هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها في حالة أعضاء اللجنة لهم نفس المهام.

2) أحسب احتمال الحوادث التالية : A "اللجنة تضم أنس "

B "اللجنة تتكون من رجلين و امرأة "

C "اللجنة بها رجل واحد على الأقل"

D "اللجنة مكونة من امرأة على الأكثر".

3) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرافق بكل اختيار عدد الرجال الذين يحملون اسم أنس في اللجنة المكونة .

أ) عين قيم المتغير  $X$  .

ب) عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي  $X$  وأحسب أمله الرياضي (  $E(X)$  )

## التمرين الثاني: ( 04 نقاط)

لكل سؤال جواب واحد فقط صحيح من بين الأربعة الثلاثة المقترحة، عينه مع التعليل .

1) الدالة الأصلية  $F$  والتي تحقق  $F(1)=0$  للدالة  $f$  المعرفة على  $[0; +\infty]$  هي الدالة :

$$F(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \quad (ج) \quad F(x) = 1-x + \ln x \quad (ب) \quad F(x) = x - 1 + \ln x \quad (أ)$$

2) الحل العام للمعادلة التقاضلية  $\frac{dy}{dx} + 3y = \frac{5}{2}$  هو الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  ب :

$$y = ce^{-3x} + \frac{5}{6} \quad (ج) \quad y = ce^{-3x} - \frac{5}{6} \quad (ب) \quad y = ce^{3x} + \frac{5}{6} \quad (أ)$$

3) في قسم نهائي 30 % متفوقين في مادة الرياضيات و 35 % متفوقين في مادة العلوم الفيزيائية و

متفوقين في المادتين معاً . احتمال أن يكون التلميذ متفوقاً في مادة الرياضيات علماً أنه متفوق في مادة

العلوم الفيزيائية هو:

$$\frac{2}{13} \quad (ج) \quad \frac{1}{3} \quad (ب) \quad \frac{2}{7} \quad (أ)$$

4) المتتالية العددية  $(v_n)$  معرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ب :

من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$  يساوي :

$$1 - \ln(n+1) \quad (ج) \quad -\ln(n+1) \quad (ب) \quad \ln(n+2) \quad (أ)$$

## التمرين الثالث: ( 04 نقاط)

5) المتتالية العددية المعرفة بحدها الأول  $u_0 = 0$  والعلقة التراجعية:

1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_n < \sqrt{2}$

2) بين أن المتتالية  $(u_n)$  متزايدة، ثم استنتج أنها متقاربة وأحسب

3) لتكن المتتالية  $(v_n)$  المعرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  كما يلي:

أ) بين أن المتتالية  $(v_n)$  حسابية يطلب تعين أساسها وحدتها الأول.

ب) أكتب  $v_n$  بدلالة  $n$  ، واستنتج عباره  $w_n$  بدلالة  $n$  .

(4) لتكن المتالية  $(w_n)$  المعرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $w_n = \ln(u_n)$  ، ولتكن المجموع :

$$S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$$

$$S_n = \frac{1}{2}n \ln 2 - \ln(n+1)$$

#### التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي: تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد المتتجانس  $(\vec{O}; \vec{i}, \vec{j})$  (كما في الشكل المقابل)

(1) احسب  $g(1)$

(2) بقراءة بيانية عين إشارة  $g(x)$  ثم استنتاج إشارة  $g(-x)$  حسب قيم العدد الحقيقي  $x$ .

(II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  كما يلي:

$$f(x) = e^{-x} - 2 - \frac{e}{x}$$

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد المتتجانس  $(\vec{O}; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) احسب النهايات الآتية:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ، ثم فسر النتائج هندسيا

(2) بين أن المنحنى  $(\gamma)$  الذي معادلته:  $y = e^{-x} - 2$  والمنحنى  $(C_f)$  متقاربان بجوار  $+\infty$  و  $-\infty$  ، ثم ادرس وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(\gamma)$


(3) بين أنه: من أجل كل عدد حقيقي  $x$  غير معروف لدينا:

$$f'(x) = \frac{-g(-x)}{x^2}$$

(4) استنتاج أن الدالة  $f$  متزايدة تماما على كل من المجالين  $[0; -1]$  و  $[0; +\infty)$  ومتناقصة تماما على المجال  $[-\infty; -1]$  ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$

(5) بين كيف يمكن إنشاء المنحنى  $(\gamma)$  انطلاقا من منحنى الدالة  $e^x \rightarrow x$  ، ثم ارسم بعناية كلا من المنحنيين  $(\gamma)$  و  $(C_f)$  في نفس المعلم السابق

(III) احسب  $A$  مساحة الحيز المحدد بـ  $(C_f)$  و  $(\gamma)$  والمستقيمات ذات المعادلات  $x = e^2$  و  $x = e^2$



انتهى الموضوع الثاني