



التمرين الثالث: (50 نقاط)

يتكون مكتب للدراسات من 20 مهندساً ومهندسة يتوزعون حسب الجنس والتخصص كما هو مبين في الجدول أدفله.

الإناث	الذكور	التخصص
3	5	الإعلاميات
4	8	الهندسة المدنية

تم اختيار ثلاثة عناصر من هذا المكتب عشوائياً وفي آن واحد للمشاركة في إحدى الدورات التكوينية.

نعتبر الحادفين A : " العناصر التي وقع عليها الاختيار كلها من الإناث " .

و B : " العناصر التي وقع عليها الاختيار كلها من نفس التخصص " .

$$(1) \text{ بين أن: } P(A) = \frac{7}{228} \quad \text{ثم احسب: } P(B) \text{ و } P(A \cap B).$$

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد تخصصات العناصر التي وقع عليها الاختيار.

$$\textcircled{P} \text{ بين أن: } p(X=1) = \frac{69}{285} \quad \text{ثم استنتج قانون احتمال المتغير العشوائي } X.$$

\textcircled{B} احسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على \mathbb{R} بـ :

$$(1) \text{ أ) احسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x).$$

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

ج) بين أن المعادلة $0 = g(x)$ تقبل حلًا وحيداً α حيث: $-0,7 < \alpha < -0,8$. ثم استنتاج إشارة (g) على \mathbb{R} .

(II) لتكن f الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} بـ :

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجلانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$$(1) \text{ احسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

3) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x+x)$ ثم استنتاج أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) يطلب تعين معادله له.

ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

ج) اكتب معادلة L (C_f) مماس (T) الموازي للمستقيم (Δ) .

4) ارسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $[-\infty; 1]$ (يعطى $f(\alpha) \approx -0.7$).

5) الدالة المعرفة على \mathbb{R} كما يلي: $h(x) = |x| \left(e^{|x|-2} - 1 \right) + 1$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ) بين أن الدالة h زوجية.

ب) تأكّد أنه من أجل كل x من المجال $[0; +\infty)$ فإن: $h(x) = f(x-2)+1$.

ج) اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقاً من (C_f) ثم ارسم (C_h) على المجال $[-3; 3]$. 

انتهي الموضوع الأول






الموضوع الثاني



التمرين الأول: (04 نقاط)

كيسي يحوي 9 كريات لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي:

خمس كريات حمراء مرقمة بـ: 1, 2, 2, 1, 1 وثلاث كريات خضراء مرقمة بـ: 3, 2, 3 وكرية بيضاء مرقمة بـ: -1. نسحب عشوائياً 4 كريات في آن واحد.



(1) احسب احتمال الحوادث التالية:

A : "الحصول على أربع كريات من نفس اللون".

B : "الحصول على كرينة بيضاء على الأكثر".

C : "الحصول على أربع كريات مجموع أرقامها معديوم".

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب أكبر الأرقام المحصل عليها.

Ⓐ عين قيم المتغير العشوائي X ثم عرف قانون احتماله.

Ⓑ احسب الأمل الرياضي ($E(X)$) للمتغير العشوائي X .

Ⓒ احسب احتمال الحادثة: " $X^2 - X > 0$ ".

التمرين الثاني: (05 نقاط)

(I) حل في مجموعة الأعداد المركبة C المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(z+1-\sqrt{3})(z^2 + 2z + 4) = 0$.

(II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

نعتبر النقط A ، B ، C و D التي لواحقها: $z_D = 4i$ و $z_C = \bar{z}_B$ ، $z_B = -1 - i\sqrt{3}$ ، $z_A = -1 + \sqrt{3}$.

(1) اكتب z_B و z_D على الشكل الأسي ثم استنتج الشكل الأسي للعدد z_C .

Ⓑ عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $(z_C - z_B)^n$ عدداً حقيقياً.

(2) بين أن $(z_B - z_A) = i(z_C - z_A)$ ثم استنتاج طبيعة المثلث ABC واحسب مساحته.

Ⓑ استنتاج أن: B هي صورة C بدوران π يطلب تعين عناصره المميزة.

(3) اكتب على الشكل الجبري العدد المركب L حيث $L = \frac{z_C - z_A}{z_C}$.

$$(4) \text{ بين أن: } L = \frac{\sqrt{6}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$$

(5) مجموعة النقط M من المستوى، ذات اللاحقة z حيث: $\arg(z+4) = \frac{\pi}{4}$

- تحقق أن النقطة D تنتمي إلى (Γ) ، ثم عين المجموعة (Γ) .

عبد الرحمن
أحمد
العنود



التمرين الثالث: (04 نقاط)

(1) متالية عدديّة معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n :

$$\cdot v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2} \quad \text{ولتكن المتالية } (v_n) \text{ المعرفة من أجل كلّ عدد طبيعي } n \text{ بـ:}$$

(1) بين أنَّ المتالية (v_n) هندسية يطلب تعين أساسها q وحدّها الأول v_0 .

(2) عُبّر بدلالة n عن عبارة الحد العام v_n .

(3) استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) احسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

(5) تحقق أنَّ $(S_n) = \frac{1}{u_n + 2} = \frac{1}{3}(1 - v_n)$ وذلك من أجل كلّ عدد طبيعي n .

(6) استنتاج بدلالة n المجموع: $S_n' = \frac{1}{u_0 + 2} + \frac{1}{u_1 + 2} + \dots + \frac{1}{u_n + 2}$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) نعتبر الدالة العدديّة g المعرفة على المجال $[0; +\infty)$ بـ:

(1) أ- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

ب- ادرس اتجاه تغيير الدالة g على المجال $[0; +\infty)$ ثم شكل جدول تغييراتها.

(2) بين أنَّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيداً α حيث $3,5 < \alpha < 3,6$.

(3) استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $[0; +\infty)$.

(II) نعتبر الدالة العدديّة f المعرفة على المجال $[0; +\infty)$ بـ: تمثيلها البياني

(1) بين أنَّ (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين معادلتيهما $x = 0$ و $y = 0$.

(2) أ- برهن أنَّه من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty)$:

ب- ادرس اتجاه تغيير الدالة f على المجال $[0; +\infty)$ ، ثم شكل جدول تغييراتها.

ج- اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

د- احسب $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ ، فسر النتيجة هندسيا.

(3) بين أنَّ $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$ ، ثم ارسم (C_f) .

(4) نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي الموجب تماماً x و m وسيط حقيقي:

$$\cdot x^2 + x - 2m(x + 1) = \ln(x^2) \dots (E)$$


أ- تتحقق أنَّ المعادلة (E) يؤول حلها إلى حل المعادلة: $f(x) = \frac{1}{2}x - m$.

ب- عين بيانياً قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلّين متمايزين.

(5) h هي الدالة المعرفة على \mathbb{R}^* كما يلي: $h(x) = \frac{\ln|x|}{-|x|-1}$ و (C_h) منحناها البياني في المستوى.

أ- بين أنَّ الدالة h زوجية.

ب- ارسم في نفس المعلم المنحنى (C_h) مستعيناً بالمنحنى (C_f) .



انتهى الموضوع الثاني 