

## وزارة التربية الوطنية

ثانويات المقاطعة الأولى  
دورة ماي 2022

مديرتي التربية لولايي أدرار و تميمون  
الشعبة : تقني رياضي

المدة : أربع ساعات ونصف

امتحان البكالوريا التجريبي في مادة الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :  
الموضوع الأول :

التمرين الأول : (03 نقاط)

أجب بصرح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات التالية:

(1)  $(u_n)$  متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  بـ:  $u_n = \int_n^{n+1} e^{1-x} dx$

المجموع  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$  يساوي  $e - \left(\frac{1}{e}\right)^n$

(2) من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $4^{2n} + (-1)^{n+1} \equiv 0 [17]$

(3) باستعمال المكاملة بالتجزئة نجد أن :  $\int_1^e x \ln x dx = \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{2}$

(4)  $N$  عدد طبيعي يكتب في نظام التعداد ذو الأساس 7 على الشكل  $\overline{5616}^7$ .

كتابة العدد الطبيعي  $N$  في نظام التعداد ذو الأساس 5 هي:  $\overline{31042}^5$

التمرين الثاني : (05 نقاط)

نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  
$$\begin{cases} u_0 = 11 \\ u_{n+1} = 2 + \sqrt{u_n - 2} \end{cases}$$

(1) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $3 \leq u_n \leq 11$

(2) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 2} (1 - \sqrt{u_n - 2})$

ب) بين أن المتتالية  $(u_n)$  متناقصة تماما ، ثم استنتج تقاربها .

(3) أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $0 \leq u_{n+1} - 3 \leq \frac{1}{2}(u_n - 3)$

ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $0 \leq u_n - 3 \leq 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n$  ثم استنتج  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

(4) لتكن  $(v_n)$  المتتالية العددية المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  $v_n = \ln(u_n - 2)$

أ) بين أن المتتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $\frac{1}{2}$  يطلب تعيين حدها الأول  $v_0$ .

ب) اكتب كلا من  $v_n$  و  $u_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  مرة ثانية.

(5) احسب المجموع  $S$  حيث  $S = v_{1443} + v_{1444} + \dots + v_{2022}$

ثم استنتج الجداء  $P$  حيث  $P = (u_{1443} - 2) \times (u_{1444} - 2) \times \dots \times (u_{2022} - 2)$

التمرين الثالث : (04 نقاط)

نعتبر المعادلة ذات المجهولين الصحيحين  $x$  و  $y$  حيث :  $11x - 5y = 2 \dots \dots (E)$

(1) أ) أثبت أنه إذا كانت الثنائية  $(x; y)$  من  $\mathbb{Z}^2$  حلا للمعادلة  $(E)$  فإن :  $y \equiv 4 [11]$

(ب) استنتج حلول المعادلة (E) .

(2) ليكن  $n$  عددا طبيعيا غير معدوم . نضع :  $a = 5n + 2$  و  $b = 11n + 4$

(أ) عين القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين  $a$  و  $b$

(ب) عين قيم  $n$  بحيث يكون  $PGCD(a; b) = 2$

(ج) استنتج قيم  $n$  بحيث يكون العددين  $a$  و  $b$  أوليين فيما بينهما .

(3) (أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي غير المعدوم  $n$  بواقي القسمة الإقليدية للعدد  $2^n$  على 10

(ب) استنتج رقم أحاد العدد  $2^{2016}$

(ج) عين كل الثنائيات  $(x; y)$  من  $\mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$  التي هي حلول للمعادلة (E) وتحقق :  $2^{y-2x} \equiv 8[10]$

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على المجال  $[0; +\infty[$  كمايلي:  $g(x) = x + 2 - e^x$

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  على المجال  $[0; +\infty[$  .

(2) (أ) بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  على المجال  $[0; +\infty[$ ، وتحقق أن :  $1,14 < \alpha < 1,15$  .

(ب) استنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم العدد الحقيقي  $x$  من المجال  $[0; +\infty[$

(II) نعرف على المجال  $[0; +\infty[$  الدالة العددية  $f$  كمايلي :

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{xe^x + 1}$$

( $C_f$ ) المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  الوحدة  $\|\vec{i}\| = 4Cm$

(1) (أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $[0; +\infty[$  :  $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}}$

(ب) استنتج النهاية  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) (أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $[0; +\infty[$  :  $f'(x) = \frac{e^x \times g(x)}{(xe^x + 1)^2}$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  على  $[0; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها على نفس المجال

(ج) بين ان :  $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha + 1}$ ، ثم استنتج حصرا للعدد  $f(\alpha)$  .

(3) اكتب معادلة المماس ( $T$ ) للمنحنى ( $C_f$ ) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

(4) (أ) تحقق أنه من أجل كل  $x$  من  $[0; +\infty[$  :  $f(x) - x = \frac{(x+1) \times u(x)}{xe^x + 1}$ ، حيث  $u(x) = e^x - xe^x - 1$

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة  $u$  على المجال  $[0; +\infty[$  ثم احسب  $u(0)$  واستنتج إشارة  $u(x)$  .

(ج) استنتج وضعية المنحنى ( $C_f$ ) بالنسبة إلى المستقيم ( $T$ )

(5) انشئ كلا من المستقيم ( $T$ ) والمنحنى ( $C_f$ ) (الوحدة  $4Cm$ )

(6) (أ) عين دالة أصلية  $F$  للدالة  $f$  على المجال  $[0; +\infty[$  .

(ب) احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنى ( $C_f$ ) و المماس ( $T$ ) و محور الترتيب و المستقيم ذا المعادلة

$$x = 1$$

## الموضوع الثاني :

التمرين الأول: (03 نقاط)

$f$  و  $g$  دالتان معرفتان على  $\mathbb{R}$  ب:  $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$  و  $g(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$  ، و  $F$  و  $G$  دالتاهما الأصليتان على  $\mathbb{R}$  .

$$I_2 = \int_0^1 g(x) dx \quad , \quad I_1 = \int_0^1 f(x) dx \quad \text{و نعتبر}$$

في كل حالة من الحالات التالية عين الإقتراح الصحيح الوحيد من بين الإجابات (أ) ، (ب) و (ج) مع التعليل:

$$F(x) = \ln(1+x^2) \quad (\text{أ}) \quad F(x) = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \quad (\text{ب}) \quad F(x) = 2 \ln(1+x^2) \quad (\text{ج}) \quad (1)$$

$$I_1 = \ln(2) \quad (\text{أ}) \quad I_1 = \frac{1}{2} \ln(2) \quad (\text{ب}) \quad I_1 = 2 \ln(2) \quad (\text{ج}) \quad (2)$$

$$I_1 + I_2 = \int_0^1 x dx \quad (\text{أ}) \quad I_1 + I_2 = \frac{1}{2} \int_0^1 x dx \quad (\text{ب}) \quad I_1 + I_2 = 2 \int_0^1 x dx \quad (\text{ج}) \quad (3)$$

$$I_2 = 1 - \ln(2) \quad (\text{أ}) \quad I_2 = 1 - \frac{1}{2} \ln(2) \quad (\text{ب}) \quad I_2 = \frac{1}{2} (1 - \ln(2)) \quad (\text{ج}) \quad (4)$$

التمرين الثاني: (05 نقاط)

(I)  $(u_n)$  المتتالية العددية المعرفة بعدها الأول  $u_0$  حيث  $u_0 = \alpha$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$

. عين قيمة العدد الحقيقي  $\alpha$  بحيث تكون المتتالية  $(u_n)$  ثابتة على  $\mathbb{N}$

(II) في ما يلي نضع  $u_0 = 0$

(1) عين العدد الحقيقي  $b$  بحيث يكون من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_{n+1} = 1 + \frac{b}{u_n + 3}$

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $-1 < u_n \leq 0$

(3) (أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n + 1)^2}{u_n + 3}$  ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  .

(ب) استنتج أن المتتالية  $(u_n)$  متقاربة .

(4) نعتبر المتتالية  $(v_n)$  المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية  $\mathbb{N}$  ب:  $v_n = \frac{1}{u_n + 1}$

(أ) بين أن المتتالية  $(v_n)$  حسابية أساسها  $\frac{1}{2}$  و احسب حدها الأول  $v_0$

(ب) اكتب عبارة  $v_n$  بدلالة  $n$  ، ثم استنتج عبارة  $u_n$  بدلالة  $n$  واحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  .

(5) احسب المجموع  $S$  حيث  $S = \frac{8}{u_0 + 1} + \frac{8}{u_1 + 1} + \dots + \frac{8}{u_{2022} + 1}$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

(1) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي القسمة الإقليدية للعدد  $3^n$  على 10

(2) بين انه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $1443^{4n+2} - 2 \times 109^{2n+1} - 11 \equiv 0 [10]$

(3) عيّن قيم العدد الطبيعي  $n$  حيث  $7 \times 3^{n+1} - 1 \equiv 0 [10]$  و  $10 < n \leq 25$

(4) ليكن  $A$  كتابته  $xx02102$  في النظام ذي الأساس 3 و كتابته  $y67y$  في النظام ذي الأساس 9 .  
(أ) عيّن  $x$  و  $y$  (ب) اكتب  $A$  في النظام العشري (ج) اكتب  $A$  في النظام ذي الأساس 7

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I)  $h(x) = x^2 - \ln x^2$  دالة عددية ذات المتغير الحقيقي  $x$  و المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  ب:

• ادرس اتجاه تغير الدالة  $h$  ، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $\mathbb{R}^*$  :  $h(x) > 0$

(II) نعرف على  $\mathbb{R}^*$  الدالة العددية  $f$  كمايلي :

$$f(x) = \frac{1}{2} \left( -\frac{\ln(x^2)}{x} - x - \frac{2}{x} \right)$$

وليكن  $(C_f)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) (أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(ب) احسب  $\lim_{x \leq 0} f(x)$  و  $\lim_{x \geq 0} f(x)$  ثم فسر النتيجةين بيانيا

(2) (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  غير معدوم:  $f'(x) = -\frac{h(x)}{2x^2}$

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها.

(ج) بيّن أن المستقيم  $(\Delta)$  ذا المعادلة :  $y = -\frac{1}{2}x$  مستقيم مقارب للمنحنى  $(C_f)$  ثم ادرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة لـ  $(\Delta)$  .

(3) (أ) تحقق أنه من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}^*$  :  $-x \in \mathbb{R}^*$  و  $f(x) + f(-x) = 0$  و تستنتج شفعية الدالة  $f$  .

(ب) بيّن أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  في المجال  $]0, 3[; 0, 4[$  .

(ج) استنتج أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا آخر  $\beta$  يطلب تعيين حصر له .

(4) (أ) بيّن أن المنحنى  $(C_f)$  يقبل مماسين  $(T_1)$  و  $(T_2)$  يوازيان المستقيم  $(\Delta)$  يطلب كتابة معادلتيهما .

(ب) انشئ  $(\Delta)$  ،  $(T_1)$  ،  $(T_2)$  و  $(C_f)$

(ج) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد و إشارة حلول المعادلة :  $f(x) = -\frac{1}{2}x + m$

(5) لتكن  $k$  دالة عددية معرفة على  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  ب:  $k(x) = \frac{1}{2} \left( -\frac{\ln(x+1)^2}{x+1} - (x+1) - \frac{2}{x+1} \right) + 2$  ،  $(C_k)$  تمثيلها البياني

⊕ بيّن أنه يوجد تحويل بسيط يحول المنحنى  $(C_f)$  إلى المنحنى  $(C_k)$  (الإنشاء غير مطلوب)

(6) (أ) بيّن أن الدالة  $F$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  ب:  $F(x) = \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4} [\ln(x^2)]^2 - 2 \ln|x| \right)$  هي دالة أصل لـ  $f$  على  $\mathbb{R}^*$

(ب)  $\lambda$  عدد حقيقي حيث  $\lambda > 1$  . احسب التكامل التالي  $A(\lambda) = -\int_1^\lambda f(x) dx$  و احسب  $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$