


عالج أحد الموضوعين على الخيار

الموضوع الأول

التمرين الأول: (8ن)

تحقق المحافظة على الذات من خلال اقصاء اللادات نتيجة تدخل خلابا مناعية نوعية وجزئيات بروتينية متخصصة. يبين الشكل (أ) من الوثيقة (1) صورة بالمجهر الإلكتروني تبين نشاط خلية مناعية بعد دخول فيروس إلى العضوية، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل رسم تفسيري للشكل (ب).




- 1- تعرف على البيانات المرقمة من الشكل (ب) للوثيقة (1)
2- عرف الذات واللادات.
 - 3- حدد نمط الاستجابة المناعية المعنية ثم سم المراحل الموضحة في الوثيقة (1).
 - 4- بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومعارفك السابقة، بين في نص علمي آلية حدوث الاستجابة المناعية للقضاء على الخلية المصابة بالفيروس.
- التمرين الثاني: (12 ن)
- من أجل التعرف على مختلف الظواهر المرتبطة بالتعبير المورثي، ودراسة بعض خصائص الأحماض الأمينية نقترح ما يلي:

الجزء الأول:


يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسمًا تخطيطيًا يوضح بعض تفاصيل تركيب البروتين في الخلية، أما الشكل (ب) فيمثل رسمًا تفصيليًا للجزء المؤطر في الشكل (أ)، أما الشكل (ج) فيمثل جدول القاعدة.

| القاعدة الأولى | القاعدة الثانية | القاعدة الثالثة | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---|
| U | U C A G | U | | | |
| Phe | Ser | Tyr | Cys | Cys | |
| Phe | Ser | Tyr | Cys | Cys | |
| Leu | Ser | ~~~ | ~~~ | A | |
| Leu | Ser | ~~~ | Trp | G | |
| C | Leu | Pro | His | Arg | U |
| | Leu | Pro | His | Arg | C |
| | Leu | Pro | Gln | Arg | A |
| | Leu | Pro | Gln | Arg | G |
| A | Ile | Thr | Asn | Ser | U |
| | Ile | Thr | Asn | Ser | C |
| | Ile | Thr | Lys | Arg | A |
| | Met | Thr | Lys | Arg | G |
| G | Val | Ala | Asp | Gly | U |
| | Val | Ala | Asp | Gly | C |
| | Val | Ala | Glu | Gly | A |
| | Val | Ala | Glu | Gly | G |



الشكل (ب)

الوثيقة (1)



الشكل (أ)

الشكل (ج)

الوثيقة (1)

الشكل (أ)

1. سُمِّيَا الظاهرين (س) و(ص)، ثم تعرَّف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8.

2. حدد أهمية العنصر 1، مع اقتراح تجربة تبيَّن ذلك.


3. العنصر 7 ذو أهمية كبيرة في التعبير المورثي.

أ. ذكر دور هذا العنصر.

ب. مثُل التتابع النيوكليوتيدي لهذا العنصر والمورثة التي تشرف على تركيبه.

الجزء الثاني:

يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (2) الصيغ نصف المفصلة لجذور ثلات أحماض أمينية أما الشكل (ب) فيمثل نتائج الهجرة الكهربائية لها.



1. صنف الأحماض الأمينية المبينة في الشكل (أ)، مع التعليل.

2. أنساب إلى البقع α ، β ، γ الأحماض الأمينية الممثلة في الشكل (أ).

3. مثُل الصيغ الشاردية للأحماض الأمينية الثلاثة في pH الوسط.

4. مثُل بمعادلة كيميائية ارتباط ثلاثي الببتيد التالي: $\text{R}-\alpha-\beta-\gamma-$.

الجزء الثالث:


- اعتماداً على معلوماتك ومما سبق قدَّم رسمًا تخطيطيًا يوضح مراحل التعبير المورثي.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني:

التمرين الأول: (7ن)


يمر تركيب البروتينات بالآليات محددة ومنظمة، ولإبراز ذلك نقترح الدراسة التالية:
تمثل الوثيقة (1) مراحل تركيب البروتين عند خلية حقيقة النواة.



- 1-تعرف على البيانات المرقمة وسم المراحلتين (أ) و(ب).
- 2-حدد في جدول العناصر الضرورية لحدوث كل من المرحلة (أ) والمرحلة (ب) ودور كل عنصر.
- 3-أحسب عدد الوحدات البنائية في العنصر 6 الوظيفي إذا كان عدد النيكليلوتيدات في العنصر 3 يساوي 327.
- 4-بين في نص علمي كيف يتحكم العنصر 7 في تحديد البنية الفراغية للعنصر 6.

التمرين الثاني: (13ن)

يعرض دخول بعض المستضدات إلى العضوية على إنتاج عناصر دفاعية ذات طبيعة بروتئينية تساهم في إقصائها وذلك بتدخل أنواع مختلفة من الخلايا المتخصصة، لمعرفة شروط إنتاج هذه العناصر نقترح الدراسة التالية:
I- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 تطور أحد أنواع الخلايا المناعية على مستوى طحال فأر بعد فترة من حقنه بمستخلصات الجدار الخلوي لبكتيريا، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة البنية ثلاثية الأبعاد لأحد العناصر الدفاعية السارية في مصله.



بالمقابل تسمح إضافة نفس المستخلصات من الجدار الخلوي لهذه البكتيريا إلى مزرعة بها خلايا مناعية مأخوذة من طحال الفأر السابق بتسجيل الملاحظات التالية: أ) غنى الوسط بالعناصر (C).

- ب) زيادة كثافة ADN عند بعض الخلايا المناعية.
 ج) زيادة كثافة ARN عند بعض الخلايا المناعية.
 د) تغيرات بنوية للخلايا المناعية كما في الشكل (أ) من الوثيقة (1).
 1 - أ) تعرف على العناصر (A,B,C) والبيانات الموافقة للأرقام.
 ب) رتب الملاحظات المسجلة في وسط الزرع وفق تسلسلها الزمني.
 2-أ) بين برسن تخطيطي عليه البيانات بنية العنصر (C).
 ب) حدد الخلية المنتجة للعنصر (C)، علّ.
 II- تم استئصال الغدة السعترية (التيروسية) لفستان ثم عرضت للأشعة السينية (X) المخربة للنخاع العظمي ثم ورأت في مجموعات. الشروط والنتائج التجريبية ممثلة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 2.
 ومن أجل فهم أكثر للنتائج الواردة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 2 أجرت تجربة ثانية، تتمثل في وضع خلايا لمفافية محسنة بمستضد منحل. التجربة ونتائجها ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

| المجموعة 5 لم تلق أي المعالجة من قبل | | استئصال الغدة التيروسية ثم التعرض للإشعاع | | | | | المعالجة |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------|
| المجموعة 4 حقن خلايا لمفافية T و B | المجموعة 3 حقن خلايا لمفافية T و B | المجموعة 2 حقن خلايا لمفافية T | المجموعة 1 حقن خلايا لمفافية B | حقن الـ GRM | بعد أسبوع من الحقن | | |
| نعم | لا | نعم | نعم | نعم | حقن الـ GRM | | |
| قطرة من مصل الفأر + الـ GRM | | | | | | بعد أسبوع من الحقن | |
| +++++ | ----- | +++++ | ----- | ---+-- | GRM | ترافق | |

الشكل (أ)

| تركيز الأجسام المضادة | طبيعة اللمفافيات الموضوعة في الغرفة | | | التجارب | غرفة علوية |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------|---|
| | الغرفة السفلية | الغرفة العلوية | | | غرفة سفلية |
| +++++ | لمفافيات T و B | لا توجد | 1 | | وسط الزرع بـ المستضد المنحل |
| --+-- | لمفافيات B | لا توجد | 2 | | شلاء نفوذ للجزيئات وغير نفوذ للخلايا |
| +++++ | لمفافيات B | لمفافيات T | 3 | | Marbrook |
| ----- | لمفافيات T | لا توجد | 4 | | |

الشكل (ب)

- 1-أ) علّ استئصال الغدة التيروسية وتخرّب النخاع العظمي لفستان.
 ب) فسر النتائج التجريبية المحصل عليها في الشكل (أ)، استنتج العلاقة بين الخلايا اللمفافية.
 2-أ) تأكّد من العلاقة بين الخلايا اللمفافية بتشريح للنتائج التجريبية الممثلة في الشكل (ب).
 ب) استنتاج معلومة إضافية تدعم تلك العلاقة.
 III- انطلاقاً مما توصلت إليه و مكتباتك وضح برسن تخطيطي وظيفي شروط إنتاج الجزيئات الدفاعية.

انتهى الموضوع الثاني

بالتفصيق في شهادة البكالوريا

| العلامة | | الموضوع الأول |
|---------|---------|---|
| الكلية | الجزئية | |
| 8 | 2 | <p>التمرين الأول:</p> <p>1- تعريف الذات و اللادات: تعرف الذات بمجموع الجزيئات الخاصة بالفرد و المحمولة على أغشية خلايا الجسم، تتعدد جزيئات الذات وراثيا و هي تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية وتعرف بنظام CMH ونظام ABO ونظام Rh.</p> <p>تعريف اللادات: تعرف اللادات بمجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية و التفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليه.</p> <p>2- نمط الاستجابة المناعية المعنية : المناعة الخلوية</p> <p>المرحلة الموضحة في الوثيقة (1) : مرحلة التنفيذ</p> <p>3- البيانات المرقمة:</p> <p>1- خلية مصابة بالفيروس CD8-5 TCR-4 CMH I-3 LTc 6- بببتيد مستضدي</p> <p>7- حويصل البرفورين</p> <p>4- النص العلمي : إن العضوية في تماس دائم مع المحيط الغني بالمستضدات التي قد تغزوها بسهولة فتستجيب لها العضوية بآليات دفاعية معينة ذكر منها الرد المناعي الخلوي، الذي تتوسطه صنف ثان من الخلايا المفاوية هي الخلايا المفاوية T السامة (LTc) فما هي آلية تخريب LTc للخلية المصابة ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> - تتعرف الخلايا LT8 على الخلية المصابة تعرفا مزدوجا (تعرف على HLA والبببتيد المستضدي) فتنشط و تتكاثر وتعطي لمة من الخلايا LT8 التي تتميز إلى خلايا لمفاوية تائية سامة LTc تمتلك نفس المستقبل الغشائي الثاني . - تعرف الخلايا المفاوية التائية السامة LTc على المستضد النوعي بواسطة مستقبلاتها الغشائية TCR التي تتكامل مع المعد CMH - بببتيد مستضدي للخلية المصابة (تعرفا مزدوج) - يؤدي تماس الخلية المفاوية (LTc) مع الخلية المصابة إلى إفراز بروتين البرفورين مع بعض الإنزيمات الحالة (الغرانزيم) من طرف الخلية المفاوية (LTc) - يتوضع البرفورين على غشاء الخلية المصابة مشكلة قنوات حلولية تسمح بدخول الماء و الشوارد محدثة صدمة حلولية يؤدي إلى انحلالها (تخريبيها) . - يتم التخلص من الخلايا المخربة عن طريق ظاهرة البلعمة <p>إن دخول الجسم الغريب إلى العضوية يحرضها على رد مناعي قد يكون خلويًا حيث تتعرف على المستضد فتنشط الخلايا المفاوية التائية المحسنة بالمستضد على التكاثر والتمايز إلى خلايا سامة قادرة على إقصاء المستضد .</p> |
| 1 | | |
| 1.75 | | |
| 3.25 | | |

التمرين الثاني:

الجزء الأول:

1. **تسمية الظاهرتين:** س: الاستنساخ. ص: الترجمة.
 - كتابة البيانات المرقمة: 1- إنزيم ARN بوليميراز 2- مورثة. 3- رابطة بيئية. 4- حمض آمني.
 - أهمية إنزيم ARN بوليميراز : تركيب ARN_m انطلاقاً من نسخ المورثة.
 - تجربة تبين أهمية إنزيم ARN بوليميراز:
 - في وسط تجاري يتوفر على جميع متطلبات عملية الاستنساخ، تستعمل مثبط نوعي لإنزيم ARN بوليميراز ($-\alpha$ امانينتين) بتراكيز متزايدة وتقيس نسبة تشكيل ARN_m في الوسط.
 - الملاحظة: نلاحظ تناقص نسبة تشكيل ARN_m حتى تندم بزيادة تركيز المثبط في الوسط.
 - يدل هذا على تناقص عملية الاستنساخ حتى توقف.
 - النتيجة: يعمل إنزيم ARN بوليميراز على تشكيل ARN_m انطلاقاً من نسخ المورثة.
3. **أ/ دور ARN_m :** حامل ونقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى.
- ب/ تمثيل التتابع النوكليويدي له:**
- | | |
|---------------------|---------------|
| AUG AAG GAC GCU UAA | الـ ARN_m : |
| ATG AAG GAC GCT TAA | المورثة: |
| TAC TTC CTG CGA ATT | |

الجزء الثاني:

1. **تصنيف الأحماض الأمنية:**
 - الـ R1 : من الأحماض الأمنية القاعدية (الأمنية).. التعيل: جذره يحتوي على وظيفة قاعدية NH_2 .
 - الـ R2: من الأحماض الأممية المتعادلة.. التعيل: لا يحتوي جذره لا على وظيفة كربوكسيلية ولا وظيفة قاعدية.
 - الـ R3: من الأحماض الأممية الحامضية.. التعيل: جذره يحتوي على وظيفة كربوكسيلية $COOH$.
 2. **تحديد البقع α , β , γ :**


| | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| $R3 - \gamma$. | $R2 - \beta$. | $R1 - \alpha$. |
|-----------------|----------------|-----------------|

 3. **تمثيل الصيغ الشاردية للأحماض الأممية في $pH = 5$:**
- $R1$
 $NH_3^+ - CH - COOH$
 $(CH_2)_4$
 NH_3^+


$R2$
 $NH_3^+ - CH - COOH$
 CH_2
 CO
 NH_2

$R3$
 $NH_2 - CH - COO^-$
 CH_2
 COO^-

4. تمثيل المعادلة الكيميائية لارتباط ثلاثي البيتيد:



2.25



رسم تخطيطي يوضح مراحل التعبير المورثي

| الكلية | الgrzية | الموضوع الثاني | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---------|------------------|-------|-------------|--|--|-------------|---|---|
| العلامة | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.5 | <p>التمرين الأول:</p> <p>١- كتابة البيانات الموافقة :</p> <p>١- وعاء دموي أو شعيرة دموية ٢- أحماض أمينية ٣- ARNm- ٤- الشبكة الهيولية الداخلية الفعالة ٥- تحت وحدة كبرى للريبوزوم ٦- سلسلة بيتيدية ٧- ADN- ٨- تحت وحدة صغرى للريبوزوم -تسمية المرحلتين: المرحلة (أ): مرحلة الاستساخ المرحلة (ب): مرحلة الترجمة.</p> <p>٢- العناصر الضرورية لكل مرحلة و دورها:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المرحلة</th> <th>العناصر الضرورية</th> <th>دورها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المرحلة (أ)</td> <td>-المورثة (ADN) -إنزيم ARN بوليميراز - طاقة</td> <td>-حاملة للمعلومة الوراثية. -استساخ الد ARN إلى ADN من ARNm) انطلاقاً من السلسلة المستنسخة. -تستهلك أثناء الاستساخ ARNm) -وحدات بنائية لـ ARN</td> </tr> <tr> <td>المرحلة (ب)</td> <td>ARNm- -الأحماض الأمينية -الريبوزومات ARNt- - طاقة -إنزيمات نوعية</td> <td>-نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى. -وحدات بنائية للبروتين -قراءة رموز ARNm وترجمتها إلى أحماض أمينية -ينقل الأحماض الأمينية إلى الريبوزوم. -تستهلك أثناء مراحل الترجمة كتشييط الأحماض الأمينية - تتدخل أثناء تشويط الأحماض الأمينية</td> </tr> </tbody> </table> <p>٣- حساب عدد الوحدات البنائية لمتعدد الببتيد يساوي عدد النيكليوتيديات ناقص (رمزة البداية + رمزة النهاية) / ٣ //</p> $= 3/(3+3) = 3/321 = 107 = 327 - 3 حمض أميني$ <p>٤- النص العلمي : يتحكم الد ADN في تحديد البنية الفراغية للبروتين</p> <p>- الد (ADN المورثة) هو الداعمة الجزيئية للمعلومة الوراثية مشفرة بتتالي ثلاثيات نيكليوتيدية لغتها محددة بأربعة أنواع من النيوكليوتيديات (A.T.C.G).</p> <p>- أثناء الاستساخ تتشكل نسخة وفق ترتيب و عدد الثلاثيات في ADN إلى ترتيب و عدد من الرموز على مستوى الد ARNm.</p> <p>- ينتقل الد ARNm إلى الهيولى حيث تعمل الريبوزومات على ترجمة رموزه إلى أحماض أمينية لتشكيل سلسلة بيتيدية .</p> <p>- تكتسب السلسلة الببتيدية بنية فراغية خاصة محددة بعدد ، نوع و ترتيب الأحماض الأمينية بفضل الروابط الكيميائية التي تنشأ بين السلسلتين الجانبيتين لبعض الأحماض الأمينية فيها.</p> | المرحلة | العناصر الضرورية | دورها | المرحلة (أ) | -المورثة (ADN) -إنزيم ARN بوليميراز - طاقة | -حاملة للمعلومة الوراثية. -استساخ الد ARN إلى ADN من ARNm) انطلاقاً من السلسلة المستنسخة. -تستهلك أثناء الاستساخ ARNm) -وحدات بنائية لـ ARN | المرحلة (ب) | ARNm- -الأحماض الأمينية -الريبوزومات ARNt- - طاقة -إنزيمات نوعية | -نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى. -وحدات بنائية للبروتين -قراءة رموز ARNm وترجمتها إلى أحماض أمينية -ينقل الأحماض الأمينية إلى الريبوزوم. -تستهلك أثناء مراحل الترجمة كتشييط الأحماض الأمينية - تتدخل أثناء تشويط الأحماض الأمينية |
| المرحلة | العناصر الضرورية | دورها | | | | | | | | | |
| المرحلة (أ) | -المورثة (ADN) -إنزيم ARN بوليميراز - طاقة | -حاملة للمعلومة الوراثية. -استساخ الد ARN إلى ADN من ARNm) انطلاقاً من السلسلة المستنسخة. -تستهلك أثناء الاستساخ ARNm) -وحدات بنائية لـ ARN | | | | | | | | | |
| المرحلة (ب) | ARNm- -الأحماض الأمينية -الريبوزومات ARNt- - طاقة -إنزيمات نوعية | -نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى. -وحدات بنائية للبروتين -قراءة رموز ARNm وترجمتها إلى أحماض أمينية -ينقل الأحماض الأمينية إلى الريبوزوم. -تستهلك أثناء مراحل الترجمة كتشييط الأحماض الأمينية - تتدخل أثناء تشويط الأحماض الأمينية | | | | | | | | | |
| 0.5 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | |

التمرين الثاني:


1- أ) التعرف على العناصر :

A : لمقاويم B ، B : خلية بلاسموسية (بلاسموسيت) ، C : جسم مضاد

البيانات الموقعة للأرقام: 1- ميتوكوندري 2- جهاز غولجي 3- هيولي 4- غشاء هيولي
5- شبكة هيولية فعالة 6- نواة

ب) ترتيب الملاحظات: ب ← د ← ج ← أ

2- أ) الرسم التخطيطي :



عنوان الرسم : رسم تخطيطي لبنيّة الجسم المضاد (لكل رسم و بيانه 0.25)

ب) الخلية المنتجة للجسم المضاد هي البلاسموسيت (الخلية B من الشكل (أ) ، الوثيقة 1)

التعليق : - كبر حجم النواة

- نمو الشبكة الهيولية و جهاز غولجي و الحويصلات الإفرازية

- تطور الميتوكوندري

- غشاء متوج

1-II-أ) يعلل تخريب النخاع العظمي و استئصال الغدة التيموسية : منع إنتاج و نضج الخلايا المقاويم عند الفران.

ب) تفسير النتائج التجريبية للشكل (ب)

- أفسر آثار التراص في المجموعة 1 بعدم تنشيط المقاويات B المحسنة

- أفسر غياب التراص في المجموعة 2 بغياب LB التي تتطور إلى بلاسموسيت منتجة للأضداد

- أفسر تراص GRM في المجموعة 3 بتنشيط LB من طرف LT

- أفسر غياب التراص في المجموعة 4 بغياب المستضد (GRM)

- أفسر حدوث التراص عند المجموعة 5 الشاهدة بتوفّر كل أنواع المقاويات و حدوث التعاون.

- استنتاج العلاقة : توجد علاقة تعاون بين المقاويات B و T

3- أ) التأكيد من العلاقة بتفسير النتائج التجريبية في الشكل (ب) :

- أفسر ظهور الأجسام المضادة بتركيز كبير في التجربة 1 بتواجد المقاويات B و T معا و حدوث تعاون بينهما.

- و أفسر غياب الأجسام المضادة في التجربة 2 بغياب المقاويات T و عدم تنشيط المقاويات B.

- أفسر ظهور أجسام مضادة بتركيز كبير في التجربة 3 بوجود تعاون بين B و T رغم وجودهما في غرفتين منفصلتين بغضّه نفوذ الجزيئات.


- أفسر عدم إنتاج الأجسام المضادة في التجربة 4 بغياب المقاويات B .
وهذا يؤكد علاقة التعاون بين المقاويات فيما بينها.

١ ب) استنتاج المعلومة الإضافية : يتم التعاون ؛ تنشيط المفاويات B عن طريق LT4 بواسطة جزيئات كيميائية A تنتشر في الوسط.

III- يتضمن الرسم التخطيطي عناصر الإجابة التالية:

- تحسيس الا LB و تعرف الا LT على محدد المستضد المقدم من قبل الخلايا العارضة.
- تشيط الا LT h الا LB المحسنة بواسطة الا IL2 .

- التكاثر السريع لـ LB المنشطة- تمايزها إلى بلاسموسينت منتجة للأجسام المضادة.



كل عنصر من الرسم و ما يقابلة من مؤشر على 1 نقطة

