




المستوى: الثالث ثانوي (علوم تجريبية) (3ASS)	ماي 2018
الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية	المدة: 3 ساعات


الموضوع الأول

التمرين الأول: (06 نقاط)


- 1- نذف جسما (s) نعتبره نقطة مادية من نقطة A تقع أسفل مستوي أملس يميل عن الأفق بزاوية α وفق خط الميل الأعظمي بسرعة v_A ، فيصل إلى النقطة O بسرعة قدرها v_0 كما هو مبين في الشكل (1).
- أ- مثل على الشكل جميع القوى المؤثرة على الجسم (s).
- ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم (s) أوجد عبارة تسارع الحركة على المسار AO.
- ت- ما طبيعة الحركة على المسار AO؟ علل إجابتك.
- 2- يمثل البيان (أ) تغيرات فاصلة القذيفة بدلالة الزمن، و يمثل البيان (ب) تغيرات سرعة القذيفة على محور الترتيب بدلالة الزمن:



البيان (ب)



البيان (أ)



الشكل (1)

- أ- مستعينا بالبيانين (أ) و (ب) استنتج مركبتي شعاع السرعة \vec{v}_0 ، ثم أحسب طولته.
- ب- أحسب قيمة الزاوية α .
- 3- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم+أرض)، أحسب السرعة عند الوضع A علما أن $AO = 1,5m$.
- 4- باعتبار اللحظة التي يصل فيها الجسم (s) إلى الوضع O مبدأ للأزمنة ($t = 0$)، و بإهمال دافعة أرخميدس ومقاومة الهواء.
- أ- أوجد معادلة مسار مركز عطالة الجسم (s) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- ب- حدّد بعد النقطة f عن النقطة O (المدى الأفقي للقذيفة).
- ت- أوجد إحداثيي النقطة H نقطة اصطدام القذيفة بالأرض.

يعطى: $g = 10 m.s^{-2}$

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يعتبر الطب النووي من أهم الاختصاصات ، إذ يستعمل في تشخيص الأمراض وفي علاجها. ومن بين التقنيات المعتمدة حيث يستعمل الإشعاع النووي في تدمير الأورام السرطانية إذ يقذف الورم أو النسيج المصاب بالإشعاع المنبعث من الكوبالت $^{60}_{27}\text{Co}$.

يفسر النشاط الإشعاعي لـ Co بتحول نترون n إلى بروتون p . يمثل منحنى الشكل (2) تغيرات نشاط عينة A من الكوبالت بدلالة N' عدد الأنوية المتفككة خلال الزمن t .

1- أ- حدد نمط النشاط الإشعاعي للكوبالت مع التعليل؟

ب- اكتب معادلة التفكك لهذه النواة وتعرف على النواة الابن من بين النواتين ^{26}Fe . ^{28}Ni .

ت- اكتب فنون التناقص الإشعاعي ، واستنتج

العلاقة النظرية بين N عدد الأنوية المتفككة ونشاط العينة A .

2- باستغلال البيان حدد:

أ- النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 للعينة.

ب- ثابت النشاط الإشعاعي λ لنواة

الكوبالت 60 .

ت- عدد الأنوية الابتدائية N_0 للعينة وحدد

كتلتها m_0 .

3- يمكن اعتبار العينة غير صالحة للاستعمال

من أجل $\frac{N'(t)}{N(t)} = 3$ ، حيث N عدد الأنوية

المتبقية .

أ- بين أنه يمكن كتابة النسبة $\frac{N'(t)}{N(t)}$

بالعلاقة التالية: $\frac{N'(t)}{N(t)} = e^{-\lambda t} - 1$

ب- استنتج المدة الزمنية التي يمكن فيها اعتبار أن العينة غير صالحة.

التمرين التجريبي: (07 نقاط)

يهدف هذا التمرين إلى: المتابعة الزمنية لتحول كيميائي ومعايرة محلول تجاري.

ملاحظة :

▪ كل المحاليل المائية مأخوذة في الدرجة 25°C .

▪ الكتلة المولية لمعدن المغنيزيوم : $M = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

▪ ثابت الجداء الشاردي للماء : $K_e = 10^{-14}$.

I- المتابعة الزمنية للتحويل الكيميائي الحادث بين حمض كلور الماء ومعدن المغنيزيوم.

نضع في بيشر حجما $V = 50 \text{ mL}$ من محلول (S) لحمض كلور الماء $(\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)})$ تركيزه المولي C ،

وندخل فيه مسرى مقياس الـ pH .

في اللحظة $t = 0$ ، نضيف إلى البيشر كمية من مسحوق المغنيزيوم $\text{Mg}_{(s)}$ كتلتها $m_0 = 0,243 \text{ g}$ ، فيحدث تحول

كيميائي يتمثل بالمعادلة: $2\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} + \text{Mg}_{(s)} = \text{H}_2_{(g)} + \text{Mg}^{2+}_{(aq)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$.

يعتبر هذا التحول تام، بإهمال حجم مسحوق المغنيزيوم مقارنة بحجم المحلول V .

حي فلول - برج البحري - الجزائر

1- بين أن التحول الحادث للجملة (حمض - معدن) عبارة أن تفاعل أكسدة- إرجاع مع تحديد الثنائيتان المشاركتان في التفاعل.

2- نتائج متابعة تطور pH المحلول كما في الجدول التالي:

t(min)	0	1	2	3	5	7	10	12	14
pH	0,22	0,32	0,40	0,46	0,57	0,64	0,70	0,70	0,70

1-2- استنتج التركيز المولي C لمحلول حمض كلور الماء المستعمل.

2-2- أحسب التقدم الأعظمي واستنتج المتفاعل المحد.

3-2- بين أن عبارة التقدم $x(t)$ للتفاعل في اللحظة t تكتب على الشكل: $x(t) = \frac{1}{2}V(C - 10^{-pH})$.

2-4- تأكد فعلا أن هذا التحول تام.

2-5- حدد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

2-6- أحسب السرعة المتوسطة الحجمية للتفاعل $v_{v,m}$ بين اللحظتين: $t_1 = 1\text{min}$ و $t_2 = 2\text{min}$.

II : معايرة المحلول التجاري للأمونياك:

نتوفر على محلول تجاري S_0 من الأمونياك NH_3 تركيزه المولي C_0 ، يستعمل بعد تخفيفه كمادة للتنظيف أو كمادة لإزالة الأوساخ والبقع . لتعيين تركيز هذا المحلول التجاري S_0 ، نمدده 1000 مرة ، فنحصل على محلول S_1 تركيزه المولي C_1 .

نجري معايرة pH متريية لحجم $V_1 = 20\text{ mL}$ من المحلول S_1 بمحلول S_2 لحمض كلور الماء $(H_3O_{aq}^+ + Cl_{aq}^-)$ تركيزه المولي $C_2 = 2,0 \cdot 10^{-2}\text{ mol. L}^{-1}$ والمتحصل عليه من المحلول S بعد تمديده 30 مرة ، فنحصل على البيان الممثل في الشكل (3).

1- أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل المعايرة.

2- أ- عرف نقطة التكافؤ ثم استنتج إحداثيتها.


ب- أحسب التركيز المولي C_1 للمحلول S_1 ثم

استنتج التركيز المولي C_0 للمحلول S_0 .

ج- ما طبيعة المحلول الناتج ؟ كيف تفسر ذلك ؟

3- أ- أوجد من البيان قيمة pH من أجل $V = 5\text{ mL}$.

ت- بالاعتماد على هذه القيمة، بين أن تفاعل المعايرة تحول تام.



عناصر الإجابة (الموضوع الأول)

التمرين الأول: (06 نقاط)

1-أ- عبارة تسارع الحركة على المسار AO :

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة (جسم) في المرجع السطحي الأرضي الذي نعتبره غاليليا

$$\text{نجد: } \sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a} \text{ و منه: } \vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

بالإسقاط وفق محور الحركة الموجه و أخذ القيم الجبرية نجد:

$$-P_x = m \cdot a \Rightarrow -P \sin \alpha = m \cdot a$$

أي: $-m g \sin \alpha = m \cdot a$ ، و منه:

$$a = -g \sin \alpha = C^{te}$$

ب- طبيعة الحركة على المسار AO مع التعليل: المسار مستقيم و التسارع مقدار ثابت، فالحركة مستقيمة متغيرة بانتظام (متباطئة).

2-أ- مركبتي شعاع السرعة \vec{v}_0 وطويلته:

$$\bullet \text{ من البيان (أ): } v_{0x} = v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{3-0}{1-0} = 3m \cdot s^{-1}$$

$$\bullet \text{ من البيان (ب): } v_{0y} = 4m \cdot s^{-1}$$

$$\text{و منه: } v_{0x} = \|\vec{v}_0\| = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5m \cdot s^{-1}$$

$$\bullet \text{ حساب قيمة الزاوية } \alpha: \sin \alpha = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} = \frac{4}{5} = 0,8 \text{ و منه: } \alpha = 53,13^\circ$$

3- حساب السرعة عند الموضع A : بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم+أرض) بين الموضعين O و A ، و باعتبار المستوي الأفقي المار من النقطة A مرجع لحساب الطاقة الكامنة الثقالية نجد:

$$E_A = E_O \Rightarrow E_{C_A} + E_{pp_A} = E_{C_O} + E_{pp_O}$$

$$E_{C_A} = E_{C_O} + E_{pp_O} \Rightarrow \frac{1}{2} m v_A^2 = \frac{1}{2} m v_O^2 + m g h_O$$

$$\text{حيث: } h_O = AO \sin \alpha$$

$$v_A^2 = v_O^2 + 2gAO \sin \alpha \Rightarrow v_A = \sqrt{v_O^2 + 2gAO \sin \alpha}$$

$$v_A = \sqrt{5^2 + (2 \cdot 10 \cdot 1,5 \cdot 0,8)} \text{ و منه:}$$

$$v_A = 7m \cdot s^{-1}$$

4-أ- معادلة مسار مركز عطالة الجسم (S) في المعلم $(\vec{0}; \vec{i}, \vec{j})$:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة (جسم) في المرجع السطحي الأرضي الذي نعتبره غاليليا

$$\text{نجد: } \sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a} \text{ و منه: } \vec{P} = m \cdot \vec{a} \text{ أي: } \vec{a} = \vec{g}$$

$$\text{بالإسقاط في المعلم } (\vec{0}; \vec{i}, \vec{j}) \text{ : و أخذ القيم الجبرية نجد: } \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \text{ بمكاملة الطرفين نجد:}$$

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha t \dots\dots\dots(1) \\ y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha t \dots\dots\dots(2) \end{cases} \text{بمكاملة الطرفين نجد: } \begin{cases} v_x = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y = -g t + v_0 \cdot \sin \alpha \end{cases}$$

من (1) نجد: $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ ، وبالتعويض في (2) نجد:

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

ب- تحديد بعد النقطة f عن النقطة O: $y_f = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x_f^2 + (\tan \alpha)x_f = 0$

ومنه: $\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x_f^2 = (\tan \alpha)x_f$ أي: $\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x_f = (\tan \alpha)$

تطبيق عددي: $x_f = \frac{2v_0^2 \cos^2 \alpha (\tan \alpha)}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{2} = \frac{5^2 \sin(106,26)}{2}$

$$x_f = 2,4m$$

ت- إحداثيي النقطة H: لدينا: $y_H = -h = -AO \sin \alpha$ ومنه: $y_H = -1,2m$

$$-1,2 = -0,55x_H^2 + 1,33x_H$$

$$0,55x_H^2 - 1,33x_H - 1,2 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = 2,1 \text{ ومنه: } \Delta = (1,33)^2 - (4 \cdot 0,55 \cdot (-1,2)) = 4,41$$


$$x_{H_2} = \frac{1,33 - 2,1}{2 \cdot 0,55} = -0,58m \text{ أو } x_{H_1} = \frac{1,33 + 2,1}{2 \cdot 0,55} = 3,18m$$

ومن ه احداثيات النقطة H هي: $H(3,18; -1,2)$

التمرين الثاني: (07 نقاط)

1 - أ- إشعاع B^- لأن:


$$\frac{1}{2}n \rightarrow \frac{1}{1}p + \frac{0}{-1}e$$



ب- من قانوني الإنحفاظ:

$$\begin{cases} A = 60 \\ Z = 28 \end{cases}$$

ومنه المعادلة من الشكل:



ت- قانون التناقص الإشعاعي:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$A = \lambda N(t) = \lambda(N_0 - \hat{N}) \dots\dots\dots(1)$$

$$A = A_0 - \lambda \hat{N}$$

2- أ- من البيان: $A_0 = 8 * 10^{13} \text{ Bq}$

ب- البيان معادلته من الشكل: $A = -k\hat{N} + B$

حيث: $K = tg\alpha = 4 * 10^{-9}$

$$B = 8 * 10^{13} = A_0$$

$$A = -4 * 10^{-9} \hat{N} + 8 * 10^{13} \dots\dots\dots(2)$$

اذن المعادلة من الشكل:

بمطابقة المعادلة (1) مع المعادلة (2) نجد: $\lambda = 4 * 10^{-9} s^{-1}$

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = 2 * 10^{20} \text{noyaux} \quad \text{ت -}$$

$$\frac{\dot{N}}{N} = \frac{N_0 - N_0 e^{-\lambda t}}{N_0} = \frac{1}{e^{-\lambda t}} - 1 = e^{\lambda t} - 1 \quad \text{أ - 3}$$

$$\frac{\dot{N}}{N} = e^{\lambda t} - 1 = 3 \quad \text{ب -}$$

$$\ln e^{\lambda t} - \ln 1 = 3$$



$$\lambda t = 3$$

$$t = \frac{3}{\lambda} = \frac{3}{4 * 10^{-9}} = 7,5 * 10^8 s$$


التمرين التجريبي: (07 نقاط)

I- المتابعة الزمنية للتحويل الكيميائي الحادث بين الحمض ومعدن المغنيزيوم:

1- أ- تبين أن التحويل الحادث للجملة (حمض - معدن) عبارة أن تفاعل أكسدة-إرجاع:



المعادلة الإجمالية الأيونية:



1-2- استنتاج التركيز المولي C لمحلول حمض كلور الماء المستعمل:

إن حمض كلور الماء حمض قوي: $10^{-pH_0} = [H_3O^+]_0 = C$ ، حيث $10^{-pH_0} = 0.22$


$$C = 0,60 \text{ mol. L}^{-1} \quad \text{وعليه}$$

2-2- تعيين المتفاعل المحد ثم حساب التقدم الأعظمي:

$$\frac{n}{2} = \frac{c.V}{2} = 1,5.20^{-2} \text{ mol} > \frac{n_0}{1} = 10^{-2} \text{ mol}$$

$$x_m = 10^{-2} \text{ mol}$$

3-2- عبارة التقدم $x(t)$ للتفاعل في اللحظة t بدلالة C, V, pH :



$$n - 2x \quad n_1 - x \quad x \quad x \quad \text{بوفرة}$$

$$n = c.V \quad \text{و} \quad n(t) = V.10^{-pH} \quad \text{حيث} \quad n - 2x(t) = n(t) \quad \forall t \geq 0$$

$$\text{و عليه:} \quad x(t) = \frac{1}{2} V(c - 10^{-pH}) \quad (*)$$

4-2- التأكد من أن فعلا هذا التحويل تام:

لما $t \geq t_f$ فإن $pH = 0.70$ و من العلاقة (*), نجد:

$$x_f = 10^{-2} \text{ mol} = x_m \quad \text{و عليه فعلا هذا التحويل تام}$$

5-2- تحديد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

$$t = t_{1/2} \Rightarrow x_{1/2} = \frac{1}{2} x_m \quad \text{لدينا من تعريف زمن التفاعل}$$

من العلاقة (*): نجد:

$$10^{-pH_{1/2}} = c - \frac{2x_{1/2}}{V} = 0,4 \text{ mol. L}^{-1} = [H_3O^+]_{1/2}$$

$$\text{ومنه:} \quad pH_{1/2} = 0,4 \quad \text{و عليه:} \quad t_{1/2} = 2 \text{ min}$$

6-2- حساب السرعة المتوسطة الحجمية للتفاعل v_{vm} بين اللحظتين $t_1 = 1 \text{ min}$ و $t_2 = 2 \text{ min}$


$$v_{vm} = \frac{1}{V} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1}{V} \left(\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \right) \quad \text{من تعريف السرعة المتوسطة للتفاعل}$$

حيث: $x_i = \frac{1}{2}(c - 10^{-pH_i})$ مع $(i = 1, 2)$

$$v_{Vm} = \frac{1}{2}(10^{-pH_1} - 10^{-pH_2}) = 0,039 \text{ mo. mol}^{-1} \text{ mn}^{-1}$$

II : معايرة المحلول التجاري للأمونيوم:

1-كتابة المعادلة الكيميائية لتفاعل المعايرة:



2-أتعريف نقطة التكافؤ :

هي تلك النقطة التي يكون فيها المتفاعلان بنسب ستكيومترية.

- استنتاج إحداثيتها: $E(a_E = 10 \text{ mL}, pH_E = 5,7)$

ب-حساب التركيز المولي S_1 للمحلول S_1 :

$$C_1 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1} \text{ و عليه } C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_E$$


*- استنتاج التركيز المولي S_0 للمحلول S_0 :

$$C_0 = 1000C_1 = 10 \text{ mol. L}^{-1}$$

ج-طبيعة المحلول الناتج :

$pH_E < 7$ و عليه فالمحلول ملحي حامضي (محلول كلور الأمونيوم)

- التفسير :



تواجد شوارد $H_3O^+(aq)$ دلالة على أن الوسط حامضي .

3-أ-إيجاد من البيان قيمة pH من أجل $V = 5 \text{ mL}$:

$$V = 5 \text{ mL} \Rightarrow pH = 9,3$$

ب- تبيان ان تفاعل المعايرة تام :

ط-1 : حساب ثابت التوازن للجملة المدروسة:

$$K = \frac{[NH_4^+]_f}{[NH_3]_f \cdot [H_3O^+]_f} = \frac{1}{Ka} = 10^{pKa}$$


لدينا $V = 5 \text{ mL} = \frac{1}{2}V_E$ فإنه $pH = pKa = 9,3$

ومنه $K = 2 \cdot 10^9 > 10^4$ و عليه تفاعل المعايرة تفاعل تام .

ط-2 : حساب نسبة التقدم النهائي :

$$\tau_f = \frac{x_f}{x_m}$$

بالاستعانة بجدول التقدم :



بوفرة $n_1 - x_f n_2 - x_f x_f$

*- $x_m = ?$: $V < V_E$ و منه المتفاعل المحد هو حمض كلور الماء و عليه $x_m = n_2 = C_2 \cdot V$

*- $x_f = ?$:

$$x_f = n_2 - 10^{-pH}(V_1 + V) \text{ و منه } n_f(H_3O^+) = n_2 - x_f$$

و أخيرا : $\tau_f = \frac{C_2 \cdot V - 10^{-pH}(V_1 + V)}{C_2 \cdot V} \approx 1$ و عليه فهذا التحول تام

4-المعيار الذي نعتمده في اختيار أحسن كاشف ملون في حالة إجراء المعايرة اللونية :

- قيمة pH_E تنتمي إلى مجال التغير اللوني للكاشف .

- مجال التغير اللوني للكاشف أصغري .