

التمرين الأول: (05 نقاط)

$$\begin{cases} u_0 = \frac{3}{2} \\ u_{n+1} = 1 + \sqrt{u_n - 1} \end{cases} : n \in \mathbb{N}$$

( $u_n$ ) المتتالية العددية المعرفة كما يلي:

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$   $1 < u_n < 2$ .

(2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$   $u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n^2 + 3u_n - 2}{\sqrt{u_n - 1} + u_n - 1}$  ثم استنتج أن ( $u_n$ ) متزايدة تماما.  
- بين أن المتتالية ( $u_n$ ) متقاربة ثم احسب نهايتها .

(3) ( $v_n$ ) المتتالية العددية المعرفة على  $\mathbb{N}$  كما يلي:  $v_n = \ln(u_n - 1)$

(أ) بين أن المتتالية ( $v_n$ ) هندسية أساسها  $\frac{1}{2}$ ، يطلب تعيين حدها الأول  $v_0$ .

(ب) أكتب كلا من  $u_n$  و  $v_n$  بدلالة  $n$ ، ثم احسب بطريقة اخرى  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$

(4) من أجل كل عدد طبيعي  $n$  نضع:  $w_n = u_n - 1$

أحسب بدلالة  $n$  الجداء  $P$  حيث:  $P = w_0 \times w_1 \times \dots \times w_n$ .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة كثير الحدود  $P(z) = z^3 - 8$ .

(1) تحقق أن:  $P(z) = (z - 2)(z^2 + 2z + 4)$ . ثم حل في  $C$  المعادلة  $0 = P(z)$ .

نعتبر في المستوى المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$ ، النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  ذات اللواحق

$$z_A = -1 + i\sqrt{3}, z_B = \overline{z_A}, z_C = 2 \text{، على الترتيب.}$$

(2) أكتب  $z_A$ ،  $z_B$  و  $z_C$  على الشكل الأسّي.

- استنتج أن النقط  $A$ ،  $B$  و  $C$  تنتمي إلى نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(3) بين أن  $z_A^{2017} = 2^{2016} z_A$ . ثم استنتج نتيجة ما يلي:  $(z_A^{2017} + z_B^{2017} + z_C^{2017})$ .

(4) أكتب العدد المركب  $L = \frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$  على الشكل الجبري ثم الأسّي.

- أعط تفسيراً هندسياً لطويلة وعمدة للعدد المركب  $L$  و استنتج طبيعة المثلث  $ABC$ .

### التمرين الثالث: (04 نقاط )

يحتوي كيس على ست كرات حمراء، أربعة منها تحمل الرقم 1 و اثنتان تحملان الرقم 2. وثمان كرات خضراء، خمسة منها تحمل الرقم 1 وثلاثة تحمل الرقم 2. لا يمكن التمييز بينها عند اللمس. نسحب كرتين من الكيس في آن واحد.

ليكن الحدثان: A "سحب كرتين من نفس اللون" و B "سحب كرتين تحملان نفس الرقم".

$$(1) \text{ بين أن: } P(A) = \frac{43}{91}$$

$$(2) \text{ أحسب } P(B)$$

(3) علما أن الكرتين المسحوبتين من نفس اللون، ما هو احتمال أن تحملان نفس الرقم.

(4) نعتبر المتغير العشوائي  $X$  الذي يساوي عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

أ- حدد قيم المتغير العشوائي  $X$ .

ب- عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي  $X$ .

ج- أحسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي  $X$ .

### التمرين الرابع: (07 نقاط)

الجزء الأول: لتكن الدالة  $h$  المعرفة على  $]-1; +\infty[$  كما يلي:  $h(x) = \frac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)$

$$1- \text{ أحسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) \text{ ثم أحسب } \lim_{x \rightarrow -1} h(x) \text{ -إرشاد- نذكر بأن: } \lim_{X \rightarrow 0} [X \cdot \ln X] = 0$$

2- أدرس اتجاه تغير الدالة  $h$ . ثم شكل جدول تغيراتها.

3- أحسب  $h(0)$  ثم بين أن المعادلة  $h(x) = 0$  تقبل حلين أحدهما  $\alpha$  حيث:  $-0.72 \leq \alpha \leq -0.71$

4- استنتج إشارة  $h(x)$  على المجال  $]-1; +\infty[$ .

الجزء الثاني: لتكن الدالة  $f$  المعرفة على المجموعة  $]-1; 0[ \cup ]0; +\infty[$  كما يلي:  $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2}$

$(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . الوحدة  $\|\vec{i}\| = 2cm$

$$1- \text{ أحسب } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ . فسر النتيجةين هندسياً.}$$

$$- \text{ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي } x \text{ من المجموعة } I \text{ فإن: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$- \text{ استنتج: } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \text{ . فسر النتيجةين بيانياً.}$$

$$2- \text{ بين أنه من أجل كل عدد } x \text{ من المجموعة } I \text{ فإن: } f'(x) = \frac{h(x)}{x^3}$$

- استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$ . ثم شكل جدول تغيراتها.

$$3- \text{ بين أن: } f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}, \text{ نأخذ } \alpha \approx -0.715 \text{ . أعط قيمة مقربة للعدد } f(\alpha) \text{ بالتدوير } 10^{-2} \text{ .}$$

4- أنشئ المنحى  $(C_f)$ .

بالتوفيق للجميع – أساتذة المادة-