

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ثانويات: 19 مارس 1962 عبد العزيز الشريف
متقن ميلودي العروسي
(دورة: ماي 2015)

مديرية التربية لولاية الوادي
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجريبي
الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 03 ساعات ونصف

اختبار في مادة الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. نعتبر النقط $A(-1; 0; 1)$ ، $B(1; 1; 0)$ و $C(0; -1; -4)$.

$$\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t + 3; t \in \mathbb{R} \\ z = -t + 1 \end{cases}$$

و ليكن (Δ) المستقيم المعرف بتمثيله الوسيط التالي :

$$\begin{cases} x = \alpha + \beta + 3 \\ y = -\alpha + 2 \\ z = \alpha + 2\beta \end{cases} \quad (P) \text{ المستوي المعرف بتمثيله الوسيط: } \alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}$$

أجب بصحيح أو خطأ على الجمل التالية مع التعليل:

1. النقطة B هي المسقط العمودي للنقطة C على المستقيم (Δ)
2. المستوي (P) له معادلة ديكارتية من الشكل $2x + y + z - 8 = 0$
3. المستقيم (Δ) يعامد المستوي (P)
4. النقطة B تنتمي إلى المستوي المحوري للقطعة [AC]

التمرين الثاني: (4.5 نقط)

(I) حل في مجموعة الاعداد المركبة المعادلة: $(z+2)(z^2+2-2\sqrt{3}i) = 0$

(II) في المستوي المركب المنسوب لمعلم متعامد و متجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها:

$$z_A = -2, z_B = -1 - i\sqrt{3} \text{ و } z_C = -z_B$$

1. بين أن $|z_A - z_B|^2 + |z_A - z_C|^2 = |z_B - z_C|^2$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC
2. أثبت ان النقط A، B و C تنتمي الى نفس الدائرة، يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها
3. أ عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالتحاكي الذي مركزه O نسبته -1
ب ما طبيعة الرباعي ABCD
4. بين ان صورة B بتحويل نقطي مركزه A يطلب تعيين طبيعته و عناصره المميزة

5. نرفق بكل نقطة M من المستوي ذات اللاحقة z ($z \neq -2$) النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث: $z' = \frac{iz - \sqrt{3} + i}{z + 2}$

$$1 \text{ اثبت أن } \arg(z') \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi \right)$$

ب عين مجموعة النقط M بحيث يكون z تخيلي صرف موجب تماما

التمرين الثالث (4,5 نقط)

نعبر المتتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{R} بـ : $u_0 = e^3 - 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = e^{-3} - 1 + e^{-3}u_n$

1. احسب u_1 ، u_2 ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > -1$.

2. أ بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما

ب استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ، ثم احسب نهايتها

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{1}{2}v_n - 1$

أ بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0

ب أكتب بدلالة n ، كلا من u_n و v_n ، ثم أحسب من جديد $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

ج- عين مجموعة الأعداد الطبيعية n بحيث يكون $v_n > 2 \times 10^{-3}$

4. أ احسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = \frac{u_0}{v_0} + \frac{u_1}{v_1} + \dots + \frac{u_n}{v_n}$

ب ليكن الجداء P_n حيث $P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n$

بين أن : $\ln(P_n) \sim \frac{n+1}{2} (2 \ln 2 + \dots)$ ثم استنتج بدلالة n

التمرين الرابع (7نقط)

نعبر الدالة العددية f المعرفة على المجال \mathbb{R} كما يلي : $f(x) = \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها

3. احسب من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) - f(-x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

4. أ بين أن المعادلة $f(x) = \alpha$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,1 < \alpha < 1,2$

ب من أجل اي قيمة للعدد الحقيقي m يكون العدد $(-\alpha)$ حلا للمعادلة $f(x) = m$

5. أ بين أنه من كل عدد حقيقي x فان : $f(x) = 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$

ب بين ان المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + \ln 4$ و المستقيم (Λ) ذو المعادلة $y = x + 2 + \ln 4$ مستقيمان

مقاربان للمنحنى (C_f) ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة الى كل منهما

6. ارسم (Δ) ، (Λ) و (C_f)

7. ليكن λ عدد حقيقي موجب تماما ، $A(\lambda)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) و المستقيمين

الذين معادلتيهما $x = \lambda$ و $x = 0$

أ اعتمادا على السؤال (5) أ بين أن : $A(\lambda) = \ln \left(\frac{2e^\lambda}{e^\lambda + 1} \right)$

ب عين قيمة العدد λ بحيث يكون $A(\lambda) = 1$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. نعتبر النقط $A(2;1;-4)$ ، $B(-2;2;-1)$ و $C(0;3;-4)$ والمستوي (P) الذي معادلته $x - y + z + 1 = 0$

1. بين أن النقط A ، B و C تعين مستوي (Q) بحيث الشعاع $\vec{n}(1;1;1)$ ناظميا له، ثم اكتب معادلة ديكارتية لـ (Q)
2. بين أن (P) و (Q) غير متوازيين و غير متعامدين
3. عين تمثيل وسيطي للمستقيم Δ تقاطع المستويين (P) و (Q)
4. لتكن $\Omega(1;0;1)$ نقطة من الفضاء
 أ بين ان النقطة Ω متساوية البعد عن المستويين (P) و (Q)
 ب عين معادلة سطح الكرة (S) ذو المركز Ω و المماس لـ (P) و (Q)
 ج عين احداثيات النقطتين D و H نقطتي التماس بين (S) و (P) و بين (S) و (Q) على الترتيب
5. لتكن $E\left(-\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2}\right)$ هي المسقط العمودي لـ Ω على المستقيم Δ ، احسب المسافة بين Ω و Δ

التمرين الثاني: (4,5 نقط)

(I) حل في مجموعة الاعداد المركبة المعادلة $(z+2)(z^2+z+1)=0$

(II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(\rho; \vec{u}; \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C, D, E ذات اللواحق

$$z_E = \overline{z_D}, \quad z_D = 2(1 + \sqrt{3})i, \quad z_C = -2, \quad z_B = \overline{z_A}, \quad z_A = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

1. اكتب (z_A) على الشكل الاسي ثم علم النقط A, B, C, D, E
2. ليكن R التحويل النقطي الذي يحول $M(z)$ الى $M'(z')$ حيث: $\frac{z'+2}{z+2} = -z_A$
 أ ما طبيعة التحويل R و حدد عناصره المميزة
 ب لتكن النقطة F حيث: $R(D) = F$ ، بين أن $z_F = 1 + \sqrt{3}i$
 ج اكتب العدد $\frac{z_E - z_F}{z_D - z_F}$ على الشكل الجبري ثم استنتج ان المستقيمين (FD) و (EF) متعامدان
3. لتكن G مرجح الجملة $\{(A, |z_A|); (B, |z_B|); (C, |z_C|)\}$
 أ عين z_G لاحقة G
 ب عين مجموعة النقط M حيث: $\overline{MG} = \lambda \overline{AB}$ لما يسمح λ مجموعة الاعداد الحقيقية
 ج اكتب معادلة ديكارتية لهذه المجموعة

التمرين الثالث: (4,5 نقط)

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_1 = e^2$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $u_{n+1} = e^{\frac{-1}{2}} \sqrt{u_n}$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n > \frac{1}{e}$

2. أ بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

ب- استنتج أن (u_n) متناقصة تماما

ج هل (u_n) متقاربة؟ إذا كانت متقاربة فما هي نهايتها

3. (v_n) متتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ : $v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$

أ برهن أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول

ب أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n

4. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{1 + \ln u_1} + \frac{1}{1 + \ln u_2} + \dots + \frac{1}{1 + \ln u_n}$

التمرين الرابع: (07 نقط)

لتكن f دالة عددية معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{2x}{x+1} - \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (وحدة الطول 2cm)

1. احسب نهايتي الدالة f عند اطراف مجموعة تعريفها

2. أ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1; +\infty[$ فإن: $f'(x) = \frac{1-x}{(x+1)^2}$

ب ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

3. اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0

4. بين ان المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثيتها

5. بين أن المعادلة $f(x) = \alpha$ تقبل حلا وحيدا α حيث $3,9 < \alpha < 4$

6. ارسم المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f)

7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و اشارة حلول المعادلة $f(x) = 3m$

8. F دالة معرفة على $]-1; +\infty[$ بـ : $F(x) = \frac{3x}{x-1} - \ln(x-1)$

أ بين ان F دالة أصلية للدالة f على المجال $]-1; +\infty[$

ب لتكن $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و محور الفواصل و المستقيمين اللذين

معادلتيهما $x = \alpha$ و $x = 0$

بين أن : $A(\alpha) = \left(\frac{\alpha^2 - 3\alpha}{\alpha + 1} \right)^2$ ثم اوجد حصر $A(\alpha)$

الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا التجريبية

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقط)

الإجابة بصحيح أو خطأ مع التعليل على الجمل التالية:

السؤال	الإجابة	التعليل
1. النقطة B هي المسقط العمودي للنقطة C على المستقيم (Δ)	خطأ	لأن: $\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} 1-0 \\ 1-1 \\ 0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ إذن: $\overrightarrow{U}_{(\Delta)} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ لكن $\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{U}_{(\Delta)} = 0$ $B \notin (\Delta)$
2. المستوي (P) له معادلة ديكارتية من الشكل $2x + y + z - 8 = 0$	خطأ	لأن: لدينا $\begin{cases} x = \alpha + \beta + 3 \dots (1) \\ y = -\alpha + 2 \dots (2) \\ z = \alpha + 2\beta \dots (3) \end{cases}$ نجد (2) نجد $\alpha = 2 - y$ و بالتعويض في (1) نجد $\beta = x + y - 5$ وبالتعويض في (3) نجد $z = 2 - y + 2x + 2y - 10$ ومنه $(P): 2x + y - z - 8 = 0$
3. المستقيم (Δ) يعامد المستوي (P)	صحيح	لأن: لدينا $\overrightarrow{U}_{(\Delta)} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ و $\vec{n}_P \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ إذن $\frac{2}{2} = \frac{1}{1} = \frac{-1}{-1}$ أي $\vec{n}_P \parallel \overrightarrow{U}_{(\Delta)}$ ومنه $(\Delta) \perp (P)$
4. النقطة B تنتمي إلى المستوي المحوري للقطعة [AC]	خطأ	لأن: $BA \neq BC$ $BA = \sqrt{(-1-1)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{6}$ $BC = \sqrt{(0-1)^2 + (-1-1)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{19}$

التمرين الثاني: (4.5 نقط) (I) حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة: $(z+2)(z^2+2-2\sqrt{3}i)=0$

نضع $w = \alpha + \beta i$ جذر لـ z^2 إذن $w^2 = z^2$ أي $\begin{cases} z+2=0 \\ z^2+2-2\sqrt{3}i=0 \end{cases}$ بالجمع (1) و (2) نجد $2 = 2\alpha^2$ أي $\alpha = 1$ أو $\alpha = -1$ ومنه يكون $\begin{cases} 4 = \alpha^2 + \beta^2 \dots (1) \\ -2 = \alpha^2 - \beta^2 \dots (2) \\ 2\sqrt{3} = 2\alpha\beta \dots (3) \end{cases}$

وبالتعويض في المعادلة (3) نجد : إذا كان $\alpha = 1$ فإن $\beta = \sqrt{3}$ وإذا كان $\alpha = -1$ فإن $\beta = -\sqrt{3}$ وبالتالي $w_1 = 1 + \sqrt{3}i$ و $w_2 = -1 - \sqrt{3}i$ إذن مجموعة حلول المعادلة $0 = (z+2)(z^2 + 2 - 2\sqrt{3}i) = 0$ هي: $S = \{-2, -1 - \sqrt{3}i, 1 + \sqrt{3}i\}$

(II)

6. بين أن $|z_A - z_B|^2 + |z_A - z_C|^2 = |z_B - z_C|^2$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC:

$BA^2 + CA^2 = CB^2$ تكافئ $|z_A - z_B|^2 + |z_A - z_C|^2 = |z_B - z_C|^2$ ولدينا: $A(-2; 0)$ و $B(-1; -\sqrt{3})$ و $C(1; \sqrt{3})$ إذن $BA^2 = 4$ و $CA^2 = 12$ و $CB^2 = 16$ أي $4 + 12 = 16$ إذن المثلث ABC قائم في A

7. أثبت أن النقط A ، B ، C تنتمي إلى نفس الدائرة ، يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها

النقط A ، B ، C تنتمي إلى نفس الدائرة يكافئ أن $|z_A| = |z_B| = |z_C|$ و $|z_A| = |-2| = 2$ و $|z_B| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$ و $|z_C| = \sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ وبما أن ABC قائم في A فإن [BC] قطر للدائرة المحيطة به أي مركزها هو منتصف [BC]: $(\frac{-1+1}{2}; \frac{-\sqrt{3}+\sqrt{3}}{2})$ إذن مركزها هو $O(0; 0)$ و نصف قطرها $OC = OB = 2$

8. عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالتحاكي الذي مركزه O نسبته -1

$$z_D - z_O = -(z_A - z_O) \text{ نستلزم إن } z_D = -z_A = 2$$

ب ما طبيعة الرباعي ABDC

لدينا $\begin{cases} OA = OD \\ OA = OB = OC \end{cases}$ إذن $OA = OD = OB = OC$ و $AD = BC$

ومنه الرباعي ABDC هو مستطيل (القطران متناصفان ومتقايسان)

9. بين ان صورة C بتحويل نقطي مركزه A يطلب تعيين طبيعته وعناصره المميزة

أي $(z_C - z_A) = a(z_B - z_A)$ نستلزم أن $a = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ وبعد التبسيط نجد $a = \sqrt{3}i$ ومنه التحويل النقطي الذي مركزه A ويحول B إلى C هو تشابه نسبته $\sqrt{3}$ وزاويته $\arg(\sqrt{3}i) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ومركزه $A(-2; 0)$

$$z' = \frac{iz - \sqrt{3} + i}{z + 2} \text{ أثبت أن } \arg(z') = \frac{\pi}{2} + (\overline{AM}, \overline{BM})$$

$$z' = \frac{iz - \sqrt{3} + i}{z + 2} \text{ أي } z' = \frac{i(z + \sqrt{3}i + 1)}{z + 2} \text{ ومنه } z' = i \frac{(z - (-1 - \sqrt{3}i))}{(z - (-2))} \text{ إذن } z' = i \frac{(z - z_B)}{(z - z_A)}$$

وبالتالي $\arg(z') = \arg(i) + \arg\left(\frac{z - z_B}{z - z_A}\right)$ أي $\arg(z') = \frac{\pi}{2} + (\overline{AM}, \overline{BM})$

ث عين مجموعة النقط M بحيث يكون z' تخيلي صرف موجب تماما

z' تخيلي صرف موجب تماما يكافئ $\arg(z') = \frac{\pi}{2}$ أي $(\overline{AM}, \overline{BM}) = 0 + K2\pi$ ومنه مجموعة النقط M هي:

$$\{(AB) - [AB]\}$$

$$\begin{cases} u_0 = e^3 - 1 \\ u_{n+1} = e^{-3} - 1 + e^{-3}u_n \end{cases} \quad \text{التمرين الثالث (4,5 نقط) نعتبر المتتالية } (u_n):$$

4. احسب u_1 ، u_2 ، ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > -1$.

$$U_1 = e^{-3} - 1 + e^{-3}U_0 = e^{-3} - 1 + e^{-3}(e^3 - 1) = 0$$

$$U_2 = e^{-3} - 1 + e^{-3}U_1 = e^{-3} - 1 + e^{-3}(0) = e^{-3} - 1$$

• البرهان بالتراجع أن من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > -1$

- من اجل $n = 0$: $U_0 > -1$ أي $e^3 - 1 > -1$ القضية صحيحة
- نفرض أن $u_n > -1$ ونثبت صحة القضية $U_{n+1} > -1$
- لدينا : $U_n > -1$ بضرب الطرفين في (e^{-3}) نجد : $e^{-3}U_n > -e^{-3}$
- وبإضافة العدد $(e^{-3} - 1)$ إلى الطرفين نجد: $e^{-3} - 1 + e^{-3}U_n > -1$ أي $U_{n+1} > -1$
- إذن من اجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n > -1$

5. 1 بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما

$$\text{لدينا : } U_{n+1} - U_n = e^{-3} - 1 + e^{-3}U_n - U_n = (e^{-3} - 1)(1 + U_n)$$

$$\text{إذن : } U_{n+1} - U_n < 0 \text{ لان : } \begin{cases} 1 + U_n > 0 \\ u_n > -1 \end{cases} \text{ ومنه المتتالية } (u_n) \text{ متناقصة تماما}$$

ب استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ، ثم احسب نهايتها

بما أن (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بالعدد (-1) إذن فهي متقاربة و نهايتها هي l حيث:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} U_{n+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(l) = l$$

$$\text{ومنه } f(l) = l \text{ تكافئ : } e^{-3} - 1 + e^{-3}l = l \text{ إذن : } l = -1 \text{ وبالتالي } \lim_{x \rightarrow +\infty} U_n = -1$$

6. نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{1}{2}v_n - 1$

1 بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0 :

$$\text{لدينا } u_n = \frac{1}{2}v_n - 1 \text{ إذن : } v_n = 2U_n + 2 \text{ ومنه } v_{n+1} = 2U_{n+1} + 2 = 2(e^{-3} - 1 + e^{-3}U_n) + 2$$

$$\text{أي } v_{n+1} = 2e^{-3} + 2e^{-3}U_n \text{ وبأخذ } (e^{-3}) \text{ عامل مشترك نجد } v_{n+1} = e^{-3}(2U_n + 2) \text{ أي } v_{n+1} = e^{-3}v_n$$

$$\text{إذن } (v_n) \text{ متتالية هندسية أساسها } (q = e^{-3}) \text{ وحدها الاول : } v_0 = 2U_0 + 2 = 2e^3$$

ب أكتب بدلالة n ، كلا من v_n و u_n ، ثم احسب من جديد $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$v_n = 2e^3 \times (e^{-3})^n \text{ و } U_n = \frac{1}{2}(2e^3 \times (e^{-3})^n) - 1 = e^3 \times (e^{-3})^n - 1$$

$$\text{إذن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^3 \times (e^{-3})^n - 1) = -1$$

ج- عين مجموعة الأعداد الطبيعية n بحيث يكون $v_n > 2 \times 10^{-3}$

$$v_n > 2 \times 10^{-3} \text{ تكافئ أن } 2e^3 \times (e^{-3})^n > 2 \times 10^{-3} \text{ أي } e^{3-3n} > 10^{-3} \text{ وباستعمال خصائص الدالة } \ln \text{ نجد:}$$

$$3 - 3n > -3 \ln 10 \text{ وبعد التبسيط نجد } n < (3 \ln 10) + 1 \text{ و } (3 \ln 10) + 1 \approx 7.9 \text{ أي}$$

$$n = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

5.1 احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{u_0}{v_0} + \frac{u_1}{v_1} + \dots + \frac{u_n}{v_n}$

لدينا: $S_n = \left(U_0 \times \frac{1}{V_0} \right) + \left(U_1 \times \frac{1}{V_1} \right) + \dots + \left(U_n \times \frac{1}{V_n} \right)$ ولدينا $u_n = \frac{1}{2}v_n - 1$

إذن: $S_n = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{v_0} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{v_1} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{v_n} \right)$

أي: $S_n = - \left(\frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \dots + \frac{1}{v_n} \right) + (n+1) \frac{1}{2}$

$= - \left(\frac{1}{2e^3} \times (e^3)^0 + \frac{1}{2e^3} \times (e^3)^1 + \dots + \frac{1}{2e^3} \times (e^3)^n \right) + (n+1) \frac{1}{2}$

وبالتالي: $S_n = - \left[\frac{1}{2e^3} \times \frac{(e^3)^{n+1} - 1}{e^3 - 1} \right] + (n+1) \frac{1}{2} = \frac{1 - (e^3)^{n+1}}{2e^3(e^3 - 1)} + \frac{n+1}{2}$

ب ليكن الجداء P_n حيث $P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n$

بين أن: $\ln(P_n) = 3n - \frac{n+1}{2}(2\ln 2 + \dots)$ ثم استنتج P_n بدلالة n

لدينا: $P_n = V_0 \times V_1 \times \dots \times V_n$ إذن $\ln(P_n) = \ln(V_0 \times V_1 \times \dots \times V_n)$

وحسب خصائص الدالة \ln يصبح $\ln(P_n) = \ln(V_0) + \ln(V_1) + \dots + \ln(V_n)$

أي: $\ln(P_n) = \ln(2e^3 \times (e^{-3})^0) + \ln(2e^3 \times (e^{-3})^1) + \dots + \ln(2e^3 \times (e^{-3})^n)$

$= (\ln 2 + \ln e^3 + \ln(e^{-3})^0) + (\ln 2 + \ln e^3 + \ln(e^{-3})^1) + \dots + (\ln 2 + \ln e^3 + \ln(e^{-3})^n)$

$= (\ln 2 + 3)(n+1) + \ln(e^{-3})^{0+1+2+\dots+n}$

ومنه $\ln(P_n) = (\ln 2 + 3)(n+1) + \ln(e^{-3})^{n \frac{(n+1)}{2}} = (\ln 2 + 3)(n+1) - 3n \frac{(n+1)}{2}$

وبأخذ عامل مشترك نجد $\ln(P_n) = \left(\frac{n+1}{2} \right) (\ln 2 + 6 - 3n)$ وهو المطلوب

وباستعمال خصائص الدالة e نجد: $e^{\ln(P_n)} = e^{\left(\frac{n+1}{2} \right) (\ln 2 + 6 - 3n)}$ أي

$P_n = e^{(n+1)(\ln 2)} \times e^{3(n+1)} \times e^{\left(\frac{n+1}{2} \right) (-3n)} = 2^{n+1} \times (e^3)^{(n+1)} \times (e^{-3})^{n \frac{(n+1)}{2}}$

وبالتبسيط نجد: $P_n = (2e^3)^{n+1} \times (e^{-3})^{n \frac{(n+1)}{2}}$

التمرين الرابع (07نقط): $f(x) = \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1}$

8. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

9. ادرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها: نحسب الدالة المشتقة وندرس إشارتها:

$f'(x) = 1 + \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2}$

لدينا من اجل كل $x \in \mathcal{R}$ فإن $f'(x) > 0$, ومنه الدالة f متزايدة تماما على \mathcal{R}

• جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

10. احسب من اجل كل عدد حقيقي x : $f(x)f(x) -$ ، ثم فسر النتيجة هندسياً:

$$f(x) + f(-x) = x + \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1} + (-x) + \ln 4 + \frac{2}{e^{-x} + 1} = 2\ln 4 + \frac{2}{e^x + 1} + \frac{2e^x}{e^x + 1}$$

وبتوحيد المقامات نجد: $f(x) + f(-x) = 2\ln 4 + \frac{2e^x + 1}{e^x + 1} = 2\ln 4 + 2$
ومنه نستنتج أن النقطة $(0; \ln 4 + 1)$ مركز تناظر لـ (C_f)

11. أ بين أن المعادلة $f(x) = 3$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1,1 < \alpha < 1,2$

• الدالة f دالة معرفة ومستمرة ومنتزيدة تماماً على \mathcal{R} إذن فهي حتماً معرفة ومستمرة ومنتزيدة تماماً على المجال $[1,1, 1,2]$

• ولدينا $\begin{cases} f(1.1) = 2.985 \\ f(1.2) = 3.049 \end{cases}$ أي $f(1.1) < 3 < f(1.2)$

• إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 3$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $\alpha \in]1.1, 1.2[$

ب من أجل أي قيمة للعدد الحقيقي m يكون العدد $(-\alpha)$ حلاً للمعادلة $f(x) = m$

لدينا: $f(x) + f(-x) = 2\ln 4 + 2$ أي $f(x) + f(-x) = 2\ln 4 + 2$ ولدينا $f(\alpha) = 3$
إذن: $f(\alpha) + f(-\alpha) = 2\ln 4 + 2$ تكافئ: $3 + f(-\alpha) = 2\ln 4 + 2$ ومنه $f(-\alpha) = -1 + 2\ln 4$

12. أ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f(x) = 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$

$$f(x) = x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1} = x + \ln 4 + \frac{2e^x + 2 - 2e^x}{e^x + 1} = x + \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1} = f(x)$$

ب بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + \ln 4$ والمستقيم (Δ') ذو المعادلة $y = x + 2 + \ln 4$ مستقيمان
مقاربان للمنحنى (C_f) ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل منهما:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + \ln 4)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{e^x + 1} \right) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x + 2 + \ln 4)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-2e^x}{e^x + 1} \right) = 0 \end{cases}$$


ومنه المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + \ln 4$ هو مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$

والمستقيم (Δ') ذو المعادلة $y = x + 2 + \ln 4$ هو مستقيم مقارب مائل بجوار $-\infty$

$$\begin{cases} f(x) - (x + \ln 4) = \frac{2}{e^x + 1} > 0 \\ f(x) - (x + 2 + \ln 4) = \frac{-2e^x}{e^x + 1} < 0 \end{cases} \quad \text{لدينا -}$$

ومنه (C_f) فوق (Δ) وتحت (Δ')

13. ارسم A ، A و (C_f) :



14. اعتمادا على السؤال (5 أ) بين أن : $A(\lambda) = 2 \ln \left(\frac{2e^\lambda}{e^\lambda + 1} \right)$

$$A(\lambda) = \int_0^\lambda [f(x) - y] dx = \int_0^\lambda \left[x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1} - (x + \ln 4) \right] dx$$

$$A(\lambda) = \int_0^\lambda 2 dx - \int_0^\lambda \frac{2e^x}{e^x + 1} dx = [2x]_0^\lambda - 2[\ln(e^x + 1)]_0^\lambda = 2\lambda - 2\ln(e^\lambda + 1) + 2\ln 2$$

أي $A(\lambda) = 2\lambda + 2\ln 2 - 2\ln(e^\lambda + 1)$ وبما أن $\lambda = \ln e^\lambda$ تصبح:

$$A(\lambda) = 2[\ln e^\lambda + \ln 2 - \ln(e^\lambda + 1)]$$
 وباستعمال خصائص الدالة \ln نجد

$$A(\lambda) = 2[\ln 2e^\lambda - \ln(e^\lambda + 1)] = 2\ln \left(\frac{2e^\lambda}{e^\lambda + 1} \right)$$

ب عين قيمة العدد λ بحيث يكون $A(\lambda) = 1$

$$A(\lambda) = 1 \quad \text{تكافئ} \quad 2\ln \left(\frac{2e^\lambda}{e^\lambda + 1} \right) = 1 \quad \text{أي} \quad \ln \left(\frac{2e^\lambda}{e^\lambda + 1} \right) = \frac{1}{2}$$
 وباستعمال خصائص الدالة e نجد:

$$\frac{2e^\lambda}{e^\lambda + 1} = e^{\frac{1}{2}} \quad \text{وبعد التبسيط نجد} \quad e^\lambda = \frac{-e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{1}{2}} - 2} \quad \text{إذن} \quad \lambda \approx 1.54$$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقط)

C(0;3;-4) و B(-2;2;-1)، A(2;1;-4)

والمستوي (P) الذي معادلته $x - y + z + 1 = 0$

5. بين أن النقط A ، B و C تعين مستوي (Q) بحيث الشعاع $\vec{n}(1;1;1)$ ناظميا له ، ثم اكتب معادلة ديكارتية لـ (Q)

لدينا: $\vec{AB} \begin{pmatrix} -2-2 \\ 2-1 \\ -1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ و $\vec{AC} \begin{pmatrix} 0-2 \\ 3-1 \\ -4+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ولدينا: $\frac{-4}{-2} \neq \frac{1}{2} \neq \frac{3}{0}$ إذن: $\vec{AB} \nparallel \vec{AC}$

$$\begin{cases} \vec{n} \times \vec{AB} = 1 \times (-4) + 1 \times 1 + 1 \times 3 = 0 \\ \vec{n} \times \vec{AC} = 1 \times (-2) + 1 \times 2 + 1 \times 0 = 0 \end{cases} \text{ كذلك}$$

وبالتالي معادلة (Q): $x + y + z + d = 0$ وبما إن: $A \in (Q)$ وبالتعويض باحداثياتها نجد:

$$(Q) : x + y + z + 1 = 0$$

6. بين أن (P) و (Q) غير متوازيين و غير متعامدين

لدينا: $\vec{n}_P \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ و $\vec{n}_Q \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ إذن $\frac{1}{1} \neq \frac{-1}{1}$ و $1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 \neq 0$ أي $\vec{n}_P \nparallel \vec{n}_Q$ و \vec{n}_P لا يعامد \vec{n}_Q

7. عين تمثيل وسيطي للمستقيم Δ تقاطع المستويين (P) و (Q)

لدينا:
$$\begin{cases} x - y + z + 1 = 0 \dots\dots\dots(1) \\ x + y + z + 1 = 0 \dots\dots\dots(2) \end{cases}$$
 بالجمع (1) و (2) نجد $x = -z - 1$

وبالتعويض في (2) نجد $y = 0$ وبوضع $z = t$ يكون التمثيل الوسيطي:

$$t \in \mathcal{R} \text{ حيث } (\Delta): \begin{cases} x = -t - 1 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$$

8. لتكن $\Omega(1;0;1)$ نقطة من الفضاء: أ. بين ان النقطة Ω متساوية البعد عن المستويين (P) و (Q)

$$\begin{cases} d(\Omega; (P)) = \frac{|1 \times 1 + 0 \times (-1) + 1 \times 1 + 1|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \\ d(\Omega; (Q)) = \frac{|1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \end{cases}$$

ب. عين معادلة سطح الكرة (S) ذو المركز Ω و المماس لـ (P) و (Q)

$$(S): (x - 1)^2 + (y)^2 + (z - 1)^2 = 3$$

ج. عين احداثيات النقطتين D و H نقطتي التماس بين (S) و (P) و بين (S) و (Q) على الترتيب

لدينا: شعاع توجيه للمستقيم (ΩD) و \vec{n}_Q شعاع توجيه للمستقيم (ΩH) إذن:

$$(\Omega H): \begin{cases} x = t' + 1 \\ y = t' \\ z = t' + 1 \end{cases} \quad \text{و} \quad (\Omega D): \begin{cases} x = t + 1 \\ y = -t \\ z = t + 1 \end{cases} \quad \text{إذن: } \begin{cases} \overrightarrow{\Omega M} = t \overrightarrow{\Omega D} \\ \overrightarrow{\Omega M} = t' \overrightarrow{\Omega H} \end{cases}, (t, t') \in \mathcal{R}^2$$

أي $D(t+1, -t, t+1)$ و $H(t+1, t, t+1)$ وبالتعويض:

- احداثيات النقطة D في معادلة (P) نجد $t = -1$ إذن $D(0, 1, 0)$

- احداثيات النقطة H في معادلة (Q) نجد $t' = -1$ إذن $H(0, -1, 0)$

6. لتكن $E\left(-\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2}\right)$ هي المسقط العمودي لـ Ω على المستقيم (Δ) ، احسب المسافة بين Ω و Δ

نتأكد اولاً من انتماء E إلى (Δ) ثم نتأكد من أن $\overrightarrow{E\Omega} \perp \overrightarrow{U}_{(\Delta)}$

$$E \in (\Delta) \text{ ومنه } E \in (\Delta) \text{ يعني } \begin{cases} -\frac{1}{2} = -t - 1 & ; t = -\frac{1}{2} \\ 0 = 0 \\ -\frac{1}{2} = t \end{cases}$$

$$\overrightarrow{E\Omega} \perp \overrightarrow{U}_{(\Delta)} \text{ وبالتالي: } \overrightarrow{E\Omega} \times \overrightarrow{U}_{(\Delta)} = 0 \text{ إذن } \overrightarrow{U}_{(\Delta)} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ و } \overrightarrow{E\Omega} \begin{pmatrix} 1+\frac{1}{2} \\ 0-0 \\ 1+\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

التمرين الثاني: (4,5 نقط)

I حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة $(z+2)(z^2+z+1)=0$

$$\begin{cases} z = -2 \\ z^2 + z + 1 = 0 \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} z + 2 = 0 \\ z^2 + z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$z^2 + z + 1 = 0 \text{ نحسب المميز } \Delta = -3 = 3i^2 \text{ نجد } \Delta = -3 = 3i^2 \text{ ومنه } z_1 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \text{ و } z_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{ومنه مجموعة حلول المعادلة: } S = \left\{ -2, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right\}$$

$$(II) \quad z_E = \overline{z_D}, \quad z_D = 2(1 + \sqrt{3}i), \quad z_C = -2, \quad z_B = \overline{z_A}, \quad z_A = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

4. اكتب $(-z_A)$ على الشكل الأسّي ثم علم النقط A, B, C, D, E

$$\text{لدينا } z_A = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ إذن: } -z_A = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ ومنه } |-z_A| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$$

$$-z_A = e^{-i\frac{\pi}{3}} \text{ ومنه } \arg(-z_A): \begin{cases} \cos \theta_{-z_A} = \frac{1}{2} \\ \sin \theta_{-z_A} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}, \theta_{-z_A} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$$

5. ما طبيعة التحويل R و حدد عناصره المميزة: $\frac{z'+2}{z+2} = -z_A$

من العبارة: $\frac{z'+2}{z+2} = -z_A$ نجد $(z' - (-2)) = -z_A(z - (-2))$ أي $(z' - z_C) = e^{-i\frac{\pi}{3}}(z - z_C)$ ومنه التحويل R هو دوران مركزه C وزاويته $(-\frac{\pi}{3})$

ب لتكن النقطة F حيث $R(D) = F$ ، بين أن $z_F = 1 + \sqrt{3}i$

إذن $(z_F - z_C) = e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_D - z_C)$ وبعد التبسيط نجد $z_F = 1 + i\sqrt{3}$

ج اكتب العدد $\frac{z_E - z_F}{z_D - z_F}$ على الشكل الجبري ثم استنتج أن المستقيمين (FD) و (FE) متعامدان

$$\frac{z_E - z_F}{z_D - z_F} = \frac{(-2 - 2\sqrt{3}i) - (1 + \sqrt{3}i)}{(-2 + 2\sqrt{3}i) - (1 + \sqrt{3}i)} = \frac{-3 - 3\sqrt{3}i}{-3 + \sqrt{3}i} = \frac{(-3 - 3\sqrt{3}i) \times (-3 + \sqrt{3}i)}{(-3 + \sqrt{3}i) \times (-3 + \sqrt{3}i)} = \sqrt{3}i$$

لدينا العدد $\frac{z_E - z_F}{z_D - z_F} = \sqrt{3}i$ نستلزم إن $\arg\left(\frac{z_E - z_F}{z_D - z_F}\right) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ أي $(\overrightarrow{FD}, \overrightarrow{FE}) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ وبالتالي $(FE) \perp (FD)$

6. لتكن G مرجح الجملة $\{(A, |z_A|); (B, |z_B|); (C, |z_C|)\}$ عين z_G لاحقة G :

إذن G مرجح الجملة: $\{(A, 1), (B, 1), (C, 2)\}$ ومنه: $z_G = \frac{1 \times z_A + 1 \times z_B + 2 \times z_C}{1 + 1 + 2} = \frac{-5}{4}$

ب عين مجموعة النقط M حيث: $\overline{MG} = \lambda \overline{AB}$ لما يمسخ λ مجموعة الأعداد الحقيقية

لما $\overline{MG} = \lambda \overline{AB}$ يمسخ المجموعة \mathcal{R} فإن تمثل مستقيم يشمل G و الشعاع \overline{AB} شعاع توجيه له

ج اكتب معادلة ديكارتية لهذه المجموعة:

$$\overline{MG} = \lambda \overline{AB} \text{ أي } \begin{pmatrix} \frac{-5}{4} - x \\ 0 - y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

نجد $x = \frac{-5}{4}$ و $y = -\sqrt{3}\lambda$ وهي معادلة مستقيم موازي لمحور الترتيب

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ u_{n+1} = e^{\frac{-1}{2}} \sqrt{u_n} \end{cases} \quad \text{التمرين الثالث: (4,5 نقط):} \quad \text{نعتبر المتتالية } (u_n) \text{ المعرفة بـ:}$$

4. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n > \frac{1}{e}$

- من اجل $n = 1$: $u_1 > \frac{1}{e}$ أي $e^2 > \frac{1}{e}$ القضية صحيحة

- نفرض أن $u_n > \frac{1}{e}$ ونثبت صحة القضية $u_{n+1} > \frac{1}{e}$

- لدينا: $u_n > \frac{1}{e}$ بإدخال الجذر التربيعي على الطرفين نجد: $\sqrt{u_n} > \frac{1}{\sqrt{e}}$

وبضرب الطرفين في العدد $(e^{-\frac{1}{2}})$ نجد: $e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n} > \frac{1}{\sqrt{e}} e^{-\frac{1}{2}}$ أي $u_{n+1} > \frac{1}{e}$ إذن من اجل كل عدد

طبيعي n فإن: $u_n > \frac{1}{e}$

5.1 بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

لدينا $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\sqrt{u_n}}}{\sqrt{u_n}} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{u_n}}$ إذن $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ تعني أن :
 $\frac{e^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{u_n}} < 1$ وبتربيع الطرفين نجد : $\frac{1}{u_n} < 1$ وبما إن $u_n > \frac{1}{e}$ فإن $\frac{1}{u_n} < 1$ وبالتالي : $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$
 ب- استنتج أن (u_n) متناقصة تماما

بما أن $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ أي $u_{n+1} < u_n$ ومنه المتتالية (u_n) متناقصة

ج هل (u_n) متقاربة؟ إذا كانت متقاربة فما هي نهايتها

بما أن (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بالعدد $(\frac{1}{e})$ إذن فهي متقاربة و نهايتها هي l حيث:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} U_{n+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(l) = l$$

ومنه $f(l) = l$ تكافئ: $e^{-\frac{1}{2}\sqrt{l}} = l$ إذن: $l = \frac{1}{e}$ وبالتالي $\lim_{x \rightarrow +\infty} U_n = \frac{1}{e}$

6. (v_n) متتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ب- : $v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$

أ برهن أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول

لدينا $v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$ إذن : $v_{n+1} = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_{n+1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln u_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln (e^{-\frac{1}{2}\sqrt{u_n}})$

أي $v_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln (e^{-\frac{1}{2}}) + \frac{1}{2} \ln \sqrt{u_n} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln \sqrt{u_n}$ عامل مشترك نجد

$$v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n \text{ أي } v_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n} \right)$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $(q = \frac{1}{2})$ وحدها الأول: $v_1 = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_1} = \frac{3}{2}$

ب- أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n

ولدينا $v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$ أي $v_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln u_n$ إذن $\ln u_n = 2v_n - 1$ ومنه

نستلزم أن : $u_n = e^{2v_n - 1}$ وبالتالي $u_n = e^{3 \times (\frac{1}{2})^{n-1} - 1}$

5. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{1 + \ln u_1} + \frac{1}{1 + \ln u_2} + \dots + \frac{1}{1 + \ln u_n}$

لدينا $v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$ أي $v_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln u_n$ وبالتالي $2v_n = 1 + \ln u_n$

إذن $S_n = \left(\frac{1}{1 + \ln u_1} \right) + \left(\frac{1}{1 + \ln u_2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{1 + \ln u_n} \right)$

وتعويض $(2v_n = 1 + \ln u_n)$ نجد $S_n = \left(\frac{1}{2v_1} \right) + \left(\frac{1}{2v_2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2v_n} \right)$

$$S_n = \left(\frac{1}{3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{1-1}} \right) + \left(\frac{1}{3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2-1}} \right) + \dots + \left(\frac{1}{3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}} \right) \quad \text{أي :}$$

$$S_n = \left(\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 \right) + \left(\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \right) + \dots + \left(\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-(n-1)} \right) \quad \text{ومنه}$$

$$S_n = \left(\frac{1}{3} \times (2)^0 \right) + \left(\frac{1}{3} \times (2)^1 \right) + \dots + \left(\frac{1}{3} \times (2)^{(n-1)} \right) \quad \text{إذن}$$

$$S_n = \frac{1}{3} \times \frac{2^n - 1}{2 - 1} = \frac{(2^n - 1)}{3} \quad \text{وبالتالي :}$$

التمرين الرابع: (07 نقط)

لتكن f دالة عددية معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \ln\left(\frac{2x}{x+1}\right) - \frac{2x}{x+1}$

9. احسب نهايتي الدالة f عند اطراف مجموعة تعريفها

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x - (x+1)\ln(x+1)}{x+1} = -\infty$$

2. 1. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1; +\infty[$ فإن : $f'(x) = \frac{1-x}{(x+1)^2}$

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} = \frac{2x+2-2x-x-1}{(x+1)^2} = \frac{1-x}{(x+1)^2}$$

ب ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

$$f'(x) = 0 \quad \text{أي } 1 - x = 0 \quad \text{إذن } x = 1$$

x	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

جدول التغيرات:

x	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(1)$	$-\infty$

3. اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0

$$y = x \quad \text{إذن } (\Delta): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

4. بين ان المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثيتها

لدينا : $f'(x) = \frac{1-x}{(x+1)^2}$ إذن $f''(x) = \frac{x^2-2x-3}{(x+1)^2}$ ومنه $f''(x) = 0$ تعني إن $\begin{cases} x = 3 \\ x = -1 \end{cases}$ ومنه من اجل كل $x \in]-1; +\infty[$ فإن (C_f) يقبل النقطة $(3, f(3))$ نقطة انعطاف


5. بين أن المعادلة $f(x) = \alpha$ تقبل حلا وحيدا α حيث $3.9 < \alpha < 4$

• الدالة f دالة معرفة ومستمرة ومنتزادة تماما على $[1; +\infty[$ إذن فهي حتما معرفة ومستمرة ومنتزادة تماما على المجال $[3.9, 4]$

• ولدينا $\begin{cases} f(3.9) = 0.002 \\ f(4) = -0.0094 \end{cases}$ أي $f(3.9) \times f(4) < 0$

• إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = \alpha$ تقبل حلا وحيدا α حيث $\alpha \in]3.9, 4[$

6. ارسم المستقيم (A) و المنحنى (C_f)



7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و اشارة حلول المعادلة $f(x) = 3m$

m	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = x - 3m$	المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة	المعادلة تقبل حل مضاعف معدوم	المعادلة لا تقبل حل

8. F دالة معرفة على $]-1; +\infty[$: ب $F(x) = (-3-x)\ln(x+1) + 3x + 3$

ت بين ان F دالة أصلية للدالة f على المجال $]-1; +\infty[$

$$F'(x) = -1 \times \ln(x+1) + \frac{1}{x+1} \times (-3-x) + 3 = \frac{2x}{x+1} + \ln(x+1) = f(x)$$

إذن F دالة أصلية لـ f(x)

ب بين أن : $A(\alpha) = \left(\frac{\alpha^2 - 3\alpha}{\alpha + 1}\right)^2$ cm² ثم اوجد حصره

$$A(\alpha) = \int_0^\alpha [f(x) - y] dx = \int_0^\alpha f(x) dx = [F(x)]_0^\alpha = (-3 - \alpha)\ln(\alpha + 1) + 3\alpha$$

$$\ln(\alpha + 1) = \frac{2\alpha}{\alpha + 1} \quad \text{ولدينا : } f(\alpha) = 0 \text{ إذن نجد :}$$

$$A(\alpha) = \left(\frac{\alpha^2 - 3\alpha}{\alpha + 1}\right)^2 \text{ ومنه } A(\alpha) = (-3 - \alpha)\left(\frac{2\alpha}{\alpha + 1}\right) + 3\alpha$$

$$A(\alpha) = \left(\frac{\alpha^2 - 3\alpha}{\alpha + 1}\right)^2 \times 2^2 = 4 \left(\frac{\alpha^2 - 3\alpha}{\alpha + 1}\right)^2 \text{ cm}^2 \text{ فإن: } (2 \text{ cm})$$

$$\text{حصر } A(\alpha) : \text{ لدينا } 3.9 < \alpha < 4 \text{ إذن (1) } (3.9)^2 < \alpha^2 < (4)^2$$

$$\text{و (2) } -3 \times 4 < -3\alpha < -3 \times 3.9$$

$$\text{و (3) } \frac{1}{5.9} < \frac{1}{\alpha + 1} < \frac{1}{4.9} \text{ إذن : } 4.9 < \alpha + 1 < 5.9$$

$$\text{وبالتالي من : } [(3) \times ((2) + (1))] \text{ نجد : } 0.642 < A(\alpha) < 0.877$$