

التمرين الأول :

- كيس به 12 كرية متماثلة لا تميز بينها عند اللمس ، منها 3 بيضاء و 4 سوداء و 5 حمراء .
- (1) ن سحب عشوائيا من الكيس 3 كريات في ان واحد .
- أ- أحسب احتمال الحصول على ثلاث كريات من نفس اللون .
- ب- أحسب احتمال الحصول على الأقل على كرية بيضاء .
- ج- أحسب احتمال الحصول على ثلاث كريات مختلفة اللون مثنى مثنى .
- (2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الألوان المتحصل عليها .
- عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، واحسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين الثاني :

- المستوي المركب منسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
- أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير على كل سؤال مما يلي :
- (1) نعتبر النقطة A لاحتقتها 3 والنقطة B لاحتقتها $4i$. ان مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق $|z-3|=|3-4i|$ هي : الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 5 .
- (2) ان مرافق العدد المركب $z = (2i+7)(i+1)$ هو العدد المركب $\bar{z} = (2i-7)(i-1)$.
- (3) ليكن k عدد حقيقي سالب تماما ، ان عمدة العدد المركب $ke^{-i\frac{\pi}{2}}$ تساوي $\frac{\pi}{2}$.
- (4) لتكن النقط A ، B ، C و D لواحقها على الترتيب : $z_A = 1$ ، $z_B = i$ ، $z_C = -1$ و $z_D = -i$.
- ان مجموعة النقط ذات اللاحقة z بحيث يكون $\frac{z+i}{z+1}$ حقيقيا هي : المستقيم (CD) باستثناء النقطة C .
- (5) لتكن النقطتين B و C لاحتقائهما على الترتيب b و c بحيث : $\frac{c}{b} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.
- ان المثلث OBC قائم في O ومتساوي الساقين .

التمرين الثالث :

(I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ كما يلي : $g(x) = \frac{x+1}{2x+1} - \ln x$.

(1) أدرس اتجاه تغير الدالة g .

(2) بين ان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1,8;1,9[$ ثم استنتج إشارة على $]0, +\infty[$.

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{2\ln x}{x^2+x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس ($O; \vec{i}, \vec{j}$) .

(1) احسب نهاية f عند 0 وعند $+\infty$ ، فسر النتيجةين بيانيا .

(2) بين ان: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0, +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{2(2x+1)}{(x^2+x)^2} \times g(x)$.

ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

(3) بين أن : $f(\alpha) = \frac{2}{\alpha(2\alpha+1)}$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

(4) أرسم بعناية المنحنى (C_f) . (نأخذ $f(\alpha) \approx 0.23$)

انتهى الموضوع