

على المترشح أن يختار موضوعا واحدا من الموضوعين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (4 نقاط)

(u_n) متتالية معرفة على \mathbb{R} بـ $u_0 = -1$ ، $u_1 = \frac{1}{2}$ و من أجل كل n من \mathbb{N} : $u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n$

و لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{R} بـ: $v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$

1 أ - اثبت أن (v_n) هندسية يطلب تحديد أساسها و حدها الأول.

ب - اكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n .

ج - احسب بدلالة n المجموع: $s_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ ثم حدد $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$.

2 نضع من أجل كل n من \mathbb{N} : $w_n = \frac{u_n}{v_n}$

أ - اثبت أن (w_n) حسابية يطلب تحديد أساسها و حدها الأول.

ب - اكتب بدلالة n عبارة الحد العام w_n ثم عين أصغر عدد طبيعي n الذي يحقق: $e^{w_n} > 2018$

التمرين الثاني: (4 نقاط)

يضم كيس خمس كرات بيضاء مرقمة من 1 إلى 5 وثلاث كرات حمراء مرقمة من 6 إلى 8 وكرتين خضراوين تحملان الرقمين 9 و 10 (الكرات لا نفرق بينها عند اللمس). نسحب عشوائيا كرتين من الكيس في آن واحد.

1 ما احتمال وقوع الحوادث التالية: A "الكرتان المسحوبتان تحملان رقمين فرديين" .

B "الكرتان المسحوبتان من نفس اللون" و C "الكرتان المسحوبتان من لونين مختلفين"

هل الحادثتان A و B مستقلتان؟

2 ما احتمال سحب رقم زوجي على الأقل؟

3 ما احتمال سحب كرتين تحملان رقمين فرديين علما أنهما من لونين مختلفين؟

4 ما هو عدد الكرات البيضاء الممكن إضافتها إلى الكيس حتى يكون عدد الحالات الممكنة يساوي 120؟

التمرين الثالث: (5 نقاط)

$$(I) \text{ نعتبر الأعداد المركبة: } z_1 = \frac{-\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, z_2 = -1 - i, \text{ و } z_3 = z_1 \times z_2$$

(1) اكتب z_1 و z_2 على الشكل الأسّي ثم استنتج الشكل الأسّي لعدد z_3 .

(2) اكتب z_3 على الشكل الجبري ثم استنتج القيم المضبوطة لـ: $\cos \frac{\pi}{12}$ و $\sin \frac{\pi}{12}$

(II) ليكن كثير الحدود: $p(z) = |z|^2 - 3(z - \bar{z}) - 13 + 12i$ حيث: $z = x + iy$ و x و y عدنان حقيقيان.

(1) اكتب $p(z)$ على الشكل الجبري.

(2) عين (E) مجموعة النقط $M(x; y)$ حتى يكون $p(z)$ تخيلي صرف.

(III) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \bar{i}; \bar{j})$ النقط A ، B حيث:

. $z_A = z_1$ و $z_B = z_2$ و f تحويل نقطي مركزه المبدأ و يحول النقطة A إلى B .

(1) بين أن التحويل f دوران.

(2) حدد صورة (E) بالتحويل f .

التمرين الرابع: (7 نقاط)

$$(I) \text{ } g \text{ دالة معرفة على }]0; +\infty[\text{ بـ: } g(x) = x - 1 + \ln x$$

(1) بين أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$.

(2) احسب $g(1)$ ثم حدد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

$$(II) \text{ لتكن الدالة } f \text{ المعرفة على }]0; +\infty[\text{ بـ: } f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x}$$

(1) أ - بين أن الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال $]0; +\infty[$.

ب - بين أن: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ج - بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ ثم شكل جدول تغيرات f .

(2) ليكن (Γ) المنحنى الممثل للدالة \ln في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس.

أ - بين أن المنحنى (Γ) مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

ب - ادرس الوضعية النسبية بين المنحنيين (Γ) و (C_f) .

ج - احسب $f\left(\frac{1}{2}\right)$ ثم ارسم المنحنيين (Γ) و (C_f) في نفس المعلم.

(3) عين قيم العدد الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x) = f(m)$ حلين متميزين.

(4) احسب التكامل $I = \int_1^e [\ln x - f(x)] dx$ ثم فسر النتيجة بيانيا.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (4 نقاط)

الفضاء منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. و لكن المستويين (P) و (Q) الذين معادلتيهما

$$x + 2y - z + 1 = 0 \text{ و } -x + y + z = 0 \text{ على الترتيب و } A(0; 1; 1) \text{ نقطة حيث}$$

(1) اثبت أن المستويين (P) و (Q) متعامدان .

$$(t \in \mathbb{R}) : \begin{cases} x = -\frac{1}{3} + t \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = t \end{cases} \quad (2) \text{ برهن أن المستويين } (P) \text{ و } (Q) \text{ متقاطعان وفق المستقيم } (\Delta) \text{ ذو تمثيل وسيطي}$$

(3) احسب المسافة بين A و كل من المستويين (P) و (Q) .

(4) استنتج المسافة بين النقطة A و المستقيم (Δ) .

التمرين الثاني: (4 نقاط)

(1) ليكن كثير الحدود: $p(z) = z^3 - 3z^2 + 3z - 9$

أ - تحقق أن 3 جذر لكثير الحدود $p(z)$.

ب - حل في \mathbb{C} المعادلة $p(z) = 0$.

(2) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ النقط A, B, C, D

$$\text{و } z_A = 3 \text{ و } z_B = i\sqrt{3} \text{ و } z_C = -i\sqrt{3} \text{ و } z_D = 2e^{i\frac{5\pi}{6}} \text{ و } z_F = 1 - i\sqrt{3}$$

أ - ما طبيعة المثلث ABC ؟

ب - اوجد z_E لاحقة النقطة E صورة D بالدوران الذي مركزه O و زاويته $\frac{\pi}{3}$.

ج - احسب $\frac{z_F}{z_E}$ و استنتج أن المستقيمين (OE) و (OF) متعامدان .

د - عين z_G لاحقة النقطة G حتى يكون الرباعي $OEGF$ مربعاً .

التمرين الثالث: (4 نقاط)

لتكن (u_n) متتالية حدودها موجبة حيث : $u_1 = 1$ و $n \in \mathbb{N}^*$ ، $(u_{n+1})^2 = 2u_n$

(1) أحسب u_2 ، u_3 ، u_4 (تعطى النتائج على شكل قوى العدد 2)

(2) نضع من أجل كل n من \mathbb{N}^* $v_n = \ln u_n - \ln 2$: (يرمز \ln الى دالة اللوغاريتم النيبييري)

أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب أساسها و حدها الاول .

ب - اكتب بدلالة n عبارة الحد العام لكل من v_n و u_n .

ج- أحسب $\lim v_n$ ثم $\lim u_n$

(3) أ - بين أنه من أجل كل n من \mathbb{N}^* : $e^{v_n} = \frac{u_n}{2}$

ب - احسب الجداء : $p = \frac{u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n}{2^n}$

التمرين الرابع: (8 نقاط)

(I) لتكن g الدالة العددية للمتغير الحقيقي x و المعرفة على \mathbb{R} كما يلي : $g(x) = e^{-x} + x$

(1) أدرس تغيرات الدالة g .

(2) استنتج أنه من أجل كل x من \mathbb{R} : $1 + xe^x > 0$

(II) لتكن f دالة عددية لمتغير حقيقي x معرفة على \mathbb{R} بالعلاقة : $f(x) = \ln(e^{-x} + x)$

و ليكن (C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1- تحقق من اجل كل x حقيقي فان : $f(x) = \ln(1 + xe^x) - x$

2- أدرس تغيرات الدالة f

3- بين أن المستقيم $y = -x$: (Δ) مقاربا للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$ ، ثم أدرس وضعيته بالنسبة لـ (C_f)

4- لتكن دالة عددية لمتغير حقيقي x معرفة على المجال $]0, +\infty[$ بـ : $h(x) = f(x) - \ln x$

أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$

ب- أدرس اشارة العبارة $h(x)$

ج- فسر النتائج السابقة بيانيا بين المنحنى (C_f) و منحنى دالة اللوغاريتم النيبييري

5- أرسم بعناية المنحنى (C_f)