


التمرين الأول:

g الدالة المعرفة و القابلة للاشتقاق على \mathbb{R} و g' دالتها المشتقة. ليكن (C_g) التمثيل البياني المقابل للدالة g في المستوى المنسوب الى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. ليكن (T_1) المماس الذي يشمل النقطتين $A(-1; -1)$ و $B(0; 2)$



(I) بقراءة بيانية:

(1) عَيِّن: $g(0)$ ، $g(-2)$ ، $g'(0)$ ، $g'(-1)$ و $g'(-2)$.(2) أنشئ المماس (T_1) .(3) شكّل جدول تغيرات الدالة g .(4) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $g(x) = m$ (II) نضع: $g(x) = -x^3 - 3x^2 + 1$ (1) احسب $g'(x)$ و ادرس إشارتها على \mathbb{R} .(2) استنتج العلاقة بين إشارة المشتقة واتجاه تغير الدالة g .(3) أكتب معادلة المماس (T_2) للمنحنى (C_g) في النقطة التي فاصلتها 1(4) عَيِّن القيمة التقريبية لكلا العددين $g(1,002)$ و $g(0,999)$

التمرين الثاني:

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = ax^3 + bx^2 + c$ حيث a ، b و c أعداد حقيقية و (C_g) تمثيلها البياني.(1) عَيِّن a ، b و c علما أن المنحنى (C_g) يشمل النقطة $A(0; -5)$ ويقبل عند النقطة ذات الفاصلة (-1) مماسا معادلته $y = -4$ (2) نضع $a = 2$ ، $b = 3$ و $c = -5$.(أ) احسب $g'(x)$ ثم ادرس إشارتها. (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة g و شكّل جدول تغيراتها.(ج) احسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على \mathbb{R} .(د) بيّن أن المنحنى (C_g) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين للمستقيم ذو المعادلة $y = x$. يطلب كتابة معادلة لكل منهما.(II) لتكن f الدالة المعرفة على $]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 - x + 4}{x + 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.(1) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن (-1) : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$ (2) استنتج اتجاه تغير الدالة f و شكّل جدول تغيراتها.(3) أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.(4) ادرس إشارة الفرق $f(x) - (-5x + 4)$ ثم فسر النتيجة بيانيا.(5) عَيِّن دون حساب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$. ماذا تستنتج؟