


المدة: 4 ساعات ونصف

اختبار في مادة علوم الطبيعة والحياة

على التلميذ أن يعالج أحد الموضوعين على الخيار

الموضوع الأول من الصفحة 1 إلى الصفحة 4

المررين الأول: (5 نقاط) اللقاح ضد الدفتيريا يتطلب تلقي الشخص المراد تلقيحه سم الدفتيريا المعالج بالحرارة والفورمول فقد سميته لكن احتفظ بقدرته على توليد الاستجابة المناعية، وهو ما يعرف بالاسم "Anatoxine" كما يمكن اكتساب مناعة ضد سم الدفتيريا عن طريق الاستعمال أي نقل مصل من شخص محمض ضد نفس المستضد، الوثيقة التالية تمثل بعض التجارب المجرأة على حيوانات الكبوبي.



1. اعتماداً على الوثيقة ومكتسباتك اختر الإجابة الأكثر وجاهة من بين المقترنات: ج. الرشاحة المحقونة للحيوان 2 تحتوي على:

A. أجسام مضادة ضد الدفتيريا

B. مسحوق عاطل وأجسام مضادة ضد الدفتيريا

C. عدم احتوائها على المسحوق العاطل ولا على

الأجسام المضادة ضد الدفتيريا.

د. الحيوان رقم 3 بقي حي بسبب:

A. حقنه بسم الدفتيريا

B. وجود أجسام مضادة لسم الدفتيريا في الرشاحة

C. وجود جزيئات المسحوق العاطل في الرشاحة.

2. اشرح في نص علمي منظم ومهكم كل من الاستعمال والتلقيح في حماية العضوية من العناصر الغريبة مبرزاً دور البروتينات في ذلك.

أ. المصل المأخوذ من الحيوان يحتوي على:

A. أجسام مضادة ضد سم الدفتيريا.

B. المقاويات السامة.

C. أجسام مضادة ضد سم الدفتيريا ولقاويات سامة.

ب. خاصية النوعية للأجسام المضادة تظهرها التجارب المجرأة على:

A. الحيوان 1

B. الحيوان 2


C. الحيوانين 2 و 4

الصرع عبارة عن نوبات عصبية تنتج عن اضطراب في الإشارات الكهربائية في خلايا المخ وتتميز بحدوثها المتكرر عند الأشخاص الكبار والصغار.

لفهم أسباب هذا المرض عند الأطفال وتأثير الأدوية في التخفيف من هذه النوبات العصبية نقترح عليك الدراسة التالية.

الجزء الأول: من خلال الدراسات الطبية الحديثة وجد أن هناك بعض المواد والجزئيات الخلوية لها علاقة بنوبات الصرع.


الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة "1" توضح أثر مادة الغلوتامات **Glutamat**.



1. حدد تأثير مادة الغلوتامات على نوبات الصرع انطلاقاً من استغلالك للشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة 1.

| التسجيل الكهربائي على مستوى الغشاء بعد المشبك | عدد مستقبلات NMDA بعد مشبكية | عند طفل طبيعي |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| ~~~~~ | +++ | عند طفل طبيعي |
| ~~~~~ | +++++++++ | عند طفل مصاب بمرض الصرع |

الجدول




الجزء الثاني: الدراسة التالية توضح العلاقة الموجودة بين مستقبلات الـ **NMDA** بعد مشبكية والتسجيلات الكهربائية عند طفل سليم وآخر مصاب، جدول الوثيقة "2" يعبر عن النتائج الحصول عليها. الرسم التخطيطي للوثيقة "2" يوضح تأثير دواء الـ **BZD** **Benzodiazépine**

1. باستغلال معطيات الوثيقة "2" بين سبب حدوث نوبات الصرع وتأثير دواء الـ **BZD** في التخفيف من نوبات الصرع.

2. وضح في مخطط وظيفي كيفية حدوث نوبات الصرع وكيفية تأثير دواء **BZD** في التخفيف من نوبات الصرع عند الأطفال.

تستهدف بعض المضادات الحيوية انزيمات البكتيريا محدثة توقف نموها، غير أنه تطرأ تغييرات على البكتيريا بممرور الزمن كرد فعل مقاوم لهذه المضادات، فتصبح أقل استجابة للأدوية مما يصعب علاج الالتهابات ويزيد خطورة انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة، وقد توصل العلماء أن ذلك يحدث في مراحل متالية. نريد معرفة آلية حدوث ذلك فنقتصر ما يلي:

الجزء الأول : تم تحديد العلاقة بين إنزيم ARN بوليميراز لبكتيريا *Bacillus anthracis* والريفاميسين وذلك بقياس نشاط الإنزيم في وجود وغياب الريفاميسين (الشكل 1) ، في حين اعطت المتابعة الجزيئية لأعداد الإنزيمات ARNp المرتبطة لتشكل معقدا جزئي في الأصناف الثلاثة للبكتيريا في وجود الريفاميسين الناتج الممثلة في الشكل 2 للوثيقة 1.



باستغلالك لنتائج الوثيقة 1.


١. حدد البكتيريا الحساسة والمقاومة للمضاد الحيوي ثم استخرج المشكلة العلمية التي تطرحها النتائج بخصوص الريفارميسين.
 ٢. اقترح فرضية تفسر بها العلاقة بين الأصناف الثلاثة من البكتيريا والمضاد الحيوي.

الجزء الثاني: في دراسة مكلمة للدراسة السابقة وبغرض الإجابة على المشكلة وتأكيد صحة الفرضية السابقة نقدم معطيات الوثيقة 2 حيث:

-الشكل(أ): يمثل نماذج جزئية باستعمال مبرمج ARNP Rastop لـ ARNP بوليميراز في وجود الركيزة والريفارميسين.

-الشكل(ب): نتائج مقارنة تتمى أجزاء من السلسلة البيتدية المشكلة لـ ARNP بوليميرز لدى الأصناف الثلاثة من البكتيريا

-الشكل (ج): يمثل بنية جزء من إنزيم ARNp بوليميراز يشمل الموقع الفعال لدى بكتيريا الصنف 1



باستغلالك لنتائج الوثيقة (2)

1. قدم إجابة للمشكل المطروح في الجزء الأول. ثم صادر على الفرضية المطروحة


2. افتح حلاً مبنياً على أساس علمي لتجاوز هذه العقبة.

الجزء الثالث: انطلاقاً مما توصلت إليه وعما يحكي حول الموضوع، في فقرة اشرح أهمية استعمال المضادات الحيوية مبرزاً انعكاسات كثرة استعمالها على العضوية.

الموضوع الثاني: من الصفحة 4 إلى الصفحة 6

التمرين الأول: 05 نقاط

تعتمد حياتنا بشكل كامل على الوظائف الحيوية المنسقة التي تؤديها البروتينات الوظيفية، وتعتمد وظيفية البروتين وبنيته على خصائص وحداته البنائية، تقدم الوثيقة أدفأله تفاصيل بسيطة حول هذه العلاقات.




1- باستغلالك للوثيقة -1- اذكر مميزات كل بنية .

2- بتوظيف ما سبق و معلوماتك المكتسبة بين في نص علمي أن التخصص الوظيفي لهذا الإنزيم يؤمن البنية (أ).

التمرين الثاني: 7 نقاط

يتوقف حياة الخلية على حدوث تفاعلات ايضية متعددة ، تحفّزها إنزيمات تشرف على تركيبها مورثات .

يسمح تركيب إنزيم β -جلاكتوزيداز (E.coli) من استعمال سكر اللاكتوز كمصدر ايضي لنموها .



حسب المعادلة الآتية :

الجزء الأول : لتحديد العلاقة بين تواجد الإنزيم و النشاط الايضي (استعمال اللاكتوز) في الخلية البكتيرية .


اجريت الدراسة الآتية : وضعت بكتيريا E.coli في وسطين زرع (1) و (2)، احدهما يحتوي على اللاكتوز و الآخر يحتوي على الجلوكوز.

• نتائج تطور عدد البكتيريا و قياس كمية إنزيم β -جلاكتوزيداز في الوسطين (1) و (2) و كمية الجلوكوز في الوسط (2) فقط ، ممثلة في الوثيقة (1).


- باستغلال الوثيقة (1):

1- حدد العلاقة بين إنزيم β -جلاكتوزيداز و E.coli تطور نمو البكتيريا .

2- بين تأثير سكر اللاكتوز و الجلوكوز على تطور كمية إنزيم β -جلاكتوزيداز .



الجزء الثاني : لفهم آلية تأثير سكر اللاكتوز على تركيب إنزيم β -جلاكتوزيداز نقترح معطيات الوثيقة (2) حيث : الشكل (أ) يمثل نتائج متابعة نسبة إدماج البيردين المشع داخل خلايا البكتيريا E.coli و تكاثرها في شروط تجريبية متغيرة (اللاكتوز، الجلوكوز). الشكل (ب) يمثل رسم تخطيطي لآلية كبح مورثة إنزيم β -جلاكتوزيداز في حالة غياب اللاكتوز في الوسط .



باستغلال الوثيقة (2) و معلوماتك :

- وضع كيف يتم التحكم في النشاط الايضي المدروس عند الخلايا بكتيريا E.coli في حالة غياب اللاكتوز .
- مستعيناً بمعطيات و رموز الشكل (ب) انجز رسم تخطيطي لآلية تنظيم تفاعل اماهة اللاكتوز و علاقه بنمو البكتيريا في حالة وجود اللاكتوز .

التمرين الثالث : 8 نقاط

للجهاز المناعي دور كبير في اقصاء الالذات و ذلك بفضل مختلف الخلايا المناعية المكونة له و الجزيئات البروتينية المتدخلة في الاستجابة المناعية . يعاني بعض الاطفال الصغار من قصور مناعي خطير نادر (يصيب حوالي طفل واحد من 100 ألف) تمثل اعراضه في التهاب رئوي حاد - امراض تعفمية - اسهالات حادة من اصل تعفني - تقرحات معدية - التهاب السحايا الخ . هذه الاعراض تسببها بكتيريا مختلفة مثل : العقدية Streptococcus , المستديمة Haemophilus و كذلك الفيروسات . الطيفيليات و الفطريات ، يعرف هذا المرض بمتلازمة بروتون (Syndrome de Bruton) و هو مرض نادر يصيب في معظم الاحيان الذكور . لفهم سبب هذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية :


الجزء الأول : الوثيقة 1 بما ثلاثة أشكال أ، ب ، ج حيث :

الشكل -أ- : يمثل نتائج تحاليل طبية أُجريت للطفل أيمن بعد وضعه 18 شهر في المستشفى حيث تلقى مجموعة من اللقاحات (الكراز ، الدفتيريا ، الحصبة). لمعرفة سبب الالتهابات البكتيرية التي كانت دافعاً لإدخاله إلى المستشفى.

الشكل - ب- : نتائج الموجزة الكهربائية لمصل ثلات أطفال حيث:

الطفل a: مصاب بالالتهاب البكتيري الطفل b: غير مصاب بالالتهاب البكتيري (سليم) الطفل c: أيمن مصاب بالالتهاب البكتيري .

الشكل - ج- : يبين الخلايا LB الناضجة في الأعضاء الحيوانية اثر تماستها بالمستضد تتمايز إلى خلية منتجة للأجسام المضادة عند شخص سليم .



1- باستغلال الوثيقة (1) اقترح فرضيتين تفسر فيما سبب مرض الطفل أيمن او ما يعرف بمتلازمة بروتون .

الجزء الثاني: للتأكد من صحة الفرضيات المقترنة تم إنجاز الدراسة التالية :

- تم قياس نسبة الممافيات عند أيمن فكانت النتائج الموضحة في الجدول 2-أ.

| القيم الطبيعية عند أطفال في سن 18 شهر | عند أيمن (18 شهر) | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| من $10^7 \cdot 5 - 2.5$ | $3.5 \cdot 10^7$ | مجموع الممافيات |
| من $10^7 \cdot 0.4 - 0.1$ | $10^7 \cdot 0.03$ | الممافيات B |
| من $10^7 \cdot 3.0 - 1.5$ | $3.2 \cdot 10^7$ | الممافيات T |
| القيم الطبيعية عند أطفال في سن 18 شهر | تركيز الأجسام المضادة عند أيمن | الأجسام المضادة |
| لـ $10.5 \cdot 5$ | غ/ل 0.17 | |
| | | الوثيقة 2-أ |

- كما تظهر الوثيقة 2-ب تتابع

نكريوتيد لجزء من مورثة XLA

المسئولة عن تركيب إنزيم تيروزين -

كيناز و كذلك السلسل الببتيدية

التي تدخل في تركيب الإنزيم عند

الطفل العادي و عند أيمن .



- بينما الوثيقة 2-ج فتووضح

بعض مراحل نضج الخلية

على مستوى العضو المركزي LB

(نقى العظام) انطلاقاً من الخلية

الجدعية الام في الظروف العاديه .



1- اشرح سبب متلازمة البروتون التي يعاني منها أيمن بإيجاد علاقة منطقية بين معطيات الوثيقة 2 مع التحقق من صحة إحدى الفرضيات .

الجزء الثالث : انطلاقاً من معارفك و هذه الدراسة أنجز مخطط لمختلف الظواهر التي تحدث للخلية LB و في وجود المستضد و ذلك على مستوى أعضاء

الجهاز المناعي .

انتهى الموضوع الثاني
أستاذة المادة
نتحنى لكم التوفيق والنجاح

الاجابة النموذجية مع سلم التقييم للموضوع الأول

| رقم السؤال | التمرين الأول | السؤال | الإجابة الأكثر وجاهة | الاجابة النموذجية | العلامة |
|------------|----------------|--|---|---|----------|
| 1 | | A | الاستجابة ضد سم الدفييريا استجابة مناعية ذات وساطة خلطية تؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة نوعية ضد سم الدفييريا تنتقل في المصل | التعليم الاستجابة ضد سم الدفييريا استجابة مناعية ذات وساطة خلطية تؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة نوعية ضد سم الدفييريا تنتقل في المصل | 0.25 X 2 |
| | | C | عند الحيوان 2 ارتبطت الأجسام المضادة نوعياً مع المستضدات التي حضرت على إنتاجها والمثبتة على المسحوق العاطل | عند الحيوان 2 ارتبطت الأجسام المضادة نوعياً مع المستضدات التي حضرت على إنتاجها والمثبتة على المسحوق العاطل | 0.25 X 2 |
| | | C | عند الحيوان 4 الأجسام المضادة لم ترتبط مع الأناتوكسين الكزازي المثبت على المسحوق العاطل وارتبطت مع سم الدفييريا عند حقنه للحيوان 4 فوقه من الموت | عند الحيوان 4 الأجسام المضادة لم ترتبط مع سم الدفييريا عند حقنه للحيوان 4 فوقه من الموت | 0.25 X 2 |
| | | B | الحيوان 3 يبقى حي لأن الرشاحة تحتوي على أجسام مضادة ضد سم الدفييريا مصدرها مصل الحيوان المحسن لأنها لم ترتبط مع المسحوق العاطل فمرت عبر ورق الترشيح ووقيت الحيوان 3 من الموت. | الحيوان 3 يبقى حي لأن الرشاحة تحتوي على أجسام مضادة ضد سم الدفييريا مصدرها مصل الحيوان المحسن لأنها لم ترتبط مع المسحوق العاطل فمرت عبر ورق الترشيح ووقيت الحيوان 3 من الموت. | 0.25 X 2 |
| 2 | | 2. النص العلمي: | | | |
| 0.25 | | البروتينات جزيئات متخصصة وظيفياً تلعب دوراً هاماً في حماية العضوية من العناصر الغريبة، ولوجاعة العوامل المرضية تم استخدام طرق فعالة مثل اللقاح والاستعمال التي تعتمد أساساً على آليات الرد المناعي الخلطي. | | | |
| 0.25 | | <u>فيما تكمن أهمية كل من الاستعمال والتلقيح في حماية العضوية من العناصر الغريبة؟ وما دور البروتينات في ذلك؟</u> | | | |
| 0.25 | | عند دخول جسم غريب للعضو يتلقى له من المقاومات البائية نتيجة التكامل البيني بين مستقبلها | | | |
| 0.25 | | <u>الغشائي BCR</u> ومحدد المستضد، ينبع عن الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلطية إنتاج عناصر دفاعية من طبيعة | | | |
| 0.25 | | <u>بروتينية</u> من نوع <u>غاما</u> غلوبيلين تدعى <u>الأجسام المضادة</u> التي تنتقل في المصل، فيتم نقل المصل المحسن والحاوي على | | | |
| 0.25 | | <u>الأجسام المضادة النوعية</u> إلى شخص آخر وهو ما يعرف بالاستعمال حيث تمتلك <u>الأجسام المضادة</u> موقعين : | | | |
| 0.25 | | <u>موقع ثبيت</u> <u>محدد المستضد</u> على مستوى المنطقة المتغيرة يتم ثبيت <u>محدد المستضد</u> نتيجة التكامل البيني | | | |
| 0.25 | | <u>بينهما</u> فيشكل معه عقدات مناعية (<u>جسم مضاد - مستضد</u>) فيمنع انتشاره وتكراره ويطرد مفعوله، كما يمتلك <u>موقع</u> | | | |
| 0.25 | | <u>الثبات</u> على <u>المستقبلات الغشائية</u> <u>للماكروفاج</u> مما يسمح <u>بتثبيت العقدات المناعية</u> على <u>المستقبلات الغشائية</u> <u>النوعية</u> | | | |
| 0.25 | | للماكروفاج لتسهيل بلعمتها وهضمها بفضل <u>الأنزيمات</u> <u>الحالة</u> والقضاء على المستضدات بشكل سريع وفعال. | | | |
| 0.25 | | <u>أما التلقيح</u> هو حقن جسم غريب فقد سمته واحتفظ بخصوصيته كمول ضد قادر على توليد استجابة مناعية نوعية | | | |
| 0.25 | | <u>خلطية</u> فيتم إنتاج <u>أجسام مضادة</u> نوعية ضد نفس المستضد وهو ما يعرف بالتلقيح وفي نفس الوقت تتشكل خلايا ذات | | | |
| 0.25 | | <u>الذاكرة LBm</u> قادرة على تنفيذ استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية في حالة دخول المستضد حيث تعمل <u>الأجسام المضادة</u> على الارتباط نوعيه به وتسهيل بلعمتها والقضاء عليه. | | | |
| 0.25 | | اقصاء المستضدات يتطلب دخول بروتينات متخصصة وظيفياً ولحماية العضوية يمكن اللجوء إلى الاستعمال أو | | | |
| 0.25 | | <u>التلقيح</u> <u>اللثان</u> تعتبران فعالتان للقضاء على المستضدات. | | | |
| 1 | التمرين الثاني | 1 (تحديد تأثير مادة الغلوتامات على نوبات الصرع): | | | |
| 0.5 | الجزء الأول | - الشكل (أ) يوضح بنية نهاية عصبية مشبكية حيث تظهر مستقبلات مادة الغلوتامات على مستوى الغشاء بعد مشبك المتمثلة | | | |

| | | |
|------|--|-----------------------|
| | <p>في NMDA , AMPA و تحرر جزيئات الغلوتامات من خلية الحبل الشوكي قبل مشبكية نحو الشق المشبكى.</p> <p>-الشكل (ب) يوضح بنية المستقبل NMDA على مستوى الغشاء بعد مشبكى ويتميز هذا المستقبل البروتيني بوجود موقع لإرتياط الغلوتامات من جهة و موقع لإرتياط الغلايسين أو D-سيرين.</p> <p>-تبين مادة الغلوتامات على موقع الخاص بها للمستقبل NMDA () يؤدي الى افتتاح قنوات بشكل مستمر تسمح بمرور شوارد موجبة المتعلقة بزوال استقطاب النهاية العصبية.</p> <p>ومنه لمادة الغلوتامات Glutamate أثر تحفيزي على الخلايا العصبية و توليد سلالات عصبية مستمرة لفترة زمنية.</p> | |
| 0.75 | <p><u>الجزء الثاني</u></p> <p>من خلال الجدول نلاحظ أن عدد مستقبلات NMDA عند الطفل السليم قليلة مما يسبب تولد عدد قليل من كمונات العمل التي تنتج سلالات عصبية قليلة مقارنة بما يلاحظ عند طفل مصاب بالصرع، وجود عدد أكبر من المستقبلات يؤدي لتولد كمونات عمل متزايدة أي سلالات عصبية كثيرة فاضطرابات وأعراض نوبات الصرع.</p> <p>من خلال الرسم التخطيطي الذي يمثل نهاية عصبية مشبكية توضح العلاقة الوظيفية بين جزيئات الـ GABA وجزيئات دواء الـ BZD ، فإن ارتباط جزيئات GABA على مستقبلاتها الغشائية للغشاء بعد مشبكى يؤدي إلى فتح قنوات كيميائية متخصصة في نفاذية شوارد الـ Cl- في اتجاه تدرج التركيز مما يسبب فرطاً في الاستقطاب مؤدياً إلى كمونات PPSI حيث يحدث تجميع فضائي على مستوى القطعة الابتدائية للعصبون بعد مشبكى فيقلل من تأثير عمل تثبيطية مثبطة في توليد كمونات عمل تثبيطية PPSE ، تتدخل جزيئات الـ BZD كعامل مساعد لنشاط مادة الـ GABA بحيث تثبت على مستقبلاتها الغشائية متساوية في استمرار نفاذية شوارد الـ Cl- وبالتالي إطالة الأثر التثبيطي للـ GABA و التقليل من السلالات العصبية التي تسبب الاضطرابات العصبية و نوبات الصرع.</p> <p>ومنه فإن دواء الـ BZD يمثل عامل مساعد لنشاط مادة الـ GABA في التقليل من نوبات الصرع عند الأطفال</p> | <u>الجزء الثاني</u> |
| 2 | <p>إنجاز مخطط وظيفي:</p> <pre> graph TD GABA[GABA] -- "تشبيط و افتتاح القنوات" --> GABAAR[GABAAR] GABAAR --> ClInflux[نفاذية طردية للـ Cl-] ClInflux --> Relaxation[فرط في الاستقطاب] GABAAR --> NMDA[NMDAR] GABA -- "تشبيط" --> BZD[BZD] BZD --> GABAAR NMDA -- "تشبيط و افتتاح القنوات" --> NaInflux[نفاذية طردية للـ Na+] NaInflux --> Convulsions[الغلوتامات] ClInflux -- "هيولى الزر بعد مشبكى" --> ClRelaxation[نفاذية طردية للـ Cl-] ClRelaxation --> MuscleRelaxation[زوال استقطاب طردي] MuscleRelaxation -- "تحفيز" --> ClConvulsions[نفاذية طردية للـ Cl-] ClConvulsions --> Convulsions ClConvulsions -- "اضطرابات حركية" --> Convulsions ClConvulsions -- "نوبات الصرع" --> Convulsions NMDA -- "تشبيط" --> Clonazepam[الغلوتامات] Clonazepam --> NMDA </pre> <p>ملحوظة: تقبل مخططات أخرى التي تصب في نفس المضمون.</p> <p>مخطط وظيفي يوضح كيفية حدوث نوبات الصرع وكيفية تأثير دواء BZD في التخفيف من نوبات الصرع عند الأطفال.</p> | 2 |
| 0.25 | <p><u>الجزء الأول:</u></p> <p>استغلال الشكل: 1 يمثل الشكل تغيرات النشاط الانزيمى لإنزيم ARN بوليمراز بدلاً من الـ 3 أصناف من البكتيريا حيث نلاحظ أنه قبل إضافة المضاد الحيوي للوسط يكون نشاط إنزيم ARN بوليمراز أعلى عند الأصناف الثلاثة، وبعد إضافة المضاد الحيوي اختلف نشاط الإنزيم في الأصناف البكتيرية الثلاثة حيث تناقص نشاطه بشكل ملحوظ في بكتيريا</p> | <u>التمرين الثالث</u> |

| | |
|------|---|
| | <p>الصنف 3 حتى انعدم في الزمن 0.5 يوم وتناقص بشكل تدريجي عند الصنف 2 حتى بلغ قيمة 50% في الزمن 0.8 يوم، ولم يتأثر نشاطه في بكتيريا الصنف 1.</p> <p>ومنه المضاد الحيوي أثر سلبا على نشاط أنزيم ARN بوليميراز بشكل كبير على الصنف 3 وبشكل ضئيل على الصنف 2 ولا تؤثر على الصنف 3.</p> |
| 0.25 | استغلال الشكل: 2 يمثل الشكل تغيرات أعداد ARNp المرتبط في الأصناف الثلاثة للبكتيريا حيث نلاحظ أن ARNp يكون أكثر ارتباطا في بكتيريا الصنف 3 ويقدر بحوالي 1 (وإ) وعدد ARNp المرتبطة مع الصنف 2 يقدر بحوالي (0.5 و إ) أما عند الصنف 1 يكون عدد ARNp المرتبطة مع المضاد الحيوي ضئيلة جدا أقل من (0.2 و اعتبرية). |
| 0.25 | ومنه ARNp الصنف 3 أكثر ألفة مع المضاد الحيوي مقارنة بالصنفين 1 و 2. |
| 0.5 | ومنه السلالة المقاومة للمضاد الحيوي هي الصنف 1 والسلالتين الحاسمتين هما الصنف 3 والصنف 2 الأقل حساسية. |
| 0.5 | استخراج المشكّلة العلمية: ما سبب مقاومة الصنف 1 للمضاد الحيوي؟ وعدم مقاومة الصنفين 1 و 2 له؟ |
| 0.25 | 2. اقتراح الفرضية: بما أن بكتيريا الصنف 1 هي المقاومة للمضاد الحيوي وبما أن عدد ARNp المرتبطة بالمضاد الحيوي عند هذا الصنف كان ضئيل جداً وبما أن بكتيريا الصنف 2 و 3 هي الحساسة للمضاد الحيوي وعدد ARNp المرتبطة بالمضاد الحيوي عند هذين الصنفين كبير وعليه: |
| 0.25 | <u>الفرضية</u> : يعود سبب مقاومة بكتيريا الصنف 1 بالمضاد الحيوي راجع لمنع ارتباط المضاد بانزيم ARNp بسبب وجود طفرات في المورثة المشرفة على تركيبه. |
| 0.25 | ويعود سبب حساسية بكتيريا الصنف 2 و 3 للمضاد الحيوي راجع لارتباط المضاد بانزيم ARNp نتيجة التكامل البنوي بينهما وتثبيط نشاطه. |
| | ملاحظة: تقبل كل فرضية أخرى بشرط أن تكون وجيهة |
| | الجزء الثاني: استغلال نتائج الوثيقة 2 : |
| 0.25 | استغلال الشكل "أ" يظهر الشكل أن الريفاميسين يرتبط بإنزيم ARNp في مستوى الموقع الفعال مكان ارتباط ADN . مما يدل على وجود تكامل بنوي بينهما. |
| 0.25 | استغلال الشكل "ب": يمثل الشكل عرضاً باستعمال برنامج Anagene لبروتين إنزيمي هو ARNp لدى 3 أصناف بكتيرية حيث نلاحظ أن الأصناف الثلاثة تختلف عن بعضها في بعض الاحاض الأمينة في المواقع 43,60,89,99,129,201 مما يدل على اختلاف البنية الفراغية للموقع الفعال للأنزيم لدى الأصناف الثلاثة. |
| 0.25 | استغلال الشكل (ج): نلاحظ من خلال الشكل أن الموقع الفعال لإنزيم ARNp لدى بكتيريا الصنف 1 يتكون من أربعة أحاض أمينة هي Ser89,Phe99,Asp129,Tyr201 مما يدل على أن البنية الفراغية للموقع الفعال للأنزيم محددة بعدد ونوع وترتيب محدد من الأحاض الأمينة. |
| 0.25 | وعليه فإن الريفاميسين يرتبط بالموقع الفعال لإنزيم ARNp مكان ارتباط ADN نتيجة التكامل البنوي بينهما كمبطٍ تنافسي عند البكتيرية من الصنف 3 ما يعرقل عمل هذا الإنزيم المتمثل في إجراء الاستنساخ فتتوقف بذلك عملية الترجمة ومنه توقف تكاثر الخلايا (التقليل من عددها) فت تكون حساسة |
| 0.75 | أما عند الصنف 2 ونتيجة تغير في الحمضين الأمينيين Glu43,Asn60 القربيان من الموقع الفعال للأنزيم وللذان يساهمان في ثبات واستقرار البنية الفراغية للموقع الفعال مما يعرقل التكامل البنوي التام بين الريفاميسين والموقع الفعال للأنزيم ويستمر نشاط الأنزيم في استنساخ ADN وتركيب البروتين لكن بنسبة أقل فيكون الصنف 2 أقل مقاومة للمضاد الحيوي ، أما عند الصنف 1 الطفرات أدت لتغيير النمط الجزيئي لبروتين ARNp في مستوى الموقع الفعال بتغيير الأحاض Ala 89 بالحمض Ser وحمض His99 بالحمض Phe129 وكذا الحمض Pro129Asp بالإضافة لاستبدال الحمض Ile201 بالحمض Tyr وكلها في مستوى الموقع الفعال ما أدى لفقد قدرة تثبيت المضاد الحيوي واستمرار استنساخ AD N فتستمر عملية تركيب البروتين بشكل طبيعي فتكاثر الخلايا البكتيرية وتفلت من الماد الحيوي. وهو ما يجيب على المشكل العلمي الطروح سابقاً ويؤكد صحة الفرضية المطروحة سابقاً. |
| 0.5 | -اقتراح حل لتجاوز هذه العقبة: استعمال مضاد حيوي مختلف يمكنه التثبت على الموقع الفعال لإنزيم ARN بوليميراز وتثبيط نشاطه مما يسمح بالقضاء على البكتيريا ويعنّع تطورها . |
| 1 | الجزء الثالث: بمجرد اكتشاف الإنسان لأليات تركيب البروتين في الخلايا حاول تطبيق هذا الاكتشاف في معالجة بعض الإصابات |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>المرضية الناتجة عن العدوى البكتيرية حيث تتمكن الإنسان من تطوير علاجات فعالة تدعى المضادات الحيوية التي تعمل على منع تكاثر الخلايا البكتيريا وبالتالي إيقاف العدوى عن طريق وقف عملية هامة هي تركيب البروتين، حيث يمكن أن توقف عملية الاستنساخ بالارتباط مع إنزيم النسخ ARNp مثل الريفاميسين كما يمكن لمضادات أخرى أن توقف تركيب البروتين في مستوى الترجمة أو تنشيط الحمض الأميني . غير أن استعمال هذه المضادات كما أنه يمكن ان يوقف العدوى البكتيرية فإنه يمكن أن يكون سبب في تطور أصناف بكتيرية أخرى في حالة عدم استعمالها بعقلانية وتحت اشراف طبي.</p> | |
|--|--|--|--|

تصحيح الموضع الثاني

| العلامة الكاملة | العلامة المجزأة | الجواب | رقم الجواب | | | | | | |
|---|--|---|----------------|--------|---|----------------------|---|-----------------------|-----|
| | | 1- التعرف على البنتين A و B مع ذكر ميزات كل بنية : | التمرин الاول | | | | | | |
| 2.5 | 0.75 0.25 0.5 1 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>المميزات</th> <th>البنية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- تميز بوجود نوع واحد من الروابط الببتيدية بين الاحماض الامينية ، و عدم وجود اي اانطواء للسلسلة الببتيدية .</td> <td>البنية A: بنية اولية</td> </tr> <tr> <td>- تميز بالشكل الفragي ثلاثي الابعاد الذي تأخذه السلسلة الببتيدية . - تميز بالتفاف لعدد من البنيات الثانوية لسلسلة ببتيدية واحدة تفصلها مناطق انعطاف . - تحافظ على استقرارها بواسطة 4 انواع من الروابط :كبريتية ، شاردية ، هيدروجينية و كارهة للماء بين المجموعات الكيميائية الموجودة في السلسل الجانبيه .</td> <td>البنية B: بنية ثالثية</td> </tr> </tbody> </table> | المميزات | البنية | - تميز بوجود نوع واحد من الروابط الببتيدية بين الاحماض الامينية ، و عدم وجود اي اانطواء للسلسلة الببتيدية . | البنية A: بنية اولية | - تميز بالشكل الفragي ثلاثي الابعاد الذي تأخذه السلسلة الببتيدية . - تميز بالتفاف لعدد من البنيات الثانوية لسلسلة ببتيدية واحدة تفصلها مناطق انعطاف . - تحافظ على استقرارها بواسطة 4 انواع من الروابط :كبريتية ، شاردية ، هيدروجينية و كارهة للماء بين المجموعات الكيميائية الموجودة في السلسل الجانبيه . | البنية B: بنية ثالثية | 5 ن |
| المميزات | البنية | | | | | | | | |
| - تميز بوجود نوع واحد من الروابط الببتيدية بين الاحماض الامينية ، و عدم وجود اي اانطواء للسلسلة الببتيدية . | البنية A: بنية اولية | | | | | | | | |
| - تميز بالشكل الفragي ثلاثي الابعاد الذي تأخذه السلسلة الببتيدية . - تميز بالتفاف لعدد من البنيات الثانوية لسلسلة ببتيدية واحدة تفصلها مناطق انعطاف . - تحافظ على استقرارها بواسطة 4 انواع من الروابط :كبريتية ، شاردية ، هيدروجينية و كارهة للماء بين المجموعات الكيميائية الموجودة في السلسل الجانبيه . | البنية B: بنية ثالثية | | | | | | | | |
| 2.5 | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 | <p>النص العلمي : مقدمة:</p> <p>تحتوي الخلايا الحية على عديد الانواع من البروتينات لكل منها بنيتها و وظيفتها المميزة لها ، كما ان لسلسل الاحماض الامينية دور كبير في تحديد شكل و وظيفة البروتين .</p> <p>المشكلة : كيف تسمح البنية الاولية للبروتين الانزيمي في تحديد تخصصه الوظيفي ؟ العرض :</p> <p>يعد التخصص الوظيفي للبروتين (إنزيم) الى اكتسابه بنية فراغية ثالثية محددة .</p> <p>المعلومة الوراثية هي اصل تنوع الاحماض الامينية عددها و نوعها و ترتيبها (حيث تكون الاحماض الامينية في البنية الاولية متباعدة) و هذا يساهم في تحديد طريقة انتطاء البروتين (ذو البنية الاولية). و بالتالي نوع و عدد الروابط الناشئة بين السلاسل الجانبية (الخذور) للحامض الامينية المتمثلة في الروابط التكافؤية : الكبريتية و اللاتكافؤية : الهيدروجينية ، الشاردية ، الكارهة للماء يؤدي هذا الى تشكيل بنية فراغية طبيعية للبروتين تكسبه وظيفته الفزيولوجية (حيث تكون الاحماض الامينية للموقع الفعال متقاربة مشكلة بذلك موقع التثبيت الذي يتشكل بين جذور الاحماض الامينية المشكلة له و المجموعات الكيميائية للركيزة روابط انتقالية: شاردية ، هيدروجينية نتيجة التكامل البنيوي فيكون الإنزيم نوعي تجاه مادة التفاعل).</p> <p>الخاتمة : البنية الفراغية ثلاثة الابعاد للبروتين يحددنا تسلسل الاحماض الامينية نوعها و عددها في السلسلة الببتيدية وفق المعلومة الوراثية و لكل نوع من انواع البروتينات بنية خاصة و وظيفة البروتين تحددها البنية الفراغية للبروتين .</p> | التمرين الثاني | | | | | | |
| 3 | 0.5 0.25 0.25 0.25 | <p>الجزء الاول :</p> <p>1- تحديد العلاقة بين الانزيم و نمو البكتيريا :</p> <p><u>منحنى الوسط 1:</u> بمثل تغيرات عدد البكتيريا و كمية الإنزيم قبل و بعد اضافة الجلوكوز حيث : تزايد عدد البكتيريا بعد اضافة الجلوكوز مباشرة بينما تendum كمية الإنزيم قبل و بعد اضافة الجلوكوز يدل على نمو البكتيريا في حالة جلوكوز لا يتطلب انتاج انزيم β- جلاكتوزيداز .</p> <p><u>منحنى الوسط 2:</u> بمثل تغيرات عدد البكتيريا و كمية الانزيم و الجلوكوز قبل و بعد اضافة اللاكتوز قبل اللاكتوز : ثبات عدد البكتيريا في قيمة 10 مليون و انعدام كمية الانزيم و الجلوكوز .</p> <p>بعد اضافة اللاكتوز : يظهر انزيم و تزايد كميته حتى يصل الى قيمة عظمى 9 (و 1.8) في $Z=1.8$ سا بينما يظهر جلوكوز و تزايد كميته مع تزايد عدد البكتيريا في نفس اللحظة الزمنية حيث كمية الجلوكوز تصل الى 9.5 (و 1.0)</p> | 7 ن | | | | | | |

| | | | | |
|---|------|------|---|---|
| | | | في ز = 2.15 سا ما يدل على ان فو البكتيريا يتطلب توفر جلوكوز الذي ينبع عن نشاط انزيم β . جلاكتوزيداز و منه العلاقة : - في حالة وجود اللاكتوز فقط : يتوقف فو البكتيريا على انتاج انزيم β . جلاكتوزيداز - في حالة وجود الجلوكوز فقط : فو البكتيريا لا يتطلب انتاج انزيم β . جلاكتوزيداز 2- تبيان تأثير اللاكتوز و الجلوكوز : يبين من المحننات للوثيقة 1 انه في حالة اضافة اللاكتوز يتتوقف عنه ترايد تركيز الانزيم بينما في حالة ظهور الجلوكوز يتناقض ترکیز الانزیم و منه : نستجع ان تأثیر سکر اللاكتوز مخفر على انتاج الانزيم و الجلوكوز مثبط لانتاج الانزيم | الجزء الثاني استغلال الوثيقة 2 : |
| | | 0.25 | الشكل ا: يمثل تغيرات نسبة دمج اليوريدين و تكاثر البكتيريا في شروط تجريبية متغيرة (جلوكوز ، و لاكتوز) - في غياب اللاكتوز و الجلوكوز : انعدم نسبة التكاثر و دمج اليوريدين المشع . - في وجود الجلوكوز فقط : نسبة تكاثر البكتيريا اعظمية 100 % و انعدام دمج اليوريدين المشع - في وجود الاكتوز فقط : نسبة التكاثر البكتيريا و دمج اليوريدين المشع اعظمية . يدل على ان وجود الاكتوز يخفف على دمج اليوريدين دلالة على اللاكتوز عامل منشط لعملية الاستنساخ . | |
| | | 0.5 | الشكل ب: يمثل رسم تخطيطي لآلية كبح مورثة انزيم B . جلاكتوزيداز في حالة غياب الاكتوز في الوسط | |
| 3 | 0.25 | 3 | - يبين انه في حال غياب الاكتوز بروتين الردع يكون حر منشط يرتبط بموقع ثبت انزيم الاستنساخ ARNp فيمنع ثبت انزيم على المورثة يدل على غياب الاكتوز عامل مثبط لعملية الاستنساخ . - اما في حالة وجود الاكتوز بعض جزيئاته ترتبط بالتكامل مع بروتين الردع فيصبح خاملا و البعض يفكك من طرف النزيم بعد تحفيز عملية تركيبة . التوضيح : و منه غياب الاكتوز في الخلية يترك بروتين الردع حر في حالة نشاط يثبط عملية نسخ المورثة انزيم β . جلاكتوزيداز ينتج عنه عدم تركيز انزيم β . جلاكتوزيداز الضروري لحدوث النشاط الايضي مما يمنع حدوثه. | الآلية التخطيطي : 2 |
| | | 0.25 | | |
| | | 0.5 | | الجزء الأول : 1-اقتراح فرضيتين لتفسير سبب مرض اینن او متلازمة بروتون : استغلال الوثيقة 1: |
| 1 | 1 | 1 | تظهر الوثيقة 1- نتائج التحاليل الطبية احرىت لایمن حيث ان حقن اینن بمستضدات الاناتوكسين الكرازي ، الاناتوكسين الدفتيري و الحصبة لم يولد له استجابة مناعية حيث نلاحظ غياب تام او كلي للاجسام المضادة ضد هذه المستضدات . و منه الجهاز المناعي لایمن عاجز على تركيب الاجسام المضادة ضد المستضدات . كما تظهر الوثيقة 1 - ب نتائج المجرة الكهربائية لمصل ثلاثة اطفال ، حيث نلاحظ | التمرين الثالث 8 ن |
| | | 0.25 | الطفل a: مصاب بالالتهاب البكتيري ، كمية الغلوبولينات من النوع Y مرتفعة هذا يدل على ان البكتيريا ولدت استجابة مناعية في عضوية الطفل بالمقارنة مع كميتها عند الطفل b غير مصاب بالالتهاب البكتيري ، التي تكون كميتها قليلة لغياب المستضد الذي يحرض الاستجابة المناعية اما عند اینن اي الطفل c مصاب بالالتهاب البكتيري فتظهر الغلوبولينات المناعية Y منعدمة تماما عنده. | |
| | | 0.5 | | |
| 1 | | | و منه تؤكد الوثيقة 1- ب نتائج المبلنة في الوثيقة 1- الا و هي ان الجهاز المناعي لایمن عاجز على تركيب الاجسام المضادة من النوع الغلوبولينات المناعية Y ضد المستضدات . | |
| | | 0.25 | | |

| | | | |
|------|------|---|----------------|
| | 0.25 | كما يظهر الوثيقة 1 - ج الخلايا LB الناضجة في الاعضاء المحيطية و التي تميز باحتواء غشاءها على اجسام مضادة غشائية BCR حيث في وجود المستضد تتمايز الى خلايا LBP المنتجة للاجسام المضادة تفرز في المصل . | |
| 1 | 0.5 | في الظروف الطبيعية تتواجد الخلايا LB الناضجة في الاعضاء المحيطية ، و اثر دخول مستضادات الى العضوية فان هذه الاخيرة تحرض الخلايا المفاوية لتمايز الى خلايا متوجهة للاجسام المضادة . | من الوثيقة 1 : |
| | 0.5 | و عليه تكون الفرضيات المقترحة كالتالي : | |
| | | - غياب الخلايا LB الناضجة في الاعضاء المحيطية او عجز الجهاز المناعي على تركيب خلايا LB ناضجة . | |
| 1 | 0.5 | - لا تتمايز الخلايا LB الى خلايا LBP المنتجة للاجسام المضادة (لا يحتوي على خلايا منفذة). - حلل في نقى العظام يمنع تركيب الخلايا المناعية عند اين . | |
| | 0.25 | 1- شرح سبب ممتلأمة بروتون التي يعاني منها الطفل اين مع التأكيد من صحة احدى الفرضيات : | الجزء الثاني |
| 1 | 0.25 | - تظهر الوثيقة 2 - 1 : نتائج قياس نسبة المفرويات عند اين و عند اطفال غير مصابين بممتلأمة بروتون حيث نلاحظ ان عدد المفرويات LB في الوسط في الحالة العادبة اي عند الاطفال غير مصابين بممتلأمة بروتون تقدر بـ 0.4- 0.1 . | |
| | 0.5 | 10 7 و لكن تركيزها في عضوية الطفل المريض (اين) قليلة جدا تقدر باقل من 0.1 . 10 7 ، بينما المفرويات LT فسيتها متماثلة عند كل الاطفال (المصابين و غير المصابين بممتلأمة بروتون) . | |
| | 0.25 | كما نلاحظ ان كمية الاجسام المضادة عند اين تكون قليلة جدا حيث تقدر بحوالي 0.17 غ /ل اي تقريباً منعدمة ، بينما تتراوح عند الاطفال غير المصابين بين 5.5- 10 غ /ل في نفس السن . | |
| 1 | 0.25 | و منه : الاطفال المصابون بممتلأمة بروتون لا يملكون الخلايا المفاوية من النوع LB لكن يملكون الخلايا المفاوية LT و عليه هذه النتائج تتفق الفرضية التي تنص على ان هناك حلل في نقى العظام (العضو المركزي) (لأنه مقر نشاد الخلايا الثانية و البائية معاً) | |
| | 0.25 | كما تظهر الوثيقة 2- ب : تتابع نكليوتيديي جزء من مورثة XLA المسؤولة عن تركيب انزيم تيروزين - كيناز و كذلك السلاسل الببتيدية التي تدخل في تركيب الانزيم عند الطفل العادي و عند اين . | |
| | 0.25 | يظهر ان الانزيم الـ XLA العادي يحتوي على PH-TH-SH 3-SH2-KINASE DOMAIN بينما XLA اين يحتوي فقط على -PH-TH و جزء صغير جدا من SH 3, يعود الى حدوث حذف نكليوتيدتين الاولى تقع في الرامزة 214 و الثانية تقع في الرامزة 215 و ما على التوالي T و G و هذا ما ادى الى تغير في تتابع الامino acids من جهة و كذلك الحصول على رامزة توقف في الموقع 223، فتح عنه بروتين غير فعال =غير وظيفي . | |
| | 0.5 | من الوثيقة 2- ج : تظهر ان الخلايا الانشائية لا تملك مؤشرات الـ BCR فتحتحول الى خلايا LB غير ناضجة و هذا بتراكيب مؤشر غشائي غير كامل ، و منه تتحول الى خلايا ناضجة بتداخل انزيم تيروزين - كيناز XLA. | |
| | 0.25 | بذلك : ممتلأمة بروتون ناجحة عن امتلاك الاطفال انزيم XLA غير وظيفي يعود خلل وراثي و هذا الانزيم هو المسؤول عن نضج الخلايا LB ومنه غياب الخلايا LB المؤهلة مناعياً المسؤولة عن التصدي للمستضادات في الاعضاء المحيطية و هذا ما يؤكد الفرضية التي تنص على : | |
| 0.75 | 0.5 | - غياب الخلايا LB الناضجة في الاعضاء المحيطية ، او عجز الجهاز المناعي على تركيب خلايا LB ناضجة و تبني الفرضية التي تنص على ان عضوية اين لا تحتوي على الخلايا المنفذة (LBP) . | |
| 1.25 | | مخطط لمختلف الظواهر التي تحدث للخلية LB في وجود المستضد و ذلك على مستوى اعضاء الجهاز المناعي | الجزء الثالث |
| | | 12 | |

