

# تيسير الرياضيات لطلاب البكالوريا

## الشعب الأدبية

شعبة آداب وفلسفة – شعبة آداب ولغات

للأستاذ: حيمان جمال

HIMANE DJAMEL

أستاذ مادة الرياضيات بمتقن بلقاسم الوزري البليدة

السنة الدراسية 2018-2019

## كلمة المؤلف

باسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين الذي و فقنا و يسر لنا من أمره رشدا ثم الصلاة و السلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله الذي هدى الله به الأمة وأنار بها الظلمة وبعد:

يسّرنا التقدّم بين أيديكم هذا الكتاب وهو قيد التأليف و لأول مرة نسعى إلى تيسير و تسهيل مادة الرياضيات لكل المستويات بمختلف الشعب و نخص منها الشعب الأدبية التي يعاني طلابها من التحكّم في مادة الرياضيات رغم سهولتها وبساطتها و التي ترجع إلى عدة أسباب و عوامل و من أبرزها النظرة السلبية للمادة من طرف منتسبي الشعب الأدبية و التحّجج بتخصصاتهم الأدبية دون أي محاولة لدراسة هذه المادة فهم يقنعون أنفسهم بالفشل و عدم الفهم لأنّياء هم أصلا لم يسألوا عنها أي منهم لم يدركوا ما فهموا وما لم يفهموا فهم يكتسبون غباء و بلادة يعمّم تأثيرها على بقية المواد الأدبية كاللغات التي نخص بالذكر الجانب البلاغي و التركيبي على سبيل المثال الإعراب و ما يرافقه من كوارث ناتجة بالأساس عن فقدان الذكاء و الحنكة التي نلتمسها في المحتوى الرياضي. فأول سبب يجب أن يعالج هو الجانب النفسي اتجاه المادة و فائدتها و تأثيرها حتى و إن تنوّعت و اختلّفت تخصصاتهم المتفرعة عن الشعب الأدبية لدى التحاقهم بمقاعد الجامعة إلا و نتلمّس حضوراً لهذه المادة بطريقة أو أخرى.

ثانياً طرق تقديم دروس هذه المادة بما يتّوافق مع الإمكانيات المادية و البشرية التي تنسجم مع مستوى الطالب من دون إجهاد أو صراعاً مع الزمن لإنتهاء البرامج التي

تحتاج لمراجعات نوعاً وكمّاً و مدى نجاعتها و ملائمتها لخصوصيات التعليم في بلادنا.

كما ننوه أن هذه الطبعة تعد الأولى ولا ريب في احتواها على أخطاء سواء كانت مطبعية أو لغوية أو حتى علمية فعلى الفاعلين في هذا المجال مراسلتنا لتصحيح و تصويب هذه الأخطاء أو الإفادة بأفكار أو حتى بمؤلفات مماثلة لخدمة و تيسير الدراسة بمختلف المستويات والخصصات و لما لا تعميمها على باقي المواد كما نذكر أن هذا المحتوى متاح بإذن من المؤلف مجاناً بصيغته الإلكترونية سواء للطلبة أو الأساتذة لاستغلاله دراسة أو تدريساً أو في المجال البحثي فيما على الطلبة طبعه على شكل كتاب أو مذكرة قصد تسهيل قراءته بانتظام فهو أفضل من الحاسوب الذي يشغل مستعمله عن التركيز المستمر كما نذكر أنه على الطلبة الالتزام بالقرر الدراسي الذي يحدده أستاذهم في الثانوية التي يدرسون بها و يبقى حل التمارين والحوليات خياراً أساسياً لا بديل عنه و وفقكم الله بكل ما هو فيه خير.

وفي الأخير لا ننسونا من صالح دعائكم لنا ولوالدينا ولأئمة المسلمين و عامتهم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# القسمة الإقلدية في مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$

## تذكير وبناء المفاهيم

تعريف مجموعة الأعداد الطبيعية  $\mathbb{N}$ :

نسمي مجموعة الأعداد الطبيعية  $\mathbb{N}$  المجموعة المحصل عليها بإضافة العدد **1** إلى العدد **0** ثم إضافة **1** باستمرار إلى العدد الناتج و هكذا نحصل على مجموعة غير منتهية و أصغر عنصر فيها هو **0**.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots \dots \}$$

خواص مجموعة الأعداد الطبيعية  $\mathbb{N}$ :

1. محدودة من الأسفل أي لها أصغر عنصر وهو الصفر **0**.
2. مجموعة غير منتهية أي ليس لها عنصر أكبر يحدوها.
3. مجموع عددين طبيعيين هو دائماً عدد طبيعي.
4. الفرق بين عددين طبيعيين ليس دائماً عدد طبيعي.
5. جداء عددين طبيعيين هو دائماً عدد طبيعي.
6. قسمة عدد طبيعي على عدد طبيعي غير معروم ليس دائماً عدد طبيعي.

**تطبيق 01:** متى يكون الفرق بين العددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  أي:  $a - b$  عدداً طبيعياً؟

**الجواب:** يكون الفرق بين العددين الطبيعيين  $a - b$  عدداً طبيعياً إذا وفقط إذا كان العدد  $a$  أكبر أو يساوي العدد  $b$  أي:  $a \geq b$  مثال  $10 - 7 = 3$

**ملاحظة:** إذا كان الفرق بين العددين الطبيعيين  $a - b$  سالباً نقول عنه هو عدد صحيح نسيبي سالب. كذلك الأعداد الطبيعية هي أعداد صحيحة نسبية موجبة.

**تطبيق 02:** متى تكون قسمة طبيعي  $a$  على عدد طبيعي غير معدوم  $b$  أي:  $a \div b$  عددا طبيعيا؟.

**الجواب:** تكون قسمة عدد طبيعي  $a$  على عدد طبيعي غير معدوم  $b$  أي:  $a \div b$  عددا طبيعيا إذا وفقط إذا كان باقى قسمة العدد  $a$  على العدد  $b$  معدوما أي:  $a = b \times k + 0$  حيث  $k$  عدد طبيعي مثل العدد 10 يقبل القسمة على 5 لأن  $10 = 5 \times 2 + 0$ .

### تعريف مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$ :

نسمى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية  $\mathbb{Z}$  المجموعة المحصل عليها بإضافة العدد **1** إلى العدد **0** ثم إضافة **1** باستمرار إلى العدد الناتج وكذلك بطرح العدد **1** باستمرار وهكذا نحصل على مجموعة **غير منتهية ومتناهية** بالنسبة إلى **0**.

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$$

### خواص مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ :

1. غير محدودة لا من الأسفل ولا من الأعلى أي ليس لها أصغر عنصر أو أكبر عنصر.
2. مجموعة غير منتهية ومركزها الصفر أي متناهية بالنسبة إلى **0**.
3. يسمى كل عدد صحيح نسي  $a$  - **نظير أو معاكس** العدد الصحيح النسي  $a$ .
4. مجموع وفرق وجداء عددين صحيحين هو دائما عدد صحيح نسي.
5. قسمة عدد صحيح نسي على عدد صحيح نسي غير معدوم ليس دائما عدد صحيحا معدوما.

**تطبيق 03:** متى تكون قسمة عدد صحيح نسي  $a$  على عدد صحيح نسي غير معدوم  $b$  أي:  $a \div b$  عددا صحيحا نسبيا؟.

**الجواب:** تكون قسمة عدد صحيح نسبي  $a$  على عدد صحيح نسبي غير معدوم  $b$  أي:  $a \div b$  عدداً صحيحاً نسبياً إذا وفقط إذا كان باقي قسمة العدد  $a$  على العدد  $b$  معدوماً أي:  $a = b \times k + 0$  حيث  $k$  عدد صحيح نسبي مثل العدد  $-35$  - $35 = 7 \times (-5) + 0$  لأن  $0$  يقبل القسمة على  $7$ .

**ملاحظة:** نسمي قسمة عدد صحيح نسبي  $a$  على عدد صحيح نسبي غير معدوم  $b$  أي:  $a/b$  عدداً **ناطقاً**. ويمكننا تعريف مجموعة الأعداد الناطقة  $\mathbb{Q}$  بمجموعة الأعداد التي تكتب على شكل نسبة أو كسر يكون فيه البسط والمقام عددين صحيحين نسبيين ونخص بالذكر المقام غير معدوم أي لا يساوي الصفر.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

**تحذير:** حذر المقام أبداً لا يكن معدوماً أي لا يساوي الصفر لأن الصفر لا

يقسم أي عدد فالكتابات  $\frac{a}{0}$  خطأً مهما كانت قيمة العدد  $a$  بينما الكتابة  $\frac{0}{b}$

صحيحة وتساوي  $0$  مهما كانت قيمة العدد  $b$  المختلفة عن الصفر.

**تذكير:**

1. الرمز  $\mathbb{N}^*$  يشير إلى مجموعة الأعداد الطبيعية الغير معدومة.

2. الرمز  $\mathbb{Z}^*$  يشير إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية الغير معدومة.

3. الرمز  $\mathbb{D}^*$  يشير إلى مجموعة الأعداد العشرية الغير معدومة.

4. الرمز  $\mathbb{Q}^*$  يشير إلى مجموعة الأعداد الناطقة الغير معدومة.

5. الرمز  $\mathbb{R}^*$  يشير إلى مجموعة الأعداد الحقيقية الغير معدومة.

6. الرمز  $\subseteq$  يشير إلى الاتمام و يستخدم لعنصر أو عدة عناصر منفردة تنتهي إلى مجموعة مثال  $1 \in \mathbb{N}$  و نقرأ العدد 1 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية كذلك  $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ ,  $5, -3, \frac{1}{2}$  و نقرأ الأعداد  $5, -3, \frac{1}{2}$  تنتهي إلى مجموعة الأعداد الناطقة.

7. يجب أن نفرق بين عنصر منفرد و مجموعة تحتوي على عنصر وحيد مثال:  $1 \in \mathbb{N}$  و نقرأ العدد 1 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية بينما الكتابة  $\mathbb{N} \subset \{1\}$  و نقرأ المجموعة المكونة من العدد 1 محتواه في مجموعة الأعداد الطبيعية.

8. نرمز إلى المجموعة الخالية بالرمز  $\emptyset$  أو بالرمز  $\{\}$  وهي المجموعة التي لا تحتوي أي عنصر.

9. الرمز  $\subset$  يشير إلى الاحتواء و يستخدم لمجموعة أو عدةمجموعات محتواه في مجموعة (أي توجد بداخلها) مثال  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$  و نقرأ مجموعة الأعداد الطبيعية محتواه في مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية كذلك لدينا

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

10. الرمز  $\cap$  يشير إلى التقاطع و يستخدم لتقاطع مجموعتين أو عدة مجموعات وهي مجموعة العناصر المشتركة بين هذه المجموعات (أي تنتهي إلى تلك المجموعات في آن واحد) مثال  $\mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^- = \{0\}$  و لدينا أيضاً مجموعة قواسم العدد الطبيعي 21 هي  $d_{21} = \{1, 3, 7, 21\}$  و مجموعة قواسم العدد الطبيعي 15 هي  $d_{15} = \{1, 3, 5, 15\}$  و مجموعة قواسم العدد الطبيعي 3 هي  $d_3 = \{1, 3\}$  و عليه مجموعة القواسم المشتركة للعددين الطبيعيين 15 و 21 هو مجموعة قواسمهما المشترك 3 علماً أن  $3 = \text{pgcd}(15, 21)$  أي  $d_{15} \cap d_{21} = d_3$ .

11. الرمز  $\cup$  يشير إلى الإتحاد ويستخدم لإتحاد مجموعتين أو عدة مجموعات وهي مجموعة العناصر المشتركة والغير مشتركة مأخوذة مرة واحدة من دون تكرار بين هذه المجموعات (أي تنتهي إلى إحدى هذه المجموعات وليس بالضرورة كلها) مثل  $\mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^- = \mathbb{R}$  ولدينا أيضاً مجموعة قواسم إحدى العدددين الطبيعيين 15 أو 21 هي:

$$d_{15} \cup d_{21} = \{1, 3, 5, 7, 15, 21\}$$

12. لغتا نعبر عن التقاطع بحرف العطف "و" أو أي أداة تفيد المشاركة ونعبر عن الإتحاد بحرف العطف "أو" أو أي أداة تفيد الاختيار بين شيئين يمكن الجمع بينهما.

## القسمة الإقلدية في مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$

تعريف العدد الطبيعي التام (عدد مثالي):

نسمى **عدوا طبيعيا تاما** كل عدد طبيعي  $n$  مجموع كل قواسمه الأصغر منه تماما يساوي ذات العدد  $n$ .

**مثال 01:** العدد 6 هو **عدد تام** لأن مجموع قواسمه المختلفة عنه هو 6

$$1 + 2 + 3 = 6 \quad \text{و} \quad d_6 = \{1, 2, 3, 6\}$$

**مثال 02:** العدد 28 هو **عدد تام** لأن مجموع قواسمه المختلفة عنه هو 28

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 \quad \text{و} \quad d_{28} = \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$$

**تطبيق 04:** بإتباع نفس الطريقة بين أن العددان 496 و 8128 عددين تامين.

تعريف العددان **الطبيعيين المترابضيان** (العددان المترابضيان):

نقول عن عددين أنهما **مترابضان** إذا كان مجموع القواسم المختلفة لأي منهما يساوى العدد الآخر. مثال ذلك : العددان 220 و 284 **مترابضان** حيث أن مجموع قواسم

$$1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 \quad \text{هو:}$$

$$1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220 \quad \text{في حين أن مجموع قواسم العدد 284 هو:}$$

:  $\mathbb{Z}$  قابلية القسمة في

**تعريف:**  $a$  و  $b$  عددان صحيحان نسبيان و  $b$  غير معروف. القول أن العدد  $b$  يقسم العدد  $a$  يعني وجود عدد صحيح  $k$  حيث:  $a = b \times k$  حيث كذلك أن  $b$  قاسم للعدد  $a$  أو أن  $a$  مضاعف للعدد .

نكتب  $b | a$  ونقرأ  $b$  يقسم .

أمثلة:

- $48 = 8 \times 6$  نقول أن 8 قاسم للعدد 48 أو أن 48 مضاعف للعدد 8.
- $48 = (-8) \times (-6)$  نقول أن -6 قاسم للعدد 48 أو أن 48 مضاعف للعدد -6.
- $-6 = (-3) \times 2$  نقول أن -3 قاسم للعدد -6 أو أن -6 مضاعف للعدد -3.
- $n = n \times 1$  نقول أن **1** قاسم لجميع الأعداد وكل عدد يقسم نفسه.
- $n \times 0 = 0$  نقول أن كل الأعداد الصحيحة النسبية غير معدومة تقسم 0.
- **٤ حذار الصفر لا يقسم أي عدد.**

**ملاحظة:** للعددين الصحيحين النسبيين  $a$  و  $-a$  - نفس القواسم في المجموعة  $\mathbb{Z}$  أي

$$-a = b \times (-k) \quad \text{و} \quad a = b \times k$$

### القسمة الإقلدية في مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ :

سميت **بالقسمة الإقلدية** نسبة إلى عالم الرياضيات اليوناني **إقليدس** الذي ولد سنة 300 قبل الميلاد و عاش في مدينة الإسكندرية المصرية و تتألف عملية القسمة الإقلدية من العدد الصحيح النسي  $a$  الذي يسمى **المقسوم** و العدد الصحيح النسي الغير معدوم  $b$  و يسمى **القاسم** و عادة ما يكون طبيعيا و من العدد الصحيح النسي  $q$  الذي يسمى **حاصل قسمة** و العدد الطبيعي  $r$  الذي يسمى **الباقي** و هو أصغر تماما من القيمة الموجبة للعدد  $b$ .

- نسمي الكتابة  $|b| > r \geq 0$  حيث :  $a = b \times q + r$  بالكتابية **الأفقية** للقسمة الإقلدية.
- نسمي الشكل الموافق بالكتابية العمودية للقسمة الإقلدية.



**مثال:** القسمة الإقليدية للعدد 115 على 12 هي:  $115 = 12 \times 9 + 7$

$$\begin{array}{r} 115 \\ - 108 \\ \hline 7 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} 12 \\ \hline 9 \end{array} \right.$$

أي حاصل قسمة وباقي قسمة العدد 115 على 12 هما 9 و 7 على التوالي.

**تطبيق 05:** بإتباع نفس الطريقة عين حاصل قسمة وباقي قسمة العدد 89 على 8 والعدد 220 على 10.

**ملاحظة:** إذا كان باقي قسمة  $a$  على  $b$  يساوي الصفر نقول  $b$  يقسم  $a$ .

### خوارزمية أقليدس لتحديد القاسم المشترك الأكبر

**تعريف:** خوارزمية أقليدس هي تقنية تمكنا من تحديد القاسم المشترك الأكبر بين عددين صحيحين نسبيين طبيعيين.

**الطريقة:** نعتبر  $a$  و  $b$  عددين صحيحين نسبيين طبيعيين بحيث  $a > b$ .  
نقوم بقسمة  $a$  على  $b$  وليكن الباقي هو  $r_1$  ثم نقوم بقسمة  $a$  على  $r_1$  وليكن الباقي هو  $r_2$  ثم نقوم بقسمة  $r_1$  على  $r_2$  ولنعتبر أن الباقي هو  $r_3$  ثم نقسم  $r_2$  على  $r_3$  ونكر العملية حتى يكون الباقي هو 0.  
القاسم المشترك الأكبر ل  $a$  و  $b$  هو آخر بقى غير معادل.

**مثال:** القاسم المشترك للعددين الطبيعيين 252 و 855 هو: 9

$$855 = 3 \times 252 + 99$$

$$252 = 2 \times 99 + 54$$

$$99 = 1 \times 54 + 45$$

$$54 = 1 \times 45 + 9$$

$$45 = 5 \times 9 + 0$$

آخر باقي غير معادوم هو: 9 أي:  $\text{pgcd}(855, 252) = 9$

**نتيجة:** إذا كان العدد الطبيعي  $a$  يقسم العدد الطبيعي الغير معادوم  $b$  فإن القاسم المشترك الأكبر لهما هو العدد  $a$  لأن العدد  $a$  يمثل آخر باقي غير معادوم لخوارزمية إقليدس لقسمة العدد  $b$  على  $a$  أي:  $b = a \times q + 0$

**مثال:** القاسم المشترك الأكبر للعددين 322 و 966 هو: 322 لأن 322 يقسم 966.

**الحصر بين مضاعفين متعاقبين لعدد صحيح:**

ليكن  $a$  عدد صحيح نسبي و  $b$  عدد صحيح نسبي غير معادوم و  $q$  حاصل قسمة  $a$  على  $b$  أي  $a = b \times q + r$  نسبي حصرا للعدد الصحيح  $b$  الكتابة التالية بين مضاعفين متعاقبين للعدد الصحيح  $b$

$$b \times q \leq a < b \times (q + 1)$$

**مثال:** 120 < 115 ≤ 108 ≤ 115 هو حصر للعدد 115 بين مضاعفين متتاليين

للهذا صحيح 12 لأن:  $12 \times 9 = 108 \leq 115 < 120 = 12 \times 10$

وهذا بأخذ  $q = 9$  و  $b = 12$  و  $a = 115$

## تمرين محلول 01:

عين باقي قسمة العدد الصحيح  $a$  على العدد الطبيعي  $b$  ثم عين حصراً للعدد  $a$  بين مضاعفين متعاقبين للعدد  $b$  في كل حالة من الحالات الآتية:

$$\text{.} b = 52 \quad \text{و} \quad a = 8159 \quad .\text{i}$$

$$\text{.} b = 91 \quad \text{و} \quad a = 725 \quad .\text{ii}$$

$$\text{.} b = 47 \quad \text{و} \quad a = -7361 \quad .\text{iii}$$

### الحل:

. i أي  $156$  هو باقي القسمة  $8159 = 52 \times 156 + 47$  على  $52$  و  $47$  هو باقي القسمة. إذن

$$\text{.} 8112 \leq 8159 < 8164 \quad \text{أي}$$

. ii أي  $7$  هو باقي القسمة  $725 = 91 \times 7 + 88$  على  $91$  و  $88$  هو باقي القسمة.

$$\text{.} 637 \leq 8159 < 728 \quad \text{أي}$$

. iii أي  $(-157)$  هو باقي القسمة  $-7361 = 47 \times (-157) + 18$  على  $47$  و  $18$  هو باقي القسمة.

قسمة  $-7361$  على  $47$  و  $18$  هو باقي القسمة.

$$\text{.} 47 \times (-157) \leq -7361 < 47 \times (-156) \quad \text{إذن}$$

$$\text{.} -7379 \leq -7361 < -7332 \quad \text{أي}$$

## تمرين محلول 02:

ليكن  $a$  عدد الصحيح باقي قسمته على 21 هو 15.

i. ما هو باقي قسمة العدد على 7 ؟

ii. ما هو باقي قسمة العدد على 3 ؟

الحل: باقي قسمة العدد  $a$  على 21 هو 15 معناه يوجد عدد صحيح  $q$

(حاصل قسمة  $a$  على 21) حيث:  $a = 21 \times q + 15$

.i و عليه  $a = 7 \times (3 \times q) + 7 \times 2 + 1$  تكافئ  $a = 21 \times q + 15$  منه .1 أي باقي قسمة  $a$  على 7 هو 1.

.ii و عليه  $a = 3 \times (7 \times q) + 3 \times 5$  تكافئ  $a = 21 \times q + 15$  منه .0 أي باقي قسمة  $a$  على 3 هو 0.

# الأعداد الأولية وتطبيقاتها

**التذكير بتعريف العدد الطبيعي الأولي:** نسمى عدداً طبيعياً أكيراً تماماً من **1** بالعدد **الأولي** إذا كان له قاسماً مختلفاً فقط وهما العدد **1** والعدد نفسه.

**ملاحظات:**

1. أصغر عدد أولي هو **2**.
2. العدد **1** ليس أولي لأن له قاسم وحيد وهو نفسه.
3. العدد **0** ليس أولياً لأن له ما لا نهاية من القواسم.
4. العدد الذي ليس أولياً يسمى **عدداً مركباً**.
5. يوجد عدد غير منتهي من الأعداد الأولية (مبرهنة إقليدس).
6. كل عدد طبيعي أكبر تماماً من **1** إما هو عدد أولي أو جداء عوامل طبيعية أولية (النظرية الأساسية في الحساب).
7. الأعداد الأولية الأصغر من مئة هي:  
**29 . 23 . 19 . 17 . 13 . 11 . 7 . 5 . 3 . 2 . 97 . 89 . 83 . 79 . 73 . 71 . 67 . 61 . 59 . 53 . 47 . 43 . 41 . 37 . 31**
8. لإثبات عدد طبيعي أنه **ليس أولي** يكفي إيجاد قاسم لهذا العدد مختلف تماماً عن الواحد والعدد نفسه مثال العدد **21** ليس أولي لأنه يقبل **7** كقاسم مختلف عن **1** و **21**.
9. لإثبات عدد طبيعي أنه **أولي** يكفي إثبات أن لا يقبل قاسم أصغر من جذره التربيعي سوى العدد **1** مثال **19** عدد أولي لأن  $\sqrt{19} \approx 4,36$  بينما الأعداد الأولية الأصغر منه وهي **2** و **3** لا تقسم **19** وعليه **19** عدد أولي (تسمى هذه الخاصية بخاصية **إيراطوسن**).

**تطبيق 06:** أدرس أولية الأعداد الطبيعية التالية: 999 ، 45 ، 127 ، 201 ، 109.

### تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل طبيعية أولية:

ليكن  $n$  عدد طبيعياً أكبر تماماً من الواحد ( $n \geq 2$ ) فيكون حسب النظرية الأساسية في الحساب إما هو **عدد أولي** أو يفك إلى **جاء عوامل أولية طبيعية** أي بعبارة أخرى إذا كان  $n$  عدد ليس أولياً فإن تفكيكه إلى جداء عوامل طبيعية أولية تسمى **عملية التحليل إلى جداء عوامل أولية طبيعية**، وللقيام بهذه العملية نقوم بقسمة العدد الطبيعي  $n$  على مجموعة الأعداد الأولية مرتبة تصاعدياً بدءاً من العدد 2 إلى آخر عدد أولي يقسم العدد  $n$  فإذا قبل القسمة على العدد 2 نكرر العملية وإذا لم يقبل نمر إلى العدد الأولي الذي بعده وهو 3 ثم نكرر نفس الإجراء مع باقي الأعداد الأولية 5 ، 7 ، 11 ، ..... إلخ. إلى غاية حصولنا على العدد 1 وهنا تتوقف العملية.

**تطبيق 07:** حلل إلى جداء عوامل طبيعية أولية العدد 720.

#### الحل:

نستعين بالكتابة العمودية لإجراء عمليات القسمة المتتابعة على الأعداد الأولية كما في الشكل المقابل حيث نقوم بقسمة 720 على 2 نحصل على 360 وبقسمة 360 على 2 نحصل على 180 وبقسمة 180 على 2 نحصل على 90 وبقسمة 90 على 2 نحصل على 45 وبما أن 45 لا يقبل القسمة على 2 نمر للعدد الأولي الذي بعده وهو 3 وبقسمة 45 على 3 نحصل على 15 وبقسمة 15 على 3 نحصل على 5 وبما أن 5 لا يقبل القسمة على 3 نمر للعدد الأولي الذي بعده وهو 5 وبقسمة 5 على 5 نحصل على 1 وهنا تتوقف عملية القسمة لحصولنا على العدد واحد.

720	2
360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

كما يمكننا كتابة التحليل أفقيا كما يلي:  
أي المعامل 2 أربع مرات والمعامل 3 مرتين والمعامل 5 مرة واحدة.

**تطبيق 08:** بنفس الطريقة حلل إلى جداء عوامل طبيعية أولية الأعداد .510510 و 257 و 1024 و 25000

### تطبيقات التحليل إلى جداء عوامل طبيعية أولية:

#### ا. تعين عدد قواسم عدد طبيعي :

ليكن  $n$  عدد طبيعيا أكبر تماما من الواحد ( $2 \leq n$ ) فيكون تحليله حسب النظرية الأساسية في الحساب من الشكل:

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_r^{a_r}$$

حيث:  $p_1, p_2, \dots, p_r$  أعداد طبيعية أولية متمايزة مثنى مثنى ( مختلفة عن بعضها البعض ) و  $a_r, a_2, \dots, a_1$  أعداد طبيعية علما أن  $r$  عدد طبيعي غير معدوم. فيكون عدد قواسم العدد الطبيعي  $n$  هو بالضبط الجداء

$$(a_1 + 1) \times (a_2 + 1) \times \dots \times (a_r + 1)$$

**مثال:** تحليل العدد 720 هو كما يلي:

وعليه عدد قواسم العدد 720 هو الجداء  $(4+1) \times (2+1) \times (1+1)$

$$30 = 5 \times 3 \times 2 \quad \text{ويساوي الجداء}$$

**تطبيق 09:** بنفس الطريقة عين عدد قواسم الأعداد الطبيعية 25000 و 257

و 1024 و 510510.

### حل مختصر للتطبيق 09:

عدد قواسم العدد الطبيعي 25000 هو بالضبط 24.

عدد قواسم العدد الطبيعي 257 هو بالضبط 2.

عدد قواسم العدد الطبيعي 1024 هو بالضبط 11.

عدد قواسم العدد الطبيعي 510510 هو بالضبط 128.

## II. تعين مجموعة قواسم عدد طبيعي :

ليكن  $n$  عدد طبيعياً أكبر تماماً من الواحد ( $2 \leq n$ ) فيكون تحليله حسب النظرية الأساسية في الحساب من الشكل:

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_r^{a_r}$$

عند قيامنا بتعويض  $a_1$  بأي عدد طبيعي محصور بين 0 و  $a_1$  في الجداء السابق

نتحصل على قاسم طبيعي للعدد  $n$  وبتكرار العملية مع جميع الأعداد  $a_r, a_2, a_1, \dots, a_1$

في آن واحد نجد كل قواسم العدد الطبيعي  $n$  والتي عددها بالضبط

$$(a_1 + 1) \times (a_2 + 1) \times \dots \times (a_r + 1)$$

**مثال:** تحليل العدد 720 هو كما يلي:

وعليه عدد قواسم العدد 720 هو الجداء  $(4+1) \times (2+1) \times (1+1)$

ويساوي الجداء  $30 = 5 \times 3 \times 2$  وهي كتالي:

$$d_1 = 2^0 \times 3^0 \times 5^0 = 1$$

$$d_2 = 2^0 \times 3^1 \times 5^1 = 5$$

$$d_3 = 2^0 \times 3^1 \times 5^0 = 3$$

$$d_4 = 2^0 \times 3^1 \times 5^1 = 15$$

$$d_5 = 2^0 \times 3^2 \times 5^0 = 9$$

$$d_6 = 2^0 \times 3^2 \times 5^1 = 45$$

$$d_7 = 2^1 \times 3^0 \times 5^0 = 2$$

$$d_8 = 2^1 \times 3^0 \times 5^1 = 10$$

$$d_9 = 2^1 \times 3^1 \times 5^0 = 6$$

$$d_{10} = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 = 30$$

$$d_{11} = 2^1 \times 3^2 \times 5^0 = 18$$

$$d_{12} = 2^1 \times 3^2 \times 5^1 = 90$$

$$d_{13} = 2^2 \times 3^0 \times 5^0 = 4$$

$$d_{14} = 2^2 \times 3^0 \times 5^1 = 20$$

$$d_{15} = 2^2 \times 3^1 \times 5^0 = 12$$

$$d_{16} = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 = 60$$

$$d_{17} = 2^2 \times 3^2 \times 5^0 = 36$$

$$d_{18} = 2^2 \times 3^2 \times 5^1 = 180$$

$$d_{19} = 2^3 \times 3^0 \times 5^0 = 8$$

$$d_{20} = 2^3 \times 3^0 \times 5^1 = 40$$

$$d_{21} = 2^3 \times 3^1 \times 5^0 = 24$$

$$d_{22} = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 = 120$$

$$d_{23} = 2^3 \times 3^2 \times 5^0 = 72$$

$$d_{24} = 2^3 \times 3^2 \times 5^1 = 360$$

$$d_{25} = 2^4 \times 3^0 \times 5^0 = 16$$

$$d_{26} = 2^4 \times 3^0 \times 5^1 = 80$$

$$d_{27} = 2^4 \times 3^1 \times 5^0 = 48$$

$$d_{28} = 2^4 \times 3^1 \times 5^1 = 240$$

$$d_{29} = 2^4 \times 3^2 \times 5^0 = 144$$

$$d_{30} = 2^4 \times 3^2 \times 5^1 = 720$$

وبترتيبها نحصل على كل قواسم 720 وهي:

$$d(720) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 48, 60, 72, 80, 90, 120, 144, 180, 240, 360, 720\}.$$

**تطبيق 10:** بنفس الطريقة عين قواسم العدد الطبيعي 126.

**حل تطبيق 10:** لدينا تحليل العدد 126 إلى جداء عوامل أولية طبيعية هو:

$$126 = 2^1 \times 3^2 \times 7^1$$

وعليه عدد قواسم العدد 126 هو الجداء  $(1 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1)$  هو الجداء

ويساوي الجداء  $12 = 2 \times 3 \times 2$  و هي كتالي:

$$d_1 = 2^0 \times 3^0 \times 7^0 = 1$$

$$d_2 = 2^0 \times 3^0 \times 7^1 = 7$$

$$d_3 = 2^0 \times 3^1 \times 7^0 = 3$$

$$d_4 = 2^0 \times 3^1 \times 7^1 = 21$$

$$d_5 = 2^0 \times 3^2 \times 7^0 = 9$$

$$d_6 = 2^0 \times 3^2 \times 7^1 = 63$$

$$d_7 = 2^1 \times 3^0 \times 7^0 = 2$$

$$d_8 = 2^1 \times 3^0 \times 7^1 = 14$$

$$d_9 = 2^1 \times 3^1 \times 7^0 = 6$$

$$d_{10} = 2^1 \times 3^1 \times 7^1 = 42$$

$$d_{11} = 2^1 \times 3^2 \times 7^0 = 18$$

$$d_{12} = 2^1 \times 3^2 \times 7^1 = 126$$

وبترتيبها نتحصل على كل قواسم 126 وهي:

$$d(126) = \{1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126\}.$$

**تطبيق 11:** بنفس الطريقة عين قواسم الأعداد الطبيعية 78125 و 9999 و 5491 و 1024.

III. تعين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين :

التذكير بتعريف القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين :

ليكن  $a$  و  $b$  عددين طبيعيين غير معدومين. نسمى مجموعة القواسم المشتركة لهذين العددين هي مجموعة كل الأعداد الطبيعية التي تقسم العددين  $a$  و  $b$  في آن واحد و عليه هذه المجموعة ليست خالية (فارغة) لأن العدد 1 دائمًا قاسم مشترك للعددين  $a$  و  $b$  و نسمى أكبر عنصر في هذه المجموعة **بالقاسم المشترك الأكبر** للعددين  $a$  و  $b$  و نرمز له بالرمز  $\text{pgcd}(a, b)$ .

ملاحظات:

1. إذا كان  $\text{pgcd}(a, b) = 1$  نقول عن العددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  أنهما **أوليان** فيما **يبيهما** مثال: 17 و 19 أوليان فيما **يبيهما** لأن  $\text{pgcd}(17, 19) = 1$ .

2. **حذار!** **القاسم المشترك الأصغر** للعددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  هو دائمًا العدد 1.

3. مجموعة القواسم المشتركة للعددين  $a$  و  $b$  هي مجموعة قواسمهما المشتركة الأكبر.

4. يمكننا تعين القاسم المشترك الأكبر للعددين  $a$  و  $b$  بواسطة **خوارزمية إقلides** (**بالقسمة أو بالطرح المتتالي**) و كذلك **بالتحليل** إلى جداء عوامل أولية طبيعية.

$$\text{5. } \text{pgcd}(b, a) = \text{pgcd}(a, b) \quad (\text{تبديلي أي ترتيب العددين غير مهم})$$

6. إذا كان العدد الطبيعي  $a$  يقسم العدد الطبيعي  $b$  فإن  $\text{pgcd}(a, b) = a$

**تطبيق 12:** عين مجموعة القواسم المشتركة للعددين الطبيعيين الكيفيين  $x$  و  $y$  علماً أن قاسمهما المشترك الأكبر هو 24.

**الحل :** نحن نعلم أن مجموعة القواسم المشتركة للعددين الطبيعيين  $x$  و  $y$  هي مجموعة قواسم قاسمها المشترك الأكبر وعليه هي مجموعة قواسم 24.

$$d(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12, 24\}.$$

**تعيين القاسم المشترك الأكبر باستخدام التحليل :**

ليكن  $a$  و  $b$  عددين طبيعيين غير معدومين حيث تحليلهما إلى جداء عوامل أولية يعطى من الشكل:

$$b = q_1^{b_1} \times q_2^{b_2} \times \dots \times q_s^{b_s} \quad \text{و} \quad a = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_r^{a_r}$$

حيث:  $p_1, p_2, \dots, p_r$  أعداد طبيعية أولية متمايزة مثنى متنى (مختلفة عن بعضها البعض) و  $q_1, q_2, \dots, q_s$  على التوالي أعداد طبيعية أولية على التوالي)  $b_s$  على التوالي) أعداد طبيعية علماً أن  $r$  و  $s$  عددين طبيعيين غير معدومين.

وعليه

**القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  هو جداء كل عواملها المشتركة المأخذة بأصغر أنس و من دون تكرار.**

**مثال:** القاسم المشترك الأكبر للعددين 3500 و 7500 هو 500.

$$\text{تحليل العدد } 7500 \text{ هو } 7500 = 2^2 \times 3^1 \times 5^4$$

$$\text{تحليل العدد } 3500 \text{ هو } 3500 = 2^2 \times 5^3 \times 7^1$$

نلاحظ جداء العوامل المشتركة المأكولة بأصغر أنس هو 500 =  $2^2 \times 5^3$

**تطبيق 13:** عين القاسم المشترك الأكبر للعددين 2040 و 6500 بثلاث طرق مختلفة.

**الحل :** **الطريقة الأولى:** (التحليل إلى جداء عوامل أولية)

$$\text{تحليل العدد } 6500 \text{ هو } 6500 = 2^2 \times 5^3 \times 13^1$$

$$\text{تحليل العدد } 2040 \text{ هو } 2040 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 17^1$$

نلاحظ جداء العوامل المشتركة المأكولة بأصغر أنس هو 20 =  $2^2 \times 5^1$

وعليه القاسم المشترك الأكبر للعددين 6500 و 2040 هو 20.

**الطريقة الثانية:** (خوارزمية إقليدس "القسمة")

$$6500 = 3 \times 2040 + 380$$

$$2040 = 5 \times 380 + 140$$

$$380 = 2 \times 140 + 100$$

$$140 = 1 \times 100 + 40$$

$$100 = 2 \times 40 + 20$$

$$40 = 2 \times 20 + 0$$

$\text{pgcd}(2040, 6500) = 20$  أي: آخر باقي غير معادل هو: 20

### الطريقة الثالثة: (خوارزمية إقليدس "الطرح المتتالي")

$$6500 - 2040 = 4460$$

$$4460 - 2040 = 2420$$

$$2420 - 2040 = 380$$

$$2040 - 380 = 1660$$

$$1660 - 380 = 1280$$

$$1280 - 380 = 900$$

$$900 - 380 = 520$$

$$520 - 380 = 140$$

$$380 - 140 = 240$$

$$240 - 140 = 100$$

$$140 - 100 = 40$$

$$100 - 40 = 60$$

$$60 - 40 = 20$$

$$40 - 20 = 20$$

$$20 - 20 = 0$$

آخر باقي غير معروف هو: **20** أي:  $\text{pgcd}(2040, 6500) = 20$

## IV. تعين المضاعف المشتركة الأصغر لعددين طبيعيين :

التدكير بتعريف المضاعف المشتركة الأصغر لعددين طبيعيين :

ليكن  $a$  و  $b$  عددين طبيعيين غير معدومين. نسمى مجموعة المضاعفات المشتركة لهذين العددين هي مجموعة كل الأعداد الطبيعية التي يقسمها العددين  $a$  و  $b$  في آن واحد و عليه هذه المجموعة ليست منتهية (ما لا نهاية) لأن مضاعفات العدد  $a \times b$  دائما هي مضاعفات مشتركة للعددين  $a$  و  $b$  و نسمى أصغر عنصر غير معدوم في هذه المجموعة **المضاعف المشتركة الأصغر** للعددين  $a$  و  $b$  و نرمز له بالرمز  $\text{ppcm}(a, b)$

ملاحظات:

1. إذا كان  $\text{ppcm}(a, b) = a \times b$  نقول عن العددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  أنهما

**أوليان فيما بينهما** مثال: 17 و 19 أوليان فيما بينهما لأن بالرمز

$$\text{ppcm}(17, 19) = 17 \times 19 = 323$$

2. **حذار !** المضاعف المشتركة الأصغر لعددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  مختلف تماما

عن العدد **0**.

3. مجموعة المضاعفات المشتركة لعددين  $a$  و  $b$  هي مجموعة مضاعفات مضاعفهما المشتركة الأصغر.

4. يمكننا تعين المضاعف المشتركة الأصغر لعددين  $a$  و  $b$  بواسطة **تعين أول تقاطع لمجموعتي مضاعفات كل من  $a$  و  $b$**  (هذه الطريقة غير فعالة مع الأعداد الكبيرة) و كذلك **بالتحليل** إلى جداء عوامل أولية طبيعية كما يمكننا استنتاجه بدلالة القاسم المشتركة الأكبر.

5.  $\text{ppcm}(b, a) = \text{ppcm}(a, b)$  (تبديل أي ترتيب العددين غير مهم)

6. إذا كان العدد الطبيعي  $a$  يقسم العدد الطبيعي  $b$  فإن  $\text{ppcm}(a, b) = b$

**تطبيق 14:** عين مجموعة القواسم المشتركة للعددين الطبيعيين الكيفيين  $x$  و  $y$  علماً أن مضاعفهما المشترك الأصغر هو 15.

**الحل :** نحن نعلم أن مجموعة المضاعفات المشتركة للعددين الطبيعيين  $x$  و  $y$  هي مجموعة مضاعفات مضاعفهما المشترك الأصغر وعليه هي مجموعة مضاعفات 15

$$M(15) = \{0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, \dots\}.$$

### تعيين المضاعف المشترك الأصغر باستخدام التحليل :

ليكن  $a$  و  $b$  عددين طبيعيين غير معدومين حيث تحليلهما إلى جداء عوامل أولية يعطى من الشكل:

$$b = q_1^{b_1} \times q_2^{b_2} \times \dots \times q_s^{b_s} \quad \text{و} \quad a = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_r^{a_r}$$

حيث:  $p_1, p_2, \dots, p_r$  أعداد طبيعية أولية متمايزة مثنى مثنى (مختلفة عن بعضها البعض) و  $q_1, q_2, \dots, q_s$  على التوالي) أعداد طبيعية أولية على التوالي) أعداد طبيعية علماً أن  $r$  و  $s$  عددين طبيعيين غير معدومين.

و عليه

**المضاعف المشترك الأصغر للعددين الطبيعيين  $a$  و  $b$**  هو جداء كل عواملهما المشتركة و الغير مشتركة المأخوذة بأكبر أس و من دون تكرار.

**مثال:** المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3500 و 7500 هو 52500.

$$\text{تحليل العدد } 7500 \text{ هو } 7500 = 2^2 \times 3^1 \times 5^4$$

$$\text{تحليل العدد } 3500 \text{ هو } 3500 = 2^2 \times 5^3 \times 7^1$$

نلاحظ جداء العوامل المشتركة والغير مشتركة المأخوذة بأكبر أس هو

$$52500 = 2^2 \times 3^1 \times 5^4 \times 7^1$$

**تطبيق 15:** عين المضاعف المشترك الأصغر للعددين 2040 و 6500 بثلاث طرق

مختلفة.

**الحل :** **الطريقة الأولى:** (التحليل إلى جداء عوامل أولية)

$$\text{تحليل العدد } 6500 \text{ هو } 6500 = 2^2 \times 5^3 \times 13^1$$

$$\text{تحليل العدد } 2040 \text{ هو } 2040 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 17^1$$

نلاحظ جداء العوامل المشتركة والغير مشتركة المأخوذة بأكبر أس هو

$$663000 = 2^3 \times 3^1 \times 5^3 \times 13^1 \times 17^1$$

وعليه المضاعف المشترك الأصغر للعددين 6500 و 2040 هو 663000.

**الطريقة الثانية:** (تعيين أول تقاطع لمجموعتي مضاعفات كل من 6500 و 2040)

مجموعه مضاعفات العدد الطبيعي 2040 هي:

$$M(2040) = \{0, 2040, 4080, 6120, \dots, 660960, 663000, 669500, \dots\}.$$

مجموعه مضاعفات العدد الطبيعي 6500 هي:

$$M(6500) = \{0, 6500, 13000, 19500, \dots, 656500, 663000, 665040, \dots\}.$$

أول تقاطع غير معدوم هو: 663000 أي:

$$ppcm(2040, 6500) = 663000$$

**الطريقة الثالثة:** (استنتاجه بدلالة القاسم المشترك الأكبر)

نعلم أن القاسم المشترك الأكبر للعددين 6500 و 2040 هو 20 و عليه

$$ppcm(2040, 6500) = \frac{2040 \times 6500}{20}$$

أي:

$$ppcm(2040, 6500) = 663000$$

**العلاقة بين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك**

**الأكبر لعددين طبيعيين**

**مبرهنة (نظرية):** ليكن  $(a, b)$  و  $pgcd(a, b)$  هما القاسم المشترك الأكبر

والمضاعف المشترك الأصغر على التوالي للعددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  إذن جداءهما

يساوي جداء هذين العددين أي يتحققان العلاقة:

$$pgcd(a, b) \times ppcm(a, b) = a \times b$$

### تمرين محلول 03:

1. عين المضاعف المشترك الأصغر للعددين 120 و 75 إذا علمت أن قاسميهما

المشترك الأكبر هو 15.

2. عين القاسم المشترك الأكبر للعددين 1530 و 255 إذا علمت أن

مضاعفهما المشترك الأصغر هو 1530.

3. أدرس قيم العدددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  إذا علمت أن مضاعفهما المشترك

الأصغر هو 12 و قاسميهما المشترك الأكبر هو 3.

الحل:

1. تعين المضاعف المشترك الأصغر للعددين 120 و 75

$$ppcm(120, 75) = \frac{120 \times 75}{pgcd(120, 75)} = \frac{120 \times 75}{15} = 600$$

2. عين القاسم المشترك الأكبر للعددين 1530 و 255

$$pgcd(255, 1530) = \frac{255 \times 1530}{ppcm(255, 1530)} = \frac{255 \times 1530}{1530} = 255$$

3. دراسة قيم العدددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  علماً أن مضاعفهما المشترك الأصغر

هو 12 و قاسميهما المشترك الأكبر هو 3. نحن نعلم أن:

$$pgcd(a, b) \times ppcm(a, b) = a \times b = 3 \times 12 = 36$$

إذن نبحث الأعداد الطبيعية التي جداءها يساوي 36 أي:

$a \times b = 36$  وعليه  $a = \frac{36}{b}$  معناه  $a$  و  $b$  قاسمان للعدد 36 وتعطى مجموعة

قواسم 36 من الشكل:

$$d(36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}.$$

يكون عندئذ قيم  $a$  و  $b$  تنتهي مجموعة الثنائيات التالية:

$$(a, b) \in \{(1, 36), (2, 18), (3, 12), (4, 9), (6, 6), (9, 4), (12, 3), (18, 2), (36, 1)\}.$$

وبما أن  $\text{ppcm}(a, b) = 12$  و  $\text{pgcd}(a, b) = 3$  فإن الثنائيات

الوحيدة التي تتحقق المطلوب هي:

$$(a, b) \in \{(3, 12), (12, 3)\}.$$

# القوى الصحيحة و خواصها

التذكير بتعريف القوى الصحيحة :

ليكن  $a$  عدد حقيقي كيقي و  $n$  عدد طبيعي غير معدوم. نسمي القوة ذات الرتبة  $n$  للعدد الحقيقي  $a$  العدد  $a^n$  حيث:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{\text{n عامل}} \quad \text{لدينا}$$

**ملاحظة:** من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم  $a$  و  $n$  عدد طبيعي غير معدوم.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{لدينا}$$

**اصطلاح:**  $a^0 = 1$  من أجل كل عدد حقيقي  $a$  لدينا:

أمثلة:

$$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 1000 \quad .1$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2} = 0.01 \quad .2$$

$$10^{100} = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{\text{100 عامل}} \quad .3$$

نسمي العدد  $10^{100}$  بالعدد **جوجول** "gogol" ومنه أشتق اسم محرك البحث العالمي **Google** للانترنت و يعني العدد 1 متبوع ب 100 صفر.

**خواص:** من أجل كل عددين حقيقيين غير معدومين  $a$  و  $b$  ومن أجل كل

عددين طبيعيين  $n$  و  $m$  لدينا:

$$a^{n+m} = a^n \times a^m \quad .1$$

$$a^{n-m} = \frac{a^n}{a^m} \quad .2$$

$$(a^n)^m = a^{n \times m} = a^{m \times n} = (a^m)^n \quad .3$$

$$(a \times b)^m = a^m \times b^m \quad .4$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad .5$$

$$\mathbf{1}^n = \mathbf{1} \quad .6$$

**لازمة 01:** من أجل كل عدد حقيقي  $a$  و من أجل كل عددين طبيعيين  $r$  و  $n$

(غير معدوم) وكل عدد صحيح نسبي  $q$  لدينا:  $n$

$$a^{n \times q + r} = (a^n)^q \times a^r = (a^q)^n \times a^r$$

**البرهان:** من الخاصية رقم 1 لدينا:

$$a^{n \times q + r} = a^{n \times q} \times a^r$$

و من الخاصية رقم 3 لدينا:

$$a^{n \times q + r} = (a^n)^q \times a^r = (a^q)^n \times a^r$$

لازمة 02:

من أجل كل عدد صحيح نسي  $n$  لدينا:

$$(-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } n \text{ عدد زوجي} \\ -1 & \text{إذا كان } n \text{ عدد فردي} \end{cases}$$

البرهان:

- إذا كان  $n$  عدداً زوجياً فإن  $n = 2 \times k$  عندئذ من الخواص السابقة يكون:

$$(-1)^n = ((-1)^2)^k = (1)^k = 1$$

- إذا كان  $n$  عدداً فردياً فإن  $n = 2 \times k + 1$  عندئذ من اللازمة السابقة يكون:

$$(-1)^n = ((-1)^2)^k \times (-1)^1 = (1)^k \times (-1) = -1$$

# المواافقات في $\mathbb{Z}$

توافق عددان صحيحان نسبيان بتردد عدد طبيعي غير معروف:

ليكن  $a$  و  $b$  عددان صحيحان نسبيان و  $n$  عدد طبيعي غير معروف ، نقول عن العددين  $a$  و  $b$  **متوافقان بتردد العدد  $n$**  إذا كان لهما نفس باقي القسمة الإقلدية على  $n$  ونكتب :  $a \equiv b [n]$  ونقرأ  $a$  يوافق  $b$  بتردد  $n$  أي:  $a$  و  $b$  لهما نفس الباقي عند قسمتهما على  $n$ .

أمثلة:

•  $28 \equiv 13[5]$  ونقرأ 28 يوافق 13 بتردد 5 ومعناه 28 و

13 لهما نفس الباقي عند قسمتهما على 5 وهو العدد 3.

•  $57 - 13 \equiv 10[10]$  ونقرأ 57 يوافق 13 - بتردد 10 و

معناه 57 و 13 - لهما نفس الباقي عند قسمتهما على 10 وهو

العدد 7.

•  $77 \equiv 0[11]$  ونقرأ 77 يوافق 0 بتردد 11 و معناه 77 و

0 لهما نفس الباقي عند قسمتهما على 11 وهو العدد 0.

• من أجل كل عدد صحيح  $x$  لدينا  $x \equiv 0[1]$

**مبرهنة:** ليكن  $a$  و  $b$  عددان صحيحان نسبيان و  $n$  عدد طبيعي غير معروف يكون لهما نفس الباقي في القسمة الإقلدية على  $n$  إذا وفقط إذا كان  $a - b$  مضاعفاً للعدد  $n$ .

**نتيجة:** ليكن  $a$  و  $b$  عدادان صحيحان نسبيان و  $n$  عدد طبيعي غير معدوم يكون له  $a$  و  $b$  متافقان بتردید  $n$  إذا كان  $a - b$  مضاعفاً للعدد  $n$ .

### تمرين محلول 04:

.i. عين باقي قسمة كل من العددان 660 و 366 على 7 . ماذا تلاحظ؟

.ii. هل العددان 274 و 69 متافقان بتردید 3 ؟

.iii. بين أن العددان 4  $a = 234$  و  $b = 146$  متافقان بتردید  $n = 11$

.iv. ما هو باقي قسمة  $b - a$  على  $n$ .

.v. بين أن العددان 4  $a = 174$  و  $b = 109$  متافقان بتردید  $n = 13$

.vi. ما هو باقي قسمة  $b - a$  على  $n$ .

### الحل:

.i. باقي قسمة كل من العددان 660 و 366 على 7 هو 2 نلاحظ أن لهما نفس

الباقي وهو 2 ونقول أن العددان 660 و 366 متافقان بتردید العدد 7 ونكتب :

$$660 \equiv 366[7]$$

.ii. العددان 274 و 69 ليس متافقان بتردید 3 لأن ليس لهما نفس باقي

القسمة على 3 وهم على الترتيب 1 و 0.

.iii. بما أن العددان 4  $a = 234$  و  $b = 146$  لهم نفس باقي قسمة على 11 وهو

3 فهما متافقان بتردید 11  $n = a - b$  عليه باقي قسمة  $n$  على  $a - b$  هو 0 .

.iv. بما أن العددان 4  $a = 174$  و  $b = 109$  لهم نفس باقي قسمة على 13 وهو

5 فهما متافقان بتردید 13  $n = a - b$  عليه باقي قسمة  $n$  على  $a - b$  هو 0 .

**خاصية:** ليكن  $n$  عدد طبيعي غير معادل لـ 1 ( $n \geq 2$ )

كل عدد صحيح يوافق بترديد  $n$  باقي قسمته على  $n$ .

### البرهان:

ليكن  $a$  عدد صحيح و  $r$  باقي قسمته على  $n$  نعلم أن يوجد عدد صحيح  $q$  حيث:  
 $r = n \times q + a$  و  $0 \leq r < n$  ومنه  $0 \leq a < n$  وبتالي  $a$  مضاعف لـ  $n$ .

**ملاحظة:** نقول أن  $r$  هو الباقي إلا إذا كان  $n < r \leq 0$  فمثلاً  $27 \equiv 7[5]$  وليس  $0 \leq 2 < 5 \leq 27$  لأن  $27 \equiv 2[5]$  أما الباقي هو  $2$  لأن  $27 \geq 5$ .

### تمرين محلول 05: (الكتاب المدرسي صفحة 13)

من بين المواقفات الآتية أذكر الصحيحة والخاطئة:

$$26 \equiv 11[5] \quad (1)$$

$$-32 \equiv 18[10] \quad (2)$$

$$478 \equiv 32[5] \quad (3)$$

$$58 \equiv -5[7] \quad (4)$$

$$63^2 \equiv 14[5] \quad (5)$$

$$144 \equiv 11[19] \quad (6)$$

$$131^2 \equiv 25[12] \quad (7)$$

$$48^3 \equiv 36[7] \quad (8)$$

**طريقة:** للبرهان على أن  $a \equiv b[n]$  يمكن البرهان على أن  $a - b$  مضاعف ل  $n$ .  
أو البرهان على أن  $a$  و  $b$  لهما نفس الباقي في القسمة الإقلدية على  $n$ .

### الحل:

$26 \equiv 11[5]$  و  $15 = 3 \times 5$  إذن  $26 - 11 = 15$  صحيحة.  
 $-32 \equiv 18[10]$  و  $-50 = (-5) \times 10$  إذن  $-32 - 18 = -50$  صحيحة.  
 $478 \equiv 32[5]$  و  $446 = 89 \times 5 + 1$  إذن  $478 - 32 = 446$  خاطئة.  
 $478 \not\equiv 32[5]$  ونكتب

$58 \equiv -[7]$  و  $63 = 9 \times 7$  إذن  $58 + 5 = 63$  صحيحة.  
 $63^2 = 3969$  باقي قسمة  $63^2$  على 5 هو إذن 4 وبما أن باقي قسمة العدد 14 على 5 هو كذلك 4 فإن  $63^2 \equiv 14[5]$  صحيحة.

$144 = 19 \times 7 + 11$  وبما أن العدد 144 يوافق بتردد 19 باقي قسمته على 19 صحيحة.

$25 = 2 \times 12 + 1$  و  $131^2 = 1430 \times 12 + 1$  تحصلنا على نفس الباقي في القسمة على 21 إذن  $131^2 \equiv 25[12]$  صحيحة.

$36 = 5 \times 7 + 1$  و  $48^3 = 15799 \times 7 + 6$  لم نحصل على نفس الباقي في القسمة على 7 إذن  $48^3 \not\equiv 36[7]$  خاطئة. ونكتب

## تمرين محلول 06: (الكتاب المدرسي صفحة 13)

عين في كل حالة من الحالات الآتية  $a \equiv b[n]$  باقي قسمة  $a$  على  $n$  و باقي قسمة  $b$  على  $n$ . ثم أذكر صحة أو خطأ المموافقة.

$$262 \equiv 927[5] \quad (1)$$

$$-322 \equiv 78[4] \quad (2)$$

$$471 \equiv 30[8] \quad (3)$$

$$158 \equiv 39[17] \quad (4)$$

الحل:

$$927 = 5 \times 185 + 2 \quad \text{و} \quad 262 = 5 \times 52 + 2 \quad (1)$$

لهمما نفس الباقي في القسمة على 5 إذن  $927 \equiv 2$  و باقي  $262 \equiv 2$  و منه  $262 - 927 = 2$ .

$$262 \equiv 2 \quad \text{صحيحة.}$$

$$-322 = 4 \times (-81) + 2 \quad (2)$$

لهمما نفس الباقي في القسمة على 4  $-322 \equiv 2$  و منه  $2 - 322 = 2$ .

$$-322 \equiv 2 \quad \text{صحيحة.}$$

$$471 = 8 \times 58 + 7 \quad (3)$$

لهمما نفس الباقي في القسمة على 8  $471 \equiv 7$  و منه  $7 - 471 = 2$ .

$$471 \not\equiv 7 \quad \text{خطأ. ونكتب } 471 \equiv 30[8]$$

$$158 = 17 \times 9 + 5 \quad (4)$$

لهمما نفس الباقي في القسمة على 17  $158 \equiv 5$  و منه  $5 - 158 = 2$ .

$$158 \equiv 5 \quad \text{صحيحة.}$$

# خواص المواقفات في $\mathbb{Z}$

## الخاصية 01: "الخاصية الانعكاسية"

من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم ومن أجل كل عدد صحيح  $a$

$$a \equiv a[n] \quad \text{لدينا :}$$

البرهان: لدينا  $n \times a - a = 0$  مضاعف للعدد  $n$ . و منه  $a - a = 0$

## الخاصية 02: "الخاصية التبديلية"

و  $b$  عددان صحيحان و  $n$  عدد طبيعي غير معدوم.

$$b \equiv a[n] \quad a \equiv b[n] \quad \text{إذا كان:}$$

البرهان: إذا كان  $a$  و  $b$  نفس الباقي في القسمة الإقليدية على  $n$  فإن  $a \equiv b$

نفس الباقي في القسمة الإقليدية على  $n$ .

## الخاصية 03: "الخاصية المتعدية"

من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم.  $a, b, c$  أعداد صحيحة.

$$a \equiv c[n] \quad (b \equiv c[n] \quad \text{إذا كان} \quad a \equiv b[n])$$

البرهان:  $a \equiv b$ ,  $b \equiv c$  أعداد صحيحة حيث :

$(b - c) = k \times n$  و  $a - b = k \times n$  يعني  $(b \equiv c[n] \quad a \equiv b[n])$

( $k$  عددان صحيحان) بالجمع طرف إلى طرف نجد

$a \equiv c$  بما أن  $b - c = k + k$  عدد صحيح فإن  $(b \equiv c[n])$

### **الخاصية 04: " خاصية التلاؤم مع الجمع"**

من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معروف.  $d, c, b, a$  أعداد صحيحة.

إذا كان  $a + c \equiv b + d \pmod{n}$  فإن:  $(c \equiv d \pmod{n})$  و  $a \equiv b \pmod{n}$

البرهان:  $(c \equiv d \pmod{n})$  و  $a \equiv b \pmod{n}$  أعداد صحيحة حيث:

$(c - d = k \times n)$  و  $a - b = k \times n$  يعني  $(c \equiv d \pmod{n})$  و  $a \equiv b \pmod{n}$

و  $k$  عددان صحيحان ) بالجمع طرف إلى طرف نجد

$$(a + c) - (b + d) = (k + k) \times n$$

. $a + c \equiv b + d \pmod{n}$  بما أن  $k + k$  عدد صحيح فإن

### **الخاصية 05: " خاصية التلاؤم مع الضرب"**

من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معروف.  $d, c, b, a$  أعداد صحيحة.

إذا كان  $a \times c \equiv b \times d \pmod{n}$  فإن:  $(c \equiv d \pmod{n})$  و  $a \equiv b \pmod{n}$

البرهان:  $(c \equiv d \pmod{n})$  و  $a \equiv b \pmod{n}$  أعداد صحيحة حيث:

$(c - d = k \times n)$  و  $a - b = k \times n$  يعني  $(c \equiv d \pmod{n})$  و  $a \equiv b \pmod{n}$

و  $k$  عددان صحيحان ) لدينا

$$ac - bd = ac - ad + ad - bd = a(c + d) + d(a - b) =$$

$$a kn + dk n = (ak + dk) \times n$$

. $a \times c \equiv b \times d \pmod{n}$  بما أن  $ak + dk$  عدد صحيح فإن

### **الخاصية 06: " خاصية التلاؤم مع القوى الصحيحة"**

من أجل كل عددان طبيعيان غير معروفان  $n$  و  $p$ . و من أجل كل عددان صحيحان

$a^p \equiv b^p \pmod{n}$  إذا كان  $a \equiv b \pmod{n}$  فإن:  $b$  و  $a$ .

## تمرين محلول 07: (الكتاب المدرسي صفحة 15)

لتكن الأعداد الصحيحة التالية:  $c = 3691$  ،  $b = 837$  ،  $a = 255$

1) عين باقي قسمة الأعداد  $a$  ،  $b$  و  $c$  على العدد 11.

2) باستعمال المواقف عين باقي قسمة كل من  $a + b$  ،  $(5 \times a)^{1440}$  ،  $(5 \times a)^{2019}$  ،  $a \times b \times c$

### الحل:

1. باستعمال حاسبة نجد أن بباقي الأعداد عين باقي قسمة الأعداد  $a$  ،  $b$  و  $c$  على 11.  
العدد 11 هي 2 ، 1 ، 6 على الترتيب.

$$3691 = 11 \times 335 + 6 \quad 837 = 11 \times 76 + 1 \quad 255 = 11 \times 23 + 2$$

2. لدينا:  $\begin{cases} a \equiv 2[11] \\ b \equiv 1[11] \end{cases}$  بتطبيق خاصية الجمع نجد  $a + b \equiv 3[11]$  و منه الباقي هو 3.

• لدينا:  $\begin{cases} a \equiv 2[11] \\ c \equiv 6[11] \end{cases}$  بتطبيق خاصية الضرب نجد  $a \times c \equiv 12[11]$  و بما أن

$12 \equiv 1[11]$  بتطبيق خاصية التعدي نجد  $a \times c \equiv 1[11]$  و منه الباقي هو 1.

• لدينا:  $\begin{cases} a \equiv 2[11] \\ b \equiv 1[11] \\ c \equiv 6[11] \end{cases}$  بتطبيق خاصية الجمع نجد  $a + b + c \equiv 9[11]$  و منه الباقي هو 9.

• لدينا:  $a^2 \equiv 4[11]$  بتطبيق خاصية القوى نجد  $a^2 \equiv 2^2[11]$  أي  $a \equiv 2[11]$  و منه الباقي هو 4.

• لدينا:  $\begin{cases} a \equiv 2[11] \\ b \equiv 1[11] \\ c \equiv 6[11] \end{cases}$  بتطبيق خاصية الضرب نجد  $a \times b \times c \equiv 12[11]$  و بما

أن  $12 \equiv 1[11]$  بتطبيق خاصية التعدي نجد  $a \times b \times c \equiv 1[11]$  و منه الباقي هو 1.

- لدينا:  $a \equiv 2[11]$  بتطبيق خاصية الضرب نجد  $5 \times a \equiv 10[11]$  وبما أن  $5 \times a \equiv -1[11]$  بتطبيق خاصية التعدي نجد  $10 \equiv -1[11]$  بتطبيق خاصية القوى نجد  $(5 \times a)^{2019} \equiv (-1)^{2019}[11]$  بما أن  $(5 \times a)^{2019} \equiv -1[11]$  تكافيء  $(-1)^{2019} = -1$ .  $10 \equiv 10[11]$  ومنه الباقي هو  $10$ .
- بنفس الطريقة السابقة نجد  $(5 \times a)^{1440} \equiv 1[11]$  ومنه الباقي هو  $1$ .

### تمرين محلول 08: (الكتاب المدرسي صفحة 15)

- .  $b \equiv 4[5]$  عددان صحيحان حيث  $a \equiv 3[5]$  و  $a + b \equiv 2a + b \equiv 1[5]$  يقبل القسمة على العدد  $5$ .
- أ. بين أن العدد  $2a + b$  يقبل القسمة على العدد  $5$ .
  - ii. عين باقي قسمة العدد  $2a^2 + b^2$  على العدد  $5$ .
  - iii. تحقق أن  $-1[5] \equiv b$ . استنتج باقي قسمة  $b^{2019}$  و  $b^{1440}$  على العدد  $5$ .

### الحل:

i. لدينا:  $\begin{cases} 2a \equiv 1[5] \\ b \equiv 4[5] \end{cases}$  أي  $\begin{cases} 2a \equiv 6[5] \\ b \equiv 4[5] \end{cases}$  و منه  $\begin{cases} a \equiv 3[5] \\ b \equiv 4[5] \end{cases}$  بتطبيق خاصية الجمع  
نحصل على  $2a + b \equiv 0[5]$  و بما أن  $5 \equiv 0[5]$  فإن  $2a + b \equiv 5[5]$  و منه باقي قسمة  $2a + b$  على  $5$  هو  $0$ .  
نستنتج هكذا أن العدد  $2a + b$  يقبل القسمة على  $5$ .

ii. لدينا:  $\begin{cases} 2a^2 \equiv 3[5] \\ b^2 \equiv 1[5] \end{cases}$  أي  $\begin{cases} 2a^2 \equiv 2 \times 9[5] \\ b^2 \equiv 16[5] \end{cases}$  و منه  $\begin{cases} a \equiv 3[5] \\ b \equiv 4[5] \end{cases}$   
بتطبيق خاصية الجمع نحصل على  $2a^2 + b^2 \equiv 4[5]$  و منه باقي قسمة  $2a^2 + b^2$  على  $5$  هو  $4$ .

III. من الواضح أن  $-1[5] \equiv 4$  و منه باستخدام خاصية التعدي نحصل على  $b^{2019} \equiv (-1)^{2019} \equiv -1[5]$ . بتطبيق خاصية القوى نحصل على  $[5]b^{2019} \equiv -1[5]$  أي  $b^{1440} \equiv 1[5]$  و  $b^{2019} \equiv -1[5]$  وبما أن  $b^{1440} \equiv (-1)^{1440}[5]$  فإن  $b^{2019} \equiv 4[5]$  . نستنتج أن باقي قسمة  $b^{2019}$  على 5 هو 4 و باقي قسمة  $b^{1440}$  على 5 هو 1.

# دراسة باقي قوى عدد طبيعي

## دراسة باقي قوى عدد طبيعي حسب القيم الطبيعية للأى

ليكن  $p$  و  $m$  عددان طبيعيان ثابتان غير معدومان **أوليان فيما بينهما** أي  $\text{pgcd}(p, m) = 1$  و ليكن  $n$  عدد طبيعي. الهدف هو معرفة باقي القسمة الإقليدية للعدد  $p^n$  على العدد  $m$  حسب القيم العدد الطبيعي  $n$ . نقوم بدراسة الباقي للقسمة الإقليدية على  $m$  للأعداد  $p^1, p^2, p^3, \dots, p^{n_0}, \dots, p^n$  حيث:  $n_0$  هو أصغر عدد طبيعي غير معروف يحقق العلاقة  $p^{n_0} \equiv 1[m]$  يسمى **الدور** في إجراء القسمة الإقليدية للعدد  $n$  على العدد  $n_0$  نجد:  $n = n_0 \times q + r$  وبتطبيق خواص القوى والموافقات نحصل على  $p^n \equiv p^{n_0 \times q + r} = (p^{n_0})^q \times p^r \equiv (1)^q \times p^r \equiv p^r \equiv t[m]$  حيث  $t$  هو باقي قسمة  $p^r$  على  $m$ . وعليه  $t_1, t_2, t_3, \dots, t_{n_0}, \dots, t_n$  هي باقي قسمة الأعداد  $p^1, p^2, p^3, \dots, p^{n_0}, \dots, p^n$  على  $m$  وفقاً لهذا الترتيب. وعليه باقي قسمة العدد  $p^n$  على  $m$  حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  هي:

1. إذا كان باقي قسمة  $n$  على  $n_0$  هو  $t_1$  ❖

2. إذا كان باقي قسمة  $n$  على  $n_0$  هو  $t_2$  ❖

3. إذا كان باقي قسمة  $n$  على  $n_0$  هو  $t_3$  ❖

⋮ ⋮ ⋮

$n_0 - 1$ . إذا كان باقي قسمة  $n$  على  $n_0 - 1$  هو  $t_{n_0 - 1}$  ❖

0. إذا كان باقي قسمة  $n$  على  $n_0$  هو  $t_{n_0}$  ❖

**مبرهنة:** ليكن  $p$  و  $m$  عددين طبيعيان ثابتان غير معدومان أوليان فيما بينهما أي  $\text{pgcd}(p, m) = 1$  فإنه يوجد على الأقل عدد طبيعي غير معدوم  $n_0$  يحقق العلاقة  $p^{n_0} \equiv 1[m]$  و  $n_0 < m$  وأصغر عدد طبيعي غير معدوم يتحقق هذه الخاصية يسمى الدور.

**ملاحظة:** هذه المبرهنة نتيجة حتمية لنظرية Euler-Fermat

**تحذير !**  $p$  و  $m$  عددان طبيعيان أوليان فيما بينهما يعني  $\text{pgcd}(p, m) = 1$  وليس بالضرورة أنهما أعداد أولية. علينا أن نفرق بين مفهوم العدد الأولي والعدنان الأوليان فيما بينهما. على سبيل المثال: العددان 8 و 9 أوليان فيما بينهما لكن كلاهما ليس أولي.

## تمرين محلول 09: (بكالوريا 2018)

- (1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي قسمة  $2^n$  على 5.
- (2) عين العدد الطبيعي  $a$  بحيث يكون:  $2018 = 4 \times a + 2$ .
- (3) بين أن العدد:  $5 - 2017^8 + 2^{2018}$  يقبل القسمة على 5.
- (4) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $(-3)^n \equiv 2^n[5]$  و  $12^n \equiv 2^n[5]$ .
- (5) ب) عين قيم العدد طبيعي  $n$  بحيث:  $12^n + (-3)^n - 4 \equiv 0[5]$

## الحل:

(1) دراسة باقي قسمة العدد  $2^n$  على 5 حسب قيم العدد الطبيعي  $n$ .

$$2^0 = 1 \equiv 1[5], \quad 2^1 = 2 \equiv 2[5], \quad 2^2 = 4 \equiv 4[5],$$

$$2^3 = 8 \equiv 3[5], \quad 2^4 = 16 \equiv 1[5].$$

نلاحظ أن  $4 = n_0$  هو أصغر عدد طبيعي غير معروف حيث:  $2^{n_0} \equiv 1[5]$  يسمى **الدور** وعليه الكتابة الأفقية للقسمة الإقليدية للعدد الطبيعي  $n$  على 4 هي :

$n = 4 \times q + r$  و بتطبيق خواص المواقف السابقة نحصل على

$$2^n \equiv 2^{4 \times q + r} = (2^4)^q \times 2^r \equiv (1)^q \times 2^r \equiv 2^r[5]$$

وعليه باقي قسمة العدد  $2^n$  على 5 حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  هي:

❖ 1 إذا كان باقي قسمة  $n$  على 4 هو 0.

❖ 2 إذا كان باقي قسمة  $n$  على 4 هو 1.

❖ 4 إذا كان باقي قسمة  $n$  على 4 هو 2.

❖ 3 إذا كان باقي قسمة  $n$  على 4 هو 3.

(2) تعين العدد الطبيعي  $a$  بحيث يكون :  $2018 = 4 \times a + 2$ .

$$504 = a \frac{(2018-2)}{4} = a \quad \text{ومنه} \quad 2018 = 4 \times a + 2$$

(3) إثبات أن العدد:  $2^{2018} + 2017^8 - 5$  يقبل القسمة على 5.

لدينا:  $2018 = 4 \times 504 + 2^{2018} \equiv (2^4)^{504} \times 2^2 \equiv 4[5]$  لأن 2

و  $2017 \equiv 2[5]$  لأن  $2017^8 \equiv (2)^8 \equiv (2^4)^2 \equiv 1^2 \equiv 1[5]$

فيكون إذن  $2^{2018} + 2017^8 - 5 \equiv 4 + 1 - 5 \equiv 0[5]$  أي أن

العدد:  $5 - 2^{2018} + 2017^8$  يقبل القسمة على 5.

(4) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :

بما أن  $12 \equiv 2[5]$  فإن  $12^n \equiv 2^n[5] \equiv 2[5]$  (يمكننا إثبات ذلك بالاستدلال بالرجوع).

بما أن  $2[5] - 3 \equiv (-3)^n \equiv 2^n[5]$  (يمكننا إثبات ذلك بالاستدلال بالرجوع).

ب) تعين قيم العدد طبيعي  $n$  بحيث:  $12^n + (-3)^n - 4 \equiv 0[5]$

من السؤال السابق نستنتج أن:

$2^n + 2^n - 4 \equiv 0[5]$  تكافئ  $12^n + (-3)^n - 4 \equiv 0[5]$  و تكافئ أيضاً

$2^n \equiv 2[5]$  ويكافئ من السؤال الأول باقي قسمة العدد الطبيعي  $n$  على 4 هو 1.

أي  $k \in \mathbb{N}$  حيث  $n = 4k + 1$

## تمرين محلول 10: (بكالوريا 2018)

.  $a = 4b + 6$  عددان صحيحان حيث  $a$  و  $b$

(1) عين باقي القسمة الإقلية للعدد  $a$  على 4.

(2) بين أن العددين  $a$  و  $b$  متواافقان بتردد 3.

(3) نضع  $b = 489$

.  $a \equiv -1[13]$  تحقق أن :

ب) استنتج باقي القسمة الإقلية للعدد  $a^{2018} + 40^{2968}$  على 13.

ج) عين قيم العدد طبيعي  $n$  حتى يكون العدد  $a^{2n} + n + 3$  قابلاً لقسمة على 13.

الحل:

1. تعين باقي القسمة الإقلية للعدد  $a$  على 4.

لدينا:  $a = 4(b+1) + 2$  تكافئ  $a = 4b + 4 + 2$  تكافئ  $a = 4b + 6$ .

أي تكافئ  $a \equiv 2[4]$  و عليه نستنتج أن باقي القسمة الإقلية

للعدد  $a$  على 4 هو 2.

2. إثبات أن العددان  $a$  و  $b$  متوافقان بتردد 3.

لدينا:  $a = 3 \times b + b + 2 \times 3$  تكافئ  $a = 4 \times b + 6$

.  $a \equiv b[3]$  أي  $a - b$  مضاعف للعدد 3 أي  $a = 3 \times (b + 2) + b$

3. من أجل  $b = 489$  لدينا:

و عليه  $a = 4 \times b + 6 = 4 \times 489 + 6 = 1962$  (أ)

.  $a \equiv -1[13]$   $a + 1 = 13 \times 151 \equiv 0[13]$

ب) استنتاج باقي القسمة الإقليدية للعدد  $a^{2018} + 40^{2968}$  على 13.

لدينا  $40^{2968} \equiv (1)^{2968} \equiv 1[13]$  و  $a^{2018} \equiv (-1)^{2018} \equiv 1[13]$

لأن  $40 \equiv 1[13]$

ج) تعين قيم العدد طبيعي  $n$  حتى يكون العدد  $a^{2n} + n + 3$  قابلاً للقسمة على 13

لدينا  $a^{2n} + n + 3 \equiv 0[13]$  فعليه  $a^{2n} \equiv ((-1)^2)^n \equiv 1[13]$

.  $n = 13 \times k + 9$  حيث:  $k$  أي يوجد عدد طبيعي  $k$

# حساب الباقي بالآلة الحاسبة

توجد عدة آلات وبرمجيات تسمح لنا بحساب باقي القسمة الإقليدية للعدد الطبيعي  $a$  على العدد الطبيعي  $b$  نذكر منها الحاسبة العلمية والحاسبة البيانية والحاسوب من خلال برنامجي المجدول Excel و المابل Maple وغيرها كما لا ننسى أن هنالك موقع متخصص على شبكة إنترنت تسمح لنا بإجراء مختلف العمليات الحسابية وبأعداد كبيرة نسبيا.

فعلى سبيل المثال توجد اللمسة **Mod** الملونة بالأصفر على حاسبة الكمبيوتر المحمول تسمح بحساب الباقي مثلا : ندخل الرقم 2019 على الحاسبة ثم نضغط على الزر **Mod** ثم ندخل الرقم 10 ثم نضغط على الزر **=** فنحصل على العدد 9 والذي هو باقي قسمة 2019 على 10 كما هو موضح في الصورة المرفقة.



## تنويم:

اللمسة **Mod** ليست متوفرة في كل الحاسبات العلمية والقياسية لكن مع هذا يمكننا حساب باقي قسمة العدد  $a$  على العدد  $b$  باتباع الطريقة التالية: نقوم بقسمة العدد  $a$  على العدد  $b$  فنحصل على عدد ناطق  $q, t$  يتكون من جزئين جزء صحيح ويمثل حاصل القسمة العدد  $q$  وجزء عشري وهو إما عدد عشري وإما عدد مقرب إلى عدد عشري. فعند طرحنا الجزء الصحيح  $q$  من حاصل قسمة العدد  $a$  على العدد  $b$  نحصل على الجزء العشري فقط  $0, t$  وعند قيامنا بضرب هذا الأخير في العدد  $b$  نحصل على باقي  $r$ .

$$a \div b = q, t$$

المرحلة الأولى:

$$q, t - q = 0, t$$

المرحلة الثانية:

$$0, t \times b = r$$

المرحلة الثالثة:

مثال تطبيقي: احسب باقي قسمة 2019 على 81.

الحل:

$$2019 \div 81 = 24, 925925925 \dots$$

المرحلة الأولى:

$$24, 925 \dots - 24 = 0, 925 \dots$$

المرحلة الثانية:

$$0, 925 \dots \times 81 = 75$$

المرحلة الثالثة:

الخلاصة: باقي القسمة الإقليدية للعدد 2019 على العدد 81 هو 75.

# الاستدلال بالترابع

مبدأ الاستدلال بالترابع (البرهان بالترابع):


**مسلمات:**  $P(n)$  خاصية متعلقة بالعدد الطبيعي  $n$  و  $n_0$  عدد طبيعي. للبرهان على صحة

الخاصية  $P(n)$  من أجل كل عدد طبيعي  $n$  أكبر من أو يساوي  $n_0$  يكفي أن :

1. نتأكد من صحة الخاصية من أجل  $n_0$  أي  $P(n_0)$

2. نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي كي في  $n$  أكبر أو يساوي  $n_0$  أي  $P(n)$

. فرضية التربيع) ونبرهن صحة الخاصية من أجل  $n + 1$  أي  $P(n + 1)$



**ملاحظة:** بصفة عامة المرحلة الأولى تمثل في عملية تحقق بسيطة لا تطرح أي مشكل إلا أنها تبقى ضرورية لأنه يمكن لخاصية أن تكون وراثية لكن خاطئة.

**مثال:** الخاصية: "من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ,  $3^n$  مضاعف للعدد 2" خاطئة رغم أنها وراثية. بالفعل إذا كان  $3^n$  مضاعفاً للعدد 2 فإنه يوجد عدد صحيح  $k$  بحيث:  $3^n = 2k$  لدينا إذن:  $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n = 3(2k) = 2(3k)$  هو الآخر مضاعف للعدد 2.

**مثال توضيحي:** لنثبت صحة الخاصية التالية:

"من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معروف،  $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ "

**المرحلة الأولى:** من أجل  $n = 1$  لدينا:  $1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$  ومنه الخاصية صحيحة من أجل  $n = 1$

**المرحلة الثانية (الوراثة):**

✓ نفرض صحة الخاصية من أجل عدد طبيعي  $n$  حيث  $n \geq 1$  أي:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

✓ لنبرهن صحة الخاصية من أجل  $n + 1$  أي:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n + 1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

لدينا:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n + 1) = (1 + 2 + 3 + \dots + n) + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1)$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

**الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معروف،

### تمرين محلول 11: (الكتاب المدرسي صفحة 17)

أثبت، باستعمال الاستدلال بالترابع، أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ، العدد  $n^3 - n$  مضاعف للعدد 3.

**الحل:** الخاصية " $n^3 - n$  مضاعف للعدد 3" متعلقة بالعدد الطبيعي  $n$ .

نستعمل الاستدلال بالترابع.

**المراحل الأولى:** من أجل  $0 = n$  لدينا:  $0^3 - 0 = 0 = 3 \times 0$  ومنه  $0^3 - 0$  مضاعف للعدد 3. ومنه نستنتج أن الخاصية صحيحة من أجل  $0 = n$ .

**المراحل الثانية (الوراثة):**

✓ نفرض صحة الخاصية من أجل عدد طبيعي  $n$  حيث  $n \geq 0$  أي:  $n^3 - n$  مضاعف للعدد 3.

نضع  $n^3 = 3k + n$  حيث  $k$  عدد طبيعي. ومنه  $n^3 - n = 3k$

✓ لنبرهن صحة الخاصية من أجل  $n + 1$  أي:  $[(n + 1)^3 - (n + 1)]$  مضاعف للعدد 3.

لدينا:

$$(n + 1)^3 - (n + 1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n - 1 = (3k + n) + 3n^2 + 2n$$

$$(n + 1)^3 - (n + 1) = 3k + 3n^2 + 3n = 3(k + n^2 + n)$$

وبما أن  $(n+1)^3 - (n+1)$  مضاعف للعدد 3 نستنتج أن  $3(k+n^2+n)$  مضاعف للعدد 3.

**الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي  $n$ , العدد  $n^3 - n$  مضاعف للعدد 3.

**ملاحظة:** شرح كيفية الحصول على المساواة  $(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$

$$(n+1)^3 = (n+1)(n+1)^2 = (n+1)(n^2 + 2n + 1) \quad \text{لدينا:}$$

$$(n+1)^3 = n^3 + 2n^2 + n + n^2 + 2n + 1 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 \quad \text{و منه}$$

**تعميم:** يمكننا تعميم المتطابقات الشهيرة من أجل عددين حقيقيين  $x$  و  $y$

لدينا:

- $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$
- $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x-y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$
- $(x-y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$

## تمرين محلول 12: (الكتاب المدرسي صفحة 17)

نرمز بـ  $\mathcal{P}(n)$  إلى الخاصية التالية: "العدد 3 يقسم العدد  $1 + n^2$  حيث  $n$  عدد طبيعي".

1. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  إذا كانت  $\mathcal{P}(n)$  صحيحة تكون  $\mathcal{P}(n+1)$  صحيحة.
2. هل يمكننا استنتاج أن الخاصية  $\mathcal{P}(n)$  صحيحة من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ? اشرح.

### الحل:

1. نفرض أن  $\mathcal{P}(n)$  صحيحة من أجل كل عدد طبيعي كي في  $n$ , أي أن العدد 3

يقسم العدد  $4^n + 1 = 3k$  و يمكننا أن نعبر عن ذلك بوضع  $k$

حيث  $k$  عدد طبيعي غير معروف.

لنبرهن أن  $\mathcal{P}(n+1)$  صحيحة أي أن العدد 3 يقسم العدد  $1 + 4^{n+1}$ .

لدينا:  $4^n = 3k - 1$  وبما أن  $4^{n+1} = 4 \times 4^n$  (من الفرضية

$4^{n+1} + 1 = 4 \times (3k - 1) + 1$  : السابقة) نستنتج أن :

$4^{n+1} + 1 = 4 \times 3k - 4 + 1 = 3 \times 4k - 3$  لدينا إذن:

$4^{n+1} + 1 = 3 \times (4k - 1)$  ومنه

لدينا إذن:  $k' = 4k - 1$  وهو عدد طبيعي غير

معدوم. نستنتج أن العدد 3 يقسم العدد  $1 + 4^{n+1}$ . ومنه فالخاصية

$\mathcal{P}(n+1)$  صحيحة.

2. لا يمكننا استنتاج الخاصية  $\mathcal{P}(n)$  صحيحة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  فلا بد

من التتحقق من صحتها من أجل  $n = 0$  لأن وراثية الخاصية تبقى غير كافية.

نلاحظ أن الخاصية ليست صحيحة من أجل  $n = 0$  لأن العدد 3 لا يقسم

العدد 2 وبالتالي فهي غير صحيحة من أجل كل عدد طبيعي  $n$ .

### تمرين محلول 13: (خاصية تلاؤم المواقف مع القوى الصحيحة)

ليكن  $m$  عدداً طبيعياً ثابتاً غير معدوم معطى. أثبت باستخدام الاستدلال بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$ . ومهما يكن العددان الصحيحان  $a$  و  $b$  حيث: إذا كان  $a \equiv b[m]$  فإن:  $a^n \equiv b^n [m]$  .

**الحل: الخاصية** "إذا كان  $a^n \equiv b^n [m]$  فإن  $a \equiv b[m]$ " متعلقة بالعدد الطبيعي  $n$  . نستعمل الاستدلال بالترابع.

**المرحلة الأولى:** من أجل  $1 = n$  لدينا:  $a^1 \equiv b^1 [m]$  (شرط الفرضية) . ومنه نستنتج أن الخاصية صحيحة من أجل  $1$  .

**المرحلة الثانية(الوراثة):**

✓ نفرض صحة الخاصية من أجل عدد طبيعي  $n$  حيث  $1 \leq n$  أي:  $a^n \equiv b^n [m]$  .  
✓ لنبرهن صحة الخاصية من أجل  $n + 1$  أي:  $a^{n+1} \equiv b^{n+1} [m]$  .  
لدينا:  $a^n \equiv b^n [m]$  و  $a \equiv b[m]$  (فرضية التراسب) وحسب خاصية التلاؤم مع الضرب للمواقف نحصل على  $a \times a^n \equiv b \times b^n [m]$  .  
ومنه حسب خواص القوى نجد:  $a^{n+1} \equiv b^{n+1} [m]$  .

**الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$  . ومهما يكن العددان الصحيحان  $a$  و  $b$  حيث: إذا كان  $a \equiv b[m]$  فإن:  $a^n \equiv b^n [m]$  .  
علماً أن  $m$  عدداً طبيعياً ثابتاً غير معدوم معطى.

# معجم مصطلحات رياضية ملحقة بالدرس

الإنجليزية	الفرنسية	العربية
Natural numbers	Nombres Naturels	الأعداد الطبيعية
Integers	Les entiers	الأعداد الصحيحة
Rational Numbers	Les nombres Rationnels	الأعداد الناطقة
Irrational Numbers	Les nombres Irrationnels	الأعداد الصماء
The Real Numbers	Les nombres Réels	الأعداد الحقيقية
Set	Ensemble	مجموعة
Element	Elément	عنصر
Sum	Somme	مجموع
Product	Produit	جداء
Addition	Addition	إضافة(الجمع)
Subtraction	Soustraction	الطرح
Multiplication	Multiplication	الضرب
The Division	La Division	القسمة
Divisor	Diviseur	قاسم
Remainder	Reste	الباقي
Quotient	Quotient	حاصل قسمة
Greatest Common Divisor <b>GCD(a,b)</b>	Plus Grand Commun Diviseur <b>PGCD(a,b)</b>	القاسم المشترك الأكبر
Least Common Multiple <b>LCM(a,b)</b>	Plus P'tite Commun Multiple <b>PPCM(a,b)</b>	المضاعف المشترك الأصغر
Perfect Number	Nombre Parfait	عدد تام (مثالي)
Amicable Numbers	Nombres Amiables	عددان متحابان (متراضيان)

Power	Puissance	القوى
Prime Number	Nombre Premier	عدد أولي
Composite Number	Nombre Composé	عدد مركب (ليس أولي)
Relatively Prime	Premier Entre Eux	عددان أوليان فيما بينهما
Factorization	Factorisation	التحليل
Coefficient	Coefficient	العوامل
Euclidean Division	Division Euclidienne	القسمة الإقليدية
Theorem	Théorème	نظرية (مبرهنة)
Proof	Preuve	البرهان
Congruence	Congruence	الموافقات
Modular	Modulaire	التردد
The Reasoning By Induction	Le Raisonnement Par Récurrence	الاستلال بالترابع (البرهان بالترابع)
Genetic property	Propriété Génétique	خاصية وراثية
Hypothesis	Hypothèse	الفرضية
Definition	Définition	تعريف
Result	Résultat	نتيجة
Conclusion	Conclusion	الخلاصة
Associative Property	Propriété Associative	خاصية تجميعية
Commutative Property	Propriété Commutative	خاصية تبديلية
Distributive Property	Propriété Distributive	خاصية توزيعية
Transitive Property	Propriété Transitive	خاصية متعددة
Solutions	Des solutions	الحلول
Exercise	Exercice	تمرين
Application	Application	تطبيق
The lesson	Leçon	الدرس

# أخطاء شائعة وطرق تصويمها

في هذا الجزء نسعى إلى إبراز أهم الأخطاء التي تتكرر من طرف غالبية التلاميذ أو يتوقع حدوثها وطرق معالجتها قصد تفاديهما أو التقليل من الوقوع فيها مستقبلا.

على التلاميذ أخذها بعين الاعتبار للاستفادة والتعلم من أخطاء وتجربة الآخرين فالسعيد من أتعظ بغيره فالواجب الاستماع لنصائح الأساتذة أثناء الدروس و خاصة الاستفادة من المعالجة أثناء تصحيح الفروض والاختبارات لما لها من أهمية بالغة قصد تدارك الأخطاء والسعى لتصويمها وتفاديها مجددا و هو ما يتغافل عنه الأغلبية نظرا لاشغالهم بالعلامات دون فهم المقصود الفعلي للتقويم أساسا أو اعتقادهم أنه من غير جدوى الاهتمام بالمعالجة سواء كانت نتائجهم سلبية أم إيجابية و من هنا يجب التخلص عن العادات السيئة التي صارت طبعا من الواقع التعليمي في بلادنا كالمراجعة للاختبارات أو الدراسة من أجل إرضاء الأولياء و نحو ذلك دون السعي لكسب و بناء ثقافة علمية قائمة بحد ذاتها و ذلك بإتباع أسس علمية صحيحة كالرغبة الصادقة و الصريحة لحب التعلم متبوعة بالعزيمة والاجتهاد والمثابرة و الصحبة التي تعين على تحديات الدراسة والتحضير الجيد للدرس و المشاركة فيه أثناء تقديمها بطرح استفسارات أو تبسيط مفاهيم و نحوها ليتم في الأخير مراجعة الدروس السابقة في المنزل من دون ملل أو كلل مدعاة بحل التمارين و التطبيقات و التقويمات السابقة للسنوات الماضية للدفعات السابقة للاستفادة من تجاربهم كما ننوه إلى ضرورة بناء المفاهيم خطوة بخطوة و درسا بدرس و عدم الوقوع في فخ التساهل و تخطي مراحل الدرس و ما ينتج عنه في تشوّه و تشابك المفاهيم من دون رابط بينها تؤدي إلى خلل أو تأخير دراسي يعرقل التعليم لدى الطالب والأستاذ معا و نحّذر بشدة من التكبير أو الحياء الزائد اللذان يعيقان المتعلم بصفة عامة.

وكذلك ندعو أساتذتنا الأفضل ومن لهم تجربة وخبرة السنين لإفادتنا في هذا الصدد بما ينفع طلبتنا و يوفقهم لكل ما هو خير.

### تمرين استقصائي:

1. أكتب العددين 1500 و 3500 على شكل جداء عوامل طبيعية أولية.
2. استنتج قيمة كل من القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر لهذين العددين.
3. استنتج الكسر الغير قابل للاختزال الذي يمثل العدد  $\frac{1500}{3500}$ .
4. عين قواسم الأعداد الطبيعية 50, 12, 0.
5. عين بباقي قسمة العدد  $3^n$  على 7 حسب قيم العدد الطبيعي  $n$ .

### الإجابات المختلفة لبعض التلاميذ (عينات):

1. تحليل العددين 1500 و 3500 إلى جداء عوامل طبيعية أولية.

القسم المشترك الثاني	القسم المشترك الأول
$  \begin{array}{r rrr}  3500 & 100 & 1500 & 4 \\  35 & 7 & 375 & 15 \\  5 & 5 & 25 & 5 \\  1 & & 5 & 5 \\  & & 1 &   \end{array}  $ $3500 = 100 \cdot 5 \cdot 7$ $1500 = 4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 15$	$  \begin{array}{r rrr}  3500 & 2 & 1500 & 2 \\  1750 & 2 & 750 & 2 \\  875 & 5 & 375 & 3 \\  175 & 5 & 125 & 5 \\  35 & 5 & 25 & 5 \\  7 & 7 & 5 & 5 \\  0 & & 0 &   \end{array}  $ $3500 = 2^2 \cdot 5^3 \cdot 7$ $1500 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$
القسم المشترك الرابع	القسم المشترك الثالث
$3500 = 2^2 \cdot 5^3 \cdot 7$ $1500 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$	$  \begin{array}{r rrr}  3500 & 2 & 1500 & 2 \\  1750 & 2 & 750 & 2 \\  875 & 5 & 375 & 3 \\  175 & & 125 & 5 \\  & & 25 &   \end{array}  $ $3500 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 175$ $1500 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 25$

## 2. استنتاج القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين 1500 و 3500 .

القلميـة الثـانـيـة	القلميـة الأولـيـة
<p>يـاـستـخدـامـ خـوارـزمـيـةـ الـطـرـحـ المـقـتـالـيـهـ لأـقـلـيـمـ حـدـدـيـنـ</p> <p>نـقـصـلـ عـلـىـ أـخـرـ باـقـيـهـ تـبـيرـ مـعـدـوـهـ هـوـ 500ـ أـيـهـ:</p> $\text{pgcd}(3500, 1500) = 500$ <p style="color: red; margin-top: 20px;"><b>"أـيـهـ إـجـابـةـ خـاطـئـةـ حـولـ حـصـابـ</b> <b>الـمـضـاعـفـ الـمـشـتـركـ الـأـصـغـرـ</b> <b>لـلـعـدـدـيـنـ 3500ـ وـ 1500ـ"</b></p>	<p>يـاـستـخدـامـ خـوارـزمـيـةـ إـقـلـيـدـيـهـ لـلـقـسـمـةـ الـإـقـلـيـدـيـهـ</p> <p>نـقـصـلـ عـلـىـ أـخـرـ باـقـيـهـ تـبـيرـ مـعـدـوـهـ هـوـ 500ـ أـيـهـ:</p> $\text{pgcd}(3500, 1500) = 500$ <p>كـمـاـ يـمـكـنـنـاـ إـسـتـنـاجـ بـدـلـلـةـ</p> <p style="color: red; margin-top: 20px;"><b>"أـيـهـ</b></p> $\text{ppcm}(3500, 1500) = \frac{3500 \cdot 1500}{500}$ $\text{ppcm}(3500, 1500) = 10500$ <p style="color: red; margin-top: 20px;"><b>"أـيـهـ</b></p>
القلميـة الرابعـة	القلميـة الثـالـثـة
<p style="color: red; margin-top: 20px;"><b>"أـيـهـ إـجـابـةـ خـاطـئـةـ حـولـ حـصـابـ</b> <b>الـقـاسـمـ الـمـشـتـركـ الـأـكـبـرـ لـلـعـدـدـيـنـ</b> <b>1500ـ وـ 3500ـ"</b></p> <p>نـقـوهـ بـحـصـابـ مـضـاعـفـاهـ 1500ـ ثـمـ حـصـابـ</p> <p>مـضـاعـفـاهـ 3500ـ ثـمـ نـبـعـثـ عـنـ أـصـغـرـ</p> <p>مـضـاعـفـهـ مشـتـركـ وـ هـوـ 10500ـ وـ عـلـيـهـ</p> $\text{ppcm}(3500, 1500) = 10500$	<p>مـنـ الـمـوـالـ الأولـ نـسـتـنـجـ أـنـ القـاسـمـ الـمـشـتـركـ الـأـكـبـرـ</p> <p>لـلـعـدـدـيـنـ 3500ـ وـ 1500ـ هـوـ جـاءـ تـبـيلـ عـوـاـمـلـ</p> <p>الـمـشـتـركـةـ وـ بـأـكـبـرـ أـمـ منـ دـوـنـ تـكـرارـ أـيـهـ:</p> $\text{pgcd}(3500, 1500) = 500$ <p>بـذـنـسـ الـطـرـوـقـ نـسـتـنـجـ أـنـ المـضـاعـفـ الـمـشـتـركـ الـأـصـغـرـ</p> <p>لـلـعـدـدـيـنـ 3500ـ وـ 1500ـ هـوـ جـاءـ تـبـيلـ العـوـاـمـلـ</p> <p>الـمـشـتـركـةـ وـ بـأـكـبـرـ أـمـ منـ دـوـنـ تـكـرارـ وـ الـعـوـاـمـلـ</p> <p>الـغـيرـ مـشـتـركـةـ لـمـذـنـيـنـ الـعـدـدـيـنـ أـيـهـ:</p> $\text{ppcm}(3500, 1500) = 10500$

3. استنتاج الكسر الغير قابل للاختزال الذي يمثل العدد  $\frac{1500}{3500}$ .

الكلميم الثاني	الكلميم الأول
<p>الحصول على حمر غير قابل للاختزال نقصه كل من البسط و المقام على قاسمها المشترك الأكبر أي:</p> $\frac{1500}{3500} = \frac{1500 \div 500}{3500 \div 500} = \frac{3}{7}$	<p>لدينا من السؤال الأول تحليل العدادين 3500 و 1500 ثم نقوم بخطبة العوامل المتضابمة في كل من البسط و المقام</p> $\frac{1500}{3500} = \frac{\cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{5}}{\cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{7}} = \frac{3}{7}$
الكلميم الرابع	الكلميم الثالث
$\frac{1500}{3500} = 0.4285$	$\frac{1500}{3500} = \frac{1500 \div 100}{3500 \div 100} = \frac{15}{35}$

4. تعين قواسم الأعداد الطبيعية 50, 12, 0.

5. تعين بواقي قسمة العدد  $3^n$  على 7 حسب قيم العدد الطبيعي  $n$ .

القسمة الثانية	القسمة الأولى
كل الأعداد الطبيعية غير معدومة تقسيم العدد 0 إذن يوجد ما لانهاية من القواسم	لا توجد قواسم للعدد 0
قواسم العدد 12 هي: 1,2,3,4,6,12	قواسم العدد 12 هي: 1, 3,4,6
قواسم العدد 50 هي: 1,2,4,20,50	قواسم العدد 50 هي: 2,5,10,25
القسمة الرابعة	القسمة الثالثة
بما أن 6 هو أصغر عدد طبيعي غير معدوم يتحقق العلاقة $3^n \equiv 1 \pmod{7}$ فإن	إذا كان $n = 0 \pmod{7}$ فإن $3^n \equiv 1$ إذا كان $n = 1 \pmod{7}$ فإن $3^n \equiv 3$ إذا كان $n = 2 \pmod{7}$ فإن $3^n \equiv 2$ إذا كان $n = 3 \pmod{7}$ فإن $3^n \equiv 6$ إذا كان $n = 4 \pmod{7}$ فإن $3^n \equiv 4$ إذا كان $n = 5 \pmod{7}$ فإن $3^n \equiv 5$ إذا كان $n = 6 \pmod{7}$ فإن $3^n \equiv 1$

## التعليق والتعقيب على إجابات التلاميذ

بالنسبة لسؤال الأول تحليل الأعداد 3500 و 1500 إلى جداء عوامل أولية طبيعية.

الللميذ الأول: رغم أن إجابته كانت صائبة ونموذجية إلا أنه أخطأ في الخطوة الأخيرة بدل أن يضع العدد 1 (آخر حاصل قسمة) وضع العدد 0 (آخر باقي القسمة) فكثيراً ما تتكرر هذه الأخطاء وهو عدم التفرقة بين حاصل القسمة والباقي.

الللميذ الثاني: لا يفرق بين القسمة على العدد الأولي والعدد غير أولي (وجوب أن تكون العوامل أولية) فكثيراً ما تتكرر هذه الأخطاء وهو عدم إدراك أو استيعاب مفهوم الأعداد الأولية.

الللميذ الثالث: رغم أن إجابته كانت صائبة ونموذجية إلا أنه لا يدرك متى يبني عملية التحليل أو إنهاء عمليات القسمة المتالية.

الللميذ الرابع: رغم أن إجابته كانت صائبة إلا أنها غير كافية لعدم توضيح كيفية الحصول عنها سواء كانت عن طريق الغش أو بالحساب الذهني فالتبير الكتابي مطلوب في كل الأسئلة المشابهة التي تتطلب تعليلاً وهنا هي عمليات القسمة المتتابعة العمودية.

بالنسبة لسؤال الثاني استنتاج القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين 1500 و 3500 .

الللميذ الأول: رغم أن إجابته كانت صائبة إلا أنها لا تتوافق مع طبيعة السؤال الاستنتاجية وليست الحسابية فيما يخص القاسم المشترك الأكبر وتبقى مقبولة فيما يخص المضاعف المشترك الأصغر.

الللميذ الثاني: نفس الملاحظة فيما يخص التلميذ الأول.  
الللميذ الثالث: إجابته كانت صائبة ونموذجية.

الللميذ الرابع: نفس الملاحظة فيما يخص التلميذ الأول بالنسبة لاستنتاج المضاعف المشترك الأصغر.

**بالنسبة لسؤال الثالث استنتاج الكسر الغيرقابل للاختزال الذي يمثل العدد  $\frac{1500}{3500}$ .**

الللميذ الأول: رغم أن إجابته كانت صائبة و نموذجية إلا أنها ليست الإجابة المثالية.

الللميذ الثاني: إجابته كانت صائبة و نموذجية وهي الإجابة المثالية.

الللميذ الثالث: إجابته كانت خاطئة و تدل على عدم استيعابه للدرس.

الللميذ الرابع: إجابته كانت خاطئة و تدل على عدم تمكنه من فهم السؤال نتيجة تأخر دراسي قد يمتد إلى عدة سنوات أي هو في حالة يرثى لها.

**بالنسبة لسؤال الرابع تعين قواسم الأعداد الطبيعية 0, 12, 50 .**

الللميذ الأول: إجابته كانت خاطئة بينما الللميذ الثاني إجابته كانت صائبة و نموذجية فيما يخص قواسم العدد 0 و هذا الأمر ناتج عن عدم التفرقة بين أن كل الأعداد الطبيعية الغير معدومة تقسم العدد 0 بينما الصفر لا يقسم أي عدد .

بينما العددان 12 و 50 فيظهران لنا تجاهل بعض الللميذ أول قاسمين معروفين وهوما العدد 1 و العدد نفسه إضافة لعدم فهم درس القواسم لعدد صحيح على عدد طبيعي فيكون حاصل القسمة هو عدد صحيح وليس كما يظن بعض الللميذ أن فاصلته منتهية (عدد عشري).

**بالنسبة لسؤال الرابع تعين بواقي قسمة العدد  $3^n$  على 7 حسب قيم العدد الطبيعي n .**

الللميذ الثالث: إجابته كانت خاطئة بينما الللميذ الرابع إجابته كانت صائبة و نموذجية فيما يخص الللميذ الثالث يبدو أن له فهم سطحي لدرس بواقي قسمة قوى عدد طبيعي على عدد طبيعي غير معدوم ولم يستوعبه كاملا فعليه مراجعته و حل مزيدا من التمارين المشابهة والتي تطرح أفكارا جديدة.

بِإِنْسَانٍ إِلَهٍ

انتظروا بقية

الدروس في

قادم الأيام

# قابلية القسمة على الأعداد 3 و 9

## قابلية القسمة على 2:

ليكن  $n$  عدداً طبيعياً كيقياً. نقول أن العدد  $n$  يقبل القسمة على 2 إذا وفقط إذا كان رقم أحادية ينتهي بأحد الأعداد 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8.

مثال: الأعداد 98658، 96، 1000، 822، 1024 تقبل القسمة على 2 بينما الأعداد 94655، 97، 1493، 811، 1079 لا تقبل القسمة على 2.

## قابلية القسمة على 5:

ليكن  $n$  عدداً طبيعياً كيقياً. نقول أن العدد  $n$  يقبل القسمة على 5 إذا وفقط إذا كان رقم أحادية ينتهي بأحد الأعداد 0 أو 5.

مثال: الأعداد 98655، 95، 1000، 825، 1020 تقبل القسمة على 5 بينما الأعداد 94658، 97، 1493، 811، 1079 لا تقبل القسمة على 5.

## قابلية القسمة على 3:

**مبرهنة:** ليكن  $n$  عدداً طبيعياً كيقياً. نقول أن العدد  $n$  يقبل القسمة على 3 إذا وفقط إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3.

## البرهان:

نحن نعلم أن كل عدد طبيعي  $n$  يكتب في النظام العشري على الشكل:

$$n = a_m \dots a_4 a_3 a_2 a_1 a_0$$

حيث:  $a_0$  هو رقم الآحاد و  $a_1$  هو رقم العشرات و  $a_2$  هو رقم المئات و  $a_3$  هو رقم الآلاف وهكذا باقي الأرقام ..... أي أن:

$$n = a_m 10^m + \dots + a_3 10^3 + a_2 10^2 + a_1 10^1 + a_0$$

بما أن :  $10 \equiv 1[3]$  بتطبيق خاصية القوى للموافقات فإن  $a_m 10^m \equiv a_m [3]$  و بتطبيق خاصية الضرب نحصل على  $10^m \equiv 1[3]$

مهما تكن قيمة العدد  $m$  و بتطبيق خاصيتي الجمع والضرب مع جميع الحدود نجد:

$$n \equiv a_m + \dots + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 [3]$$

وعليه العدد الطبيعي العدد  $n$  يقبل القسمة على **3** إذا و فقط إذا كان **مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3**.

وبإتباع نفس البرهان مع العدد **9** نبرهن أن العدد  $n$  يقبل القسمة على **9** إذا و فقط إذا كان **مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9**.

## قابلية القسمة على **9**:

**مبرهنة:** ليكن  $n$  عدداً طبيعياً كيفياً. نقول أن العدد  $n$  يقبل القسمة على **9** إذا و فقط إذا كان **مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9**.