


## دراسة حركة القذائف الفيزيقية




**الشروط الابتدائية:** تختلف الشروط الابتدائية حسب الحركة المدروسة.

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 \\ y_0 &= 0 \end{aligned}$$

$$\cos \alpha = \frac{v_{0x}}{v_0} \Rightarrow v_{0x} = v_0 \cos \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{v_{0y}}{v_0} \Rightarrow v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

$$\begin{cases} v_x = v_B \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_B \sin \alpha \end{cases}$$



عند قذفة كرة بسرعة ابتدائية غير شاقولية نحصل على حركة مسارها موضح في الشكل:

### - 1 المعادلات التفاضلية:

$$\begin{aligned} \sum \vec{F} &= m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{g} = \vec{a} \\ \Rightarrow \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = 0 \\ \frac{d^2y}{dt^2} = -g \end{cases} \end{aligned}$$

- طبيعة الحركة على المحاور:

- الحركة على المحور ( $ox$ ) حركة مستقيمة منتظمة لأن  $a_x = 0$

- الحركة على المحور ( $oy$ ) حركة مستقيمة متغيرة بانتظام متباطئة في مرحلة الصعود ومتضادة في النزول.

### - 2 المعادلات الزمنية:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{g} = \vec{a}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

- معادلات السرعة: بالتكامل نجد:

$$\Rightarrow \begin{cases} v_x = v_{0x} \\ v_y = at + v_{0y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

- معادلات الموضع: بالتكامل نجد:

$$\Rightarrow \begin{cases} x = v_{0x}t + x_0 \\ y = \frac{1}{2}at^2 + v_{0y}t + y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = v_0 \cos \alpha t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t \end{cases}$$

- معادلة المسار:

$$\begin{aligned} x &= v_0 \cos \alpha t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \\ \Rightarrow y &= -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t \Rightarrow y = -\frac{1}{2}g \left( \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + v_0 \sin \alpha \left( \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right) \\ &\Rightarrow y = -\frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha x \end{aligned}$$

- نقاط خاصة في مسار القذيفة:

- الذروة: وهي أعلى موضع تصلكه الكرة.

$$v_y = 0 \quad \text{عند الذروة يكون}$$

$$v_y = -gt + v_0 \sin \alpha = 0 \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

نعرض في معادلات الموضع نحصل على احداثيات الذروة.


- المدى: هو أقصى مسافة نقطتها الكرة. حسب الشكل  $x = d = OM = 0M$  أي أن  $x = 0$ .

$$y = -\frac{gd^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha d = 0 \Rightarrow \frac{gd}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} = \tan \alpha \Rightarrow d = \frac{2v_0^2 \cos^2 \alpha \times \tan \alpha}{g}$$

$$\Rightarrow d = \frac{2v_0^2 \cos \alpha \times \sin \alpha}{g} \Rightarrow d = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

- مناقشة المدى: يكون المدى أعظمياً عندما يكون  $\sin 2\alpha = 1$  أي  $2\alpha = 90^\circ$  ومنه  $\alpha = 45^\circ$

#### 5- مخططات السرعة:



من المخططات يمكن استنتاج كلاً من الزاوية  $\alpha$  والسرعة الابتدائية  $v_0$ .

$$v_0^2 = v_{0x}^2 + v_{0y}^2$$

$$\sin \alpha = \frac{v_{0y}}{v_0} \quad , \quad \cos \alpha = \frac{v_{0x}}{v_0} \quad , \quad \tan \alpha = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}$$

#### 6- ملاحظات هامة:

$$v_B^2 - v_A^2 = 2gh_{AB}$$

• استعمال مبدأ انحصار الطاقة للجملة (كرة+ارض) بين الموضعين  $A$  و  $B$ .


$$E_{CA} + E_{PPA} = E_{CB} + E_{PPB}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

$$\Rightarrow mgh_A - mgh_B = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$\Rightarrow gh_A - gh_B = \frac{1}{2}v_B^2 - \frac{1}{2}v_A^2$$


$$\Rightarrow v_B^2 - v_A^2 = 2g(h_A - h_B)$$



### التمرين 1: بكالوريا رياضيات 2011-بتصرف

في لعبة رمي الجلة، يقذف اللاعب في اللحظة  $t = 0$  الجلة من ارتفاع  $oz_0 = h = 2.0m$  من سطح الأرض، بسرعة ابتدائية:  $v_0 = 13.7 m/s$  ، شعاعها يصنع زاوية  $\alpha = 35^\circ$  . نهمل تأثير الهواء (مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس) ونأخذ  $g = 9.8m \times s^{-2}$

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على القذيفة في المعلم المبين على الشكل استخرج:



أ- المعادلات التقاضية للحركة.

ب- المعادلات الزمنية للحركة.

2- اكتب معادلة المسار  $z = f(t)$ .

3- أوجد احداثيات  $M$  نقطة سقوط القذيفة. وما هي سرعتها عندئذ؟

4- نريد ان يكون مدى أعظميا، ما هي الزاوية التي يجب ان تقذف بها الجلة؟ ثم

حدد قيمة المدى حينئذ علما ان اللاعب يقذف الجلة بنفس السرعة  $v_0$  .

### التمرين 2: بكالوريا علوم تجريبية 2012

خلال منافسة رمي الجلة في الألعاب الأولمبية بكين، حقق الرياضي الذي فاز بهذه المنافسة

النتيجة  $d = 21.51m$  . اعتمادا على الفلم المسجل لعملية الرمي ولأجل معرفة قيمة

السرعة  $v_0$  التي قذفت بها الجلة، تم استخراج بعض المعلومات أثناء لحظة الرمي:

- قذفت الجلة من النقطة  $A$  الواقعه على ارتفاع  $h_A = 2m$  بالنسبة لسطح الأرض

وبالسرعة  $v_0$  التي تصنع زاوية  $\alpha = 45^\circ$  مع الخط الافقى.

ندرس حركة الجلة في المعلم المتعامد والمتجانس  $(O, \bar{i}, \bar{k})$  ونختار اللحظة الابتدائية  $t = 0$

هي اللحظة التي يتم فيها قذف الجلة من النقطة  $A$  . نهمل احتكاكات الجلة مع الهواء ودافعة

ارخميدس بالنسبة لقوة نقل الجلة.

1- جد المعادلتين الزمنيتين  $x = f(t)$  و  $z = h(t)$  المميزتين لحركة الجلة في المعلم المختار.


- استنتج معادلة مسار الجلة  $z = g(t)$  بدلالة المقادير  $v_0$  ،  $h_A$  ،  $\alpha$  ،  $g$  .

2- جد عباره السرعة الابتدائية  $v_0$  بدلالة  $h_A$  ،  $\alpha$  ،  $g$  و  $d$  ثم احسب قيمتها.

3- جد المدة الزمنية التي تستغرقها الجلة في الهواء.

### التمرين 3: بكالوريا رياضيات 2012

في فبراير 2012 هبت عاصفة ثلجية على شمال شرق الجزائر، فاستعملت الطائرات المروحية للجيش الوطني الشعبي لإيصال المساعدات للمتضاربين خاصة في المناطق الجبلية.



أولاً: تطير المروحية ثابت  $h$  من سطح الأرض بسرعة أفقية ثابتة قيمتها  $v_0 = 50 m/s$

يترك صندوق من مواد غذائية مركز عطالتها  $G$  يسقط في اللحظة  $t = 0$  انطلاقا من نقطة

$O$  مبدأ الاحداثيات وبالسرعة الابتدائية الافقية  $v_0$  ليترطم بسطح الأرض في النقطة  $M$  .


1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد:

أ- المعادلتين الزمنيتين  $x(t)$  و  $z(t)$  .

ب- معادلة المسار  $(x)$  .

جـ- احداثيات نقطة السقوط  $M$ .

د - الزمن اللازم لوصول الصندوق للأرض.



**ثانياً:** لكي لا تتلف المواد الغذائية عند الارتطام بسطح الارض، تم ربط الصندوق بمظلة تمكنه من النزول شاقوليما ببطء. تبقى المروحة على نفس الارتفاع  $h$  السابق في النقطة  $M$  ، ليترك الصندوق يسقط شاقوليما دون سرعة ابتدائية في اللحظة  $t = 0$  . يخضع الصندوق لقوة احتكاك الهواء نعبر عنها بالعلاقة  $\vec{f} = -100 \times \vec{v}$  حيث:  $\vec{v}$  يمثل شعاع سرعة الصندوق في اللحظة  $t$  مع اهمال دافعة ارخميدس خلال السقوط.

- أ- جد السرعة الحدية .

1- جد المعادلة التفاضلية التي تتحققها سرعة مركز عطالة الصندوق .

2- يمثل الشكل تطور سرعة مركز عطالة الصندوق بدلالة الزمن  $t$  .

بـ- حدد قيمتي السرعة والتسارع في اللحظتين :  $t = 0$  و  $t = 10s$


$$\text{يعطى: } m = 150\text{kg}, h = 405\text{m}, g = 9.8\text{m} \times \text{s}^{-2}$$

الترميم 4: بكاروريا علوم تحريرية 2016

$$v_0 = 10 \text{ m/s} , \quad g = 10 \text{ m/s}^2$$

نعتبرها  $t = 0$  من النقطة  $B$  في اتجاه المرمى بسرعة ابتدائية  $v_0$  واقعة على المستوى الشاقولي المتعامد مع مستوى المرمى ويصنف حاملها زاوية  $\alpha = 30^\circ$  مع الأفق. تقع النقطة  $B$  على الارتفاع  $h_B = 2m$  من سطح الأرض كما هو موضح بالشكل المقابل.





- 1- بإهمال أبعاد الكرة وتأثير الهواء عليها، وبنطبيق القانون الثاني لنيوتون على الكرة في المعلم السطحي الأرضي ( $Ox, Oy$ ) أوجد ما يلي:

  - . أ- المعادلتين الزمنيتين  $x(t)$  و  $y(t)$
  - . ب- معادلة المسار  $y = f(x)$

جـ- قيمة سرعة مركز عاطلة الكرة عند الذروة.

2- يبعد خط التهديف عن اللاعب بالمسافة  $d = 10m$  وارتفاع المرمى  $L = 2,44m$


أ- أكتب الشرط الذي يتحقق كل من  $x$  و  $y$  لكي سُحل الهدف معاشرة اثر هذه الرممة الرأسية؟

**بـ:** هل سخا، اللاعب المدفوع بهذه الراستة؟ بـ، هو ايك.

العنوان: ٥- بكاره، ١٤٠٣٢ تحرير: 2010

$$\text{نوع خذ } q = 10m \times s^{-2} , \text{ مقاومة الهواء و دافعه اه خميس ، معلماتان .}$$

لتنفيذ مخالفة خلال مباراة كرة القدم ، وضع اللاعب الكرة في النقطة  $O$  مكان وقوع الخطأ على بعد  $d = 25m$  من خط المرمى ، حيث ارتفاع العارضة الافقية  $h = AB = 2.44m$  . يقذف اللاعب الكرة بسرعة ابتدائية  $v_0$  يصنع حاملها مع الافق زاوية  $\alpha = 30^\circ$  .



1- ادرس طبيعة حركة الكرة في المعلم  $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy})$ .

- بأخذ مبدأ الازمنة لحظة القذف استنتج معادلة المسار.



2- كم يجب أن تكون  $v_0$  حتى يسجل الهدف مماسياً للعارضة الافقية (النقطة A) ؟ - ما هي المدة الزمنية المستغرقة؟ وما هي قيمة سرعتها عندئذ (النقطة A) ؟

3- كم يجب أن تكون  $v'$  حتى يسجل الهدف مماساً لخط المرمى (النقطة B) ؟

**التمرين 6: بكالوريا رياضيات 2015:**

ملعب التنس عبارة عن مستطيل طوله  $23.8\text{ m}$  وعرضه  $8.23\text{ m}$ . وضعت في منتصفه شبكة ارتفاعها  $0.92\text{ m}$ . عندما يرسل اللاعب الكرة يجب أن تسقط في منطقة محصورة بين الشبكة وخط يوجد على مسافة  $6.4\text{ m}$  من الشبكة كما هو موضح بالشكل. في دورة رولان قاروس الدولية يريد اللاعب ندال اسقاط الكرة في النقطة B حيث  $OB = L = 18.7\text{ m}$  حيث  $O$  هي نقطة الصفر. يرسل اللاعب الكرة نحو الأعلى ثم يضربها بمضربه من نقطة D توجد على ارتفاع  $h = 2.2\text{ m}$  من النقطة O . تتطاير الكرة من النقطة D بسرعة أفقية  $v_0 = 126\text{ km/h}$  كما هو موضح بالشكل التالي.

نهمل تأثير الهواء ونأخذ  $g = 9.8\text{ m/s}^2$  . نعتبر أن الحركة تتم في معلم سطحي أرضي يعتبر غاليليا.



1- مثل القوى المؤثرة على الكرة خلال حركتها بين D و B .

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتون أوجد المعادلتين الزمنيتين للحركة  $x(t)$  و  $y(t)$  .


3- استنتاج معادلة المسار.

4- هل تمر الكرة فوق الشبكة؟ علما ان  $OF = 12.2\text{ m}$  .

5- هل نجح ندال في الارسال؟

**التمرين 7: بكالوريا رياضيات 2009**

قام لاعب كرة السلة بتسديد الكرة نحو السلة من نقطة A منطبقة على مركز الكرة الموجودة على ارتفاع  $h_0 = 2.10\text{ m}$  من سطح الأرض بسرعة ابتدائية  $v_0 = 8\text{ m/s}$  يصنع حاملها زاوية  $37^\circ$  مع الأفق. ليمر مركز الكرة G بمركز السلة C الذي احداثياته  $(x_c = 4.5\text{ m}, z_c = 4.5\text{ m})$  في المعلم الأرضي  $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy})$  الذي تعتبره غاليليا.



1- ادرس حركة مركز عطالة الكرة في المعلم  $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy})$  معنيرا مبدأ الازمنة لحظة تسديد الكرة واهمال تأثير الهواء.

2- احسب  $z_c$  .



3- يعبر مركز عطالة الكرة مركز السلة بسرعة  $v_c$  التي يصنع حاملها مع الأفق زاوية  $\beta$  .  
استنتاج قيمتي  $v_c$  و  $\beta$  .

**التمرين 8: بكالوريا رياضيات 2014:**

أثناء دراسة تأثير القوى الخارجية على حركة جسم، كلف الاستاذ تلميذين بمناقشة الحركة الناتجة عن رمي جلة، فأجاب الاول أن حركة الجلة لا تتأثر الا بتقليلها، بينما اجاب الثاني أن حركتها تتعلق بداعفة ارخميدس.

من أجل التصديق على الجواب الصحيح، اعتمد التلميذان على دراسة الرمية التي حق بها رياضي رقمياً قياسياً عالمياً مداها  $21.69\text{ m}$  .

عند محاولتهما محاكات هذه الرمية بواسطة برنامج خاص، تم قذف الجلة التي تعتبرها جسما نقطيا من ارتفاع  $h = 2.62 \text{ m}$  بسرعة ابتدائية  $v_0 = 13.7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  يصنع شعاعها مع الأفق زاوية  $\alpha = 43^\circ$  فتحصلا على رسم لمسار مركز عطالة الجلة كما في الشكل - 9



و المنحنيين  $v_x(t)$  و  $v_y(t)$  كما في الشكل - 10 .

#### i. دراسة نتائج المحاكات:

- ما هي طبيعة حركة مركز عطالة الجلة على المحور  $ox$  ؟ ببر اجابتك.
- عين القيمة  $v_{0y}$  للمركبة الشاقولية لشعاع السرعة الابتدائية انطلاقا من الشكل - 10 ثم عين قيمة  $v_0$  للسرعة الابتدائية للقذيفة، وهل تتوافق مع المعطيات السابقة :  $v_0 = 13.7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  و  $\alpha = 43^\circ$  .
- عين خصائص شعاع السرعة  $\vec{v}$  عند الذروة S .


#### ii. دراسة التحليلية لحركة مركز عطالة الجلة:

المعطيات : الجلة عبارة على كرة حجمها  $V$  وكتلتها الحجمية  $\rho = 7.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  . الكتلة الحجمية للهواء :  $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$  .

- بين ان دافعة ارخميدس مهملا أمام نقل الجلة . أي التلميذين على صواب؟
- بتطبيق القانون الثاني لنيوتون جد عبارة تسارع مركز عطالة الجلة . نهمل مقاومة الهواء .
- جد معادلة المسار لمركز عطالة الجلة .

#### التمرين 9 :

نفذ عند اللحظة  $t = 0$  كررة كتلتها  $m$  ، بسرعة ابتدائية  $\vec{v}_0$  من نقطة  $O$  كما هو مبين على الشكل المقابل . نعتبر أن حركة الجسم تتم في المستوى  $(j, i)$  وتدرس بالنسبة للمرجع الأرضي الذي تعتبر مرجعا غاليليا . نهمل كل من مقاومة الهواء و دافعة أرخميدس .



1- مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم الصلب .

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتون بين طبيعة الحركة .

3- أوجد المعادلات الزمنية لكل من السرعة والموقع .

4- أوجد من البيان :


- القيمة  $v_0$  لشعاع السرعة  $\vec{v}_0$  .

- قيمة المركبة  $v_{0x}$  لشعاع السرعة  $\vec{v}_0$  .

5- استنتج قيمة كل من الزاوية  $\alpha$  التي قذف بها الجسم و قيمة  $v_{0y}$  .

6- مثل كل من  $v_x(t)$  و  $v_y(t)$  في المجال الزمني  $0 \leq t \leq 1.88$  .

7- استنتاج من المنحنيين كل من المسافة الأفقية  $OM$  و الذروة  $h$



## التمرين 10 :

يُقذف اللاعب كرة التنس  $m = 58g$  لإلتحاق الإرسال شاقوليا نحو الأعلى لتصطدم إلى ارتفاع  $Z_0$  فيضربها بمضربيه فنكتسب سرعة  $v_0 = 28 m/s$  يكون منحاجها أفقى. على الكرة اجتياز شباك موضوع على بعد  $12m$  من اللاعب علوه  $Z_0 = 0.9m$ . ندرس حركة الكرة في المعلم  $(ox; oz)$  الذي نعتبره عطاليًا. تأخذ  $g = 9.8m/s^2$ .

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتون أوجد:

أ/ المعادلين التفاضليتين للحركة و المعادلين الزمنيين للحركة.

ب/ استنتج معادلة المسار  $z = f(x)$ .

ج/ ما هي قيمة  $Z_0$  حتى تمر الكرة على ارتفاع  $10cm$  من الشبكة.


د/ إذا كان طول الملعب  $24m$ , هل تصطدم الكرة بالأرض قبل خروجها من الملعب؟ بره إجابتك.

هـ/ احسب سرعة الكرة  $v$  لحظة اصطدامها بالأرض.

2- نفرض أن الكرة تطلق من جديد بعد اصطدامها بالأرض بنفس السرعة السابقة  $v$  وبزاوية عن الأفق  $\beta = 15^\circ$  في اتجاه اللاعب الثاني الموجود في خط نهاية الملعب أي على بعد  $24m$  من اللاعب الأول ، باعتبار نقطة اصطدام الأرض هي مبدأ الفواصل.

أ/ اكتب معادلة المسار الجديد دون ثبات.


بـ/ ما هي قيمة الارتفاع  $h$  لكرة عند وصولها إلى اللاعب الثاني؟



## تمرين 11: بكالوريا علوم تجريبية 2016

نهمل تأثير الهواء ونأخذ  $g = 9.8m/s^2$ .

شاحنة تسير على طريق مستقيم أفقى ، في لحظة تعتبرها مبدأ لقياس الأرمنة  $t=0$  تندفع العجلة الخلفية للشاحنة نحو الوراء من نقطة  $O$  من سطح الأرض حجراً نعتبره نقطياً بسرعة ابتدائية  $v_0 = 12m/s$  يصفع حاملها زاوية  $\alpha = 37^\circ$  مع الأفق فيرتطم بالنقطة  $M$  من الزجاج الأمامي لسيارة تسير خلف الشاحنة وفي نفس جهة حركتها بسرعة ثابتة قدرها  $90km/h$  . في اللحظة  $t=0$  كانت المسافة الأفقية بين النقطة  $O$  والنقطة  $M$  :  $d = 44m$  : انظر الشكل.



1- ادرس حركة الحجر في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ثم استخرج العبارتين الحرفيتين للمعادلين الزمنيين للحركة  $(t)$  و  $(x)$  و  $(z)$  .

2- اكتب معادلة مسار الحجر  $z = f(x)$  .

3- اكتب المعادلة الزمنية  $x_M(t)$  لحركة النقطة  $M$  في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  .

4- احسب قيمة  $t_M$  لحظة ارتطام الحجر بالزجاج الأمامي للسيارة واستنتج الارتفاع  $h$  للنقطة  $M$  عن سطح الأرض.

5- باستعمال معادلة انفجار الطاقة احسب سرعة ارتطام الحجر بزجاج السيارة .