


- تقرأ مركبنا شعاع بالإزاحتين المترادفين التي تسمى بـ **الإزاحة** من مبدأ الشعاع إلى نهايته.
- الإزاحة الأولى تكون بالتوازي مع محور الفواصل.
- الإزاحة الثانية تكون بالتوازي مع محور التراتيب.
- تقرأ المركبة الأولى بالإزاحة الأولى (موجب عندما تلقى نحو اليمين و سالب عندما تلقى نحو اليسار).
- تقرأ المركبة الثانية بالإزاحة الثانية (موجب عندما تلقى نحو الأعلى و سالب عندما تلقى نحو الأسفل).


نقطتان من مستوى مزود بمعلم  $(x_B - x_A)$   $(y_B - y_A)$  مركبا الشعاع  $\vec{A}$  هما :

في معلم متعدد و متوازي إذا كانت:

$B(x_B; y_B)$  و  $A(x_A; y_A)$  فإن:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$





لترجمة مشكلة أي حلها رياضيا نتبع المراحل التالية:


1) اختيار المجهول

2) التعبير عن الوضعية بمعادلة مناسبة

3) حل هذه المعادلة

4) التحقق من الحل

5) الإجابة عن السؤال المطروح في المشكلة



من أجل العددان  $a$  و  $b$  المعادلة:  $ax = b$

1) **تقبل الحل:**  $x = \frac{b}{a}$  إذا كان:  $a \neq 0$  و  $b \neq 0$

2) **تقبل الحل:**  $x = 0$  إذا كان:  $0 \neq a$  و  $0 = b$

3) **ليس لها حل:** إذا كان:  $0 = a$  و  $0 \neq b$

4) **تقبل عدد غير منه من الحلول:** إذا كان:  $0 = a$  و  $0 = b$

حل معادلة تشمل كسورة تبع المراحل الآتية

1) نوحد مقامات كل حدود المعادلة

2) نتخلص من هذا المقام المشترك، بضرب طرفي المعادلة في نفس هذا المقام

3) نكمل الحل حسب المثال السابق

هام جدا: عند التخلص من المقام ننتبه حيدا إلى الإشارات السالبة

لحل متراجحة:

- نتبع نفس خوارزمية حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، مع مراعاة الخواص المتعلقة بضرب طرفي المتباينة في عدد سالب.
- نستنتج بجملة رياضية أو بتمثيل بياني مجموعة الحل على مستقيم مدرج (نلون الجزء الذي يمثل مجموعة الحلول ونشطب الجزء الآخر).

كل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول  $x$  تؤول إلى متراجحة من الشكل

$$ax \geq b \text{ أو } ax \leq b \text{ أو } ax > b \text{ أو } ax < b$$

حل متراجحة هو إيجاد كل القيم الممكنة للمجهول حتى تكون المتباينة صحيحة هذه القيم هي حلول المتراجحة

حل المتراجحة

المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

المتراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

$$\begin{aligned} c > 0 \text{ و } a \leq b & \Rightarrow x \leq \frac{b}{a} \\ ca \leq cb & \\ c < 0, a \leq b & \Rightarrow x \geq \frac{b}{a} \\ ca \geq b & \end{aligned}$$

خاصية:

$$\begin{aligned} \text{نعتبر المتراجحة } ax \geq b & \\ \text{إذا كان } a > 0 \text{ فإن } x \geq \frac{b}{a} & \\ \text{إذا كان } a < 0 \text{ فإن } x \leq \frac{b}{a} & \end{aligned}$$

## تعريف:

الشعاعان المتساويان هما شعاعان لهما:  
 - نفس المنحنى، نفس الإتجاه، و نفس الطول (أو المعيار)


## ملاحظات:

$\overrightarrow{AB}$  يختلف عن  $\overrightarrow{BA}$ ، الكتابات:  $[\overrightarrow{AB}]$ ،  $[\overrightarrow{AB}]$ ،  $[\overrightarrow{AB}]$ ،  $[\overrightarrow{AB}]$  ليس لها نفس المعنى  
 الشعاع المعدوم هو شعاع تتطابق نهايته على بدايته من  $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}$  حيث  $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}$  أو  $\overrightarrow{CC} = \overrightarrow{BB}$  أو  $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AA}$  و نكتب:  $\overrightarrow{AA} = 0$

## مميزات شعاع:

كل شعاع ثالث عناصر أو مميزات هي:  
 1) المنحنى  
 2) الاتجاه  
 3) الطول و يسمى معيار الشعاع  
 مثال:

منحنى  $\vec{M}$  هو منحنى المستقيم  
 اتجاه  $\vec{M}$  من  $A$  نحو  $B$   
 طول الشعاع  $\vec{AB}$  و  $\vec{M}$



## الشعاع


## الأشعة و الإنحراف

## الشعاعان المتساويان

## خواص:

أربع نقط من المستوى  
 (1) يعني أن الرباعي متوازي الأضلاع  
 (2) لهما نفس المنتصف يعني أن  $[AC] \parallel [BD]$  و  $[AC] = [BD]$

$A$  و  $B$  نقطتان في المستوى  
 - الثانية النقطية  $(A, B)$  تحدد شعاعا يرمز له بالرمز  $\vec{AB}$   
 أو بحرف واحد مثلا:  $\vec{M}$   
 - الإنحراف الذي يحول  $A$  إلى  $B$  هو: الإنحراف الذي شعاعه  
 $\vec{AB}$   
 - كل شعاع بداية مثل  $A$  و نهاية مثل  $B$   
 $\vec{AB} = \vec{M}$  مثلا و نكتب:  $\vec{AB} = \vec{M}$




إذا كان  $ABCD$  متوازي أضلاع  
 $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$  فإن:

## مجموع شعاعين

## علاقة شال

## معاكس شعاع

## تمثيل مجموع شعاعين



معاكس الشعاع  $\vec{AB}$  هو الشعاع  
 $\vec{BA}$  و يكتب  $\vec{AB} = -\vec{BA}$   
 إذن:  $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$

ثلاث نقط من المستوى فإن:  
 -  $C$  و  $B$  و  $A$  إذا كانت:  
 $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$