

سلسلة "سؤال و جواب" المقطع التعليمي الأول "التغذية عند الإنسان"

المادة: علوم الطبيعة و الحياة

المستوى: الرابع متوسط

من تقديم الأستاذة:
حمانى ليلى



مع تمنياتي لكم بال توفيق و النجاح إن شاء الله

1- مراحل الهضم

س1: مما يتكون الجهاز الهضمي؟

ج1: يتكون الجهاز الهضمي من :

- أ- الأتبوب الهضمي: و الذي يتكون من الفم، البلعوم، المريء، المعدة، المعي الدقيق، المعي الغليظ و فتحة الشرج.
- ب- الغدد الملحقة: و هي تتمثل في: الغدد اللعابية، الغدد المعدية، الغدد المعاوية، إضافة إلى البنكرياس و الكبد.

س2: ما دور الغدد الملحقة (الغدد الهضمية) في الهضم؟

ج 2: يتمثل دور الغدد الهضمية الملحقة في إفراز عصارات هاضمة، و العصارات يمكن أن تحتوي داخلها على أنزيمات هاضمة:

الغدد	العصارات	اللعاب	الغدد المعدية	العصارة المعاوية	العصارة البنكرياسية (الصفراء)	الكب
الأنزيمات (الأميلاز اللعابي)	يحتوي على أنزيم اللعابين (الأميلاز، البروتياز الليبياز)	تحتوي على أنزيم البروتياز	تحتوي على عدة أنزيمات (المالتاز، البروتياز الليبياز)	تحتوي على عدة أنزيمات	العصارة المعدية	العصارة المعاوية

س3: أشرح آلية الهضم على مستوى الفم.

ج 3: يحدث على مستوى الفم نوعان من الهضم:

- أ- الهضم الميكانيكي (الآلي): يتم قطع و سحق الأغذية لقطع صغيرة بفضل الأسنان و يساعد اللعاب على تبليلها و اللسان على قلبها.
- ب- الهضم الكيميائي: يتم تحول النشاء (سكر معقد) إلى المالتوز (سكر بسيط) بفضل أنزيم الأميلاز اللعابي .

س4: أشرح آلية الهضم على مستوى المعدة.

ج 2: يحدث على مستوى المعدة نوعان من الهضم:

- أ- الهضم الميكانيكي (الآلي): يتم سحق الأغذية بفضل تقلص عضلات الجدار الداخلي للمعدة .
- ب- الهضم الكيميائي: يتم تحويل البروتينات (جزيئات معقدة) إلى متعدد البيبتيد، و ذلك بفضل أنزيم البروتياز 1 (البيبيسين).

س5: أشرح آلية الهضم على مستوى المعي الدقيق.

ج 5: يحدث على مستوى المعي الدقيق نوعان من الهضم:

- أ- الهضم الميكانيكي (الآلي): يتم سحق الأغذية بفضل تقلص العضلات الداخلية للمعي الدقيق و حرکته الدودية.

ب- الهضم الكيميائي: يتم تحويل و تبسيط عدة أنواع من الأغذية، بحيث:

- * يتحول النشاء المتبقى (الذي لم يتحول على مستوى الفم) إلى مالتوز بفضل أنزيم الأميلاز البنكرياسي
- * تحول المالتوز إلى غلوكوز بفضل أنزيم المالتاز المتواجد في العصارة المعاوية
- * تحول البروتينات إلى بيبيتين بفضل أنزيم البيبيسين الذي المتواجد في العصارة البنكرياسية
- * تحول البيبيتين إلى أحماض أمينية بفضل أنزيم البروتياز 2 (التربيسين) المتواجد في العصارة المعاوية
- * تحول الليبييدات (الدهن) إلى أحماض دسمة + غليسيرول بفضل أنزيم الليبياز المتواجد في كل من العصارات البنكرياسية و المعاوية.

س6: الصفراء عصارة لا تحتوى على الأنزيمات ، فيما تكمن أهميتها إن؟

ج 6: تكمن أهمية الصفراء في * تحويل الدهن إلى مستحلب من أجل تسهيل عمل أنزيم الليبياز * التخلص من سموم الكبد و بعض الفضلات ، * تعديل PH المعي الدقيق.

س7: عرف الأنزيمات!

ج 7: عبارة عن جزيئة كيميائية ذات طبيعة بروتينية، منتجة من طرف العضوية، تعمل على تسريع التفاعلات و تحويل الجزيئات من حالة معقدة إلى حالة أبسط.

س 8: حل مطبيات هذه التجارب من أجل إستخلاص خواص الأنزيمات.

التجارب	خطوات التجربة	الملاحظة	التفسير	إستنتاج خواص الأنزيمات
التجربة 1	حضر أنبوب اختبار ، نضع في كل واحد منها : مطبوخ النشاء + كمية من اللعاب. - نضع الأنابيب الإختباري (أ) في حمام مائي 37°C - نضع الأنابيب (ب) في حمام مائي درجة حرارته 0°C بعدها نضيف إلى الأنابيبين (أ و ب) كاشف السكريات البسيطة (محلول فهلينك + تسخين)	- نلاحظ أن الأنابيب الأجربي ظهر اللون الأحمر (أ) ظهر اللون الأحمر - الأنابيب (ب) بقي اللون نفسه (الأزرق) و لم يظهر اللون الأحمر الأجربي	- الأنابيب (أ) ظهر اللون الأحمر على تحول النشاء من سكر معقد إلى مالتوز (سكر بسيط) - الأنابيب (ب): عدم ظهر اللون الأحمر الأجربي دليل على عدم تحول النشاء إلى مالتوز	خاصية درجة الحرارة : أي أن الأنزيمات تعمل تحت تأثير درجة حرارة الجسم (37°C)
التجربة 2	حضر أنبوب اختبار ، نضع في : الأنابيب (أ) : مطبوخ النشاء + لعاب + 37°C + وسط معتدل + محلول فهلينك + تسخين الأنابيب (ب): مطبوخ النشاء+ حمض كلور الماء + 100°C + وسط معتدل + محلول فهلينك + تسخين	- نلاحظ الأنابيب (أ) ظهور اللون الأحمر الأجربي بعد مرور 10 دقائق - الأنابيب (ب): ظهر اللون الأحمر الأجربي بعد ساعة من الزمن	- ظهر اللون الأحمر الأجربي حول النشاء إلى مالتوز في زمن قصير قدره 10 دقائق - الأنابيب (ب): حمض كلور الماء حول النشاء إلى مالتوز في زمن طويل قدره ساعة واحدة	خاصية تسريع التفاعلات: فالأنزيمات تقصر الوقت وتسرع من التفاعلات الكيميائية
التجربة 3	حضر أنبوب اختبار نضع: الأنابيب (أ): مطبوخ النشاء + لعاب+ وسط حامضي + 37°C + محلول فهلينك + تسخين الأنابيب (ب): زلال البيض + أنزيم البيبيسين + وسط حامضي + 37°C + حمض الأزوت (كاشف البروتينات)	- الأنابيب (أ): نلاحظ عدم ظهر اللون الأحمر المالتوز (النشاء لم يتحول إلى مالتوز) - عدم ظهر اللون الأصفر دليل على اختفاء البروتينات التي حولها أنزيم البيبيسين إلى متعدد البيبيتيد	- الأنابيب (أ): عدم ظهر اللون الأحمر الأجربي دليل على عدم ظهر المالتوز (النشاء لم يتحول إلى مالتوز)	خاصية PH الوسط ، فكل أنزيم PH خاص به : أنزيمات الفم تعمل في وسط ذو PH معتدل ، أنزيمات المعدة تعمل في وسط حامضي ، أنزيمات المعوي الدقيق تعمل في وسط قاعدي
التجربة 4	حضر أنبوب اختبار ، نضع: الأنابيب (أ): مطبوخ النشاء + أنزيم الأميلاز اللعابي + وسط معتدل + 37°C + محلول فهلينك + تسخين الأنابيب (ب): مطبوخ النشاء + أنزيم البيبيسين + وسط معتدل + 37°C + محلول فهلينك + تسخين	- الأنابيب (أ): نلاحظ ظهر اللون الأحمر الأجربي إلى مالتوز بفضل أنزيم الأميلاز اللعابي - الأنابيب (ب): نلاحظ عدم ظهر اللون الأحمر الأجربي	- الأنابيب (أ): ظهر اللون الأحمر الأجربي على تحول النشاء إلى مالتوز	خاصية النوعية (كل أنزيم متخصص في تحويل نوع واحد فقط دون غيره) مثال: أنزيم الأميلاز يحول فقط النشاء إلى مالتوز أنزيم البيبيسين يحول فقط البروتين إلى متعدد البيبيتيد

س 9: ماذا تعرف عن العجف؟

ج 9: العجف و يسمى كذلك بـ الإثني عشر هو القسم الأول من المعي الدقيق، فيه تصب كل من العصارة البنكرياسية (التي تفرزها البنكرياس) و الصفراء (التي يفرزها الكبد) .

س 10: كيف تسمى العصيدة المتواجدة في المعدة و تلك المتواجدة في المعي الدقيق؟

ج 10: - العصيدة المتواجدة في المعدة تسمى الكيموس المعدى، أما محتوى المعي الدقيق فيدعى بالكيلوس المعاوى

س 11: على ماذا يحتوى الكيلوس المعاوى؟

ج 11: يحتوى الكيلوس المعاوى على المغذيات (الغلوکوز، الأحماض الأمينية، الأحماض الدسمة، الغليسيرول، الماء، الأملاح المعدنية و الفيتامينات) ، إضافة إلى السيليلوز (الألياف)، العصارات و الأنزيمات الهاضمة.

س 12: السيليلوز، الماء الأملاح المعدنية لم يطرأ عليها أي تحول كيميائي. إشرح السبب.

ج 12: بالنسبة للسيليلوز فهو جزيئة نباتية ضخمة، لكنها لا تتحول بسبب عدم وجود أنزيم متخصص في تحويلها، أما الماء، الأملاح المعدنية و الفيتامينات فهي مغذيات بسيطة أصلا و لا تحتاج إلى تحويل و تبسيط.

س 13: قدم تعريفاً للهضم.

ج 12: عبارة عن وظيفة بيولوجية يضمنها الجهاز الهضمي، يتم خلالها تحويل و تبسيط الأغذية الغير القابلة للذوبان (الأغذية المعقدة) إلى مغذيات ذائبة، و يتم ذلك بفضل الأداء الميكانيكي (الألي)، و الكيميائي (بفضل الأنزيمات).


2- الإمتصاص المعاوي

س 1: هل المغذيات المتواجدة في المعي الدقيق تواصل مسارها إلى المعي الغليظ؟ حدد إذن محتوى المعي الغليظ.

ج 1: المغذيات لا تواصل مسارها إلى المعي الغليظ، بل تبقى في المعي الدقيق، ثم تخفي بعد مدة (يتم إمتصاصها).
نجد في المعي الغليظ فضلات و المواد الغير قابلة للهضم (السيليلوز).

س 2: ما مصير المغذيات المتواجدة في المعي الدقيق؟

ج 2: يتم إمتصاص المغذيات بظاهرة الإمتصاص المعاوي.



س 3: ما هي البنية التي تسمح بحدوث الإمتصاص المعاوي؟

ج 3: تظهر البنية الداخلية للمعي الدقيق أنه يتكون من انتشاعات، كل انتشاع يتكون من ملايين من الزغابات المعاوية، كل زغابة معاوية تتكون من ميكروزغابات معاوية. وبالتالي نستنتج أن الزغابات المعاوية هي البنية التي تسمح بحدوث عملية الإمتصاص المعاوي للمغذيات.

س 4: مما تتكون الزغابة المعاوية؟

ج 4: تتكون الزغابة المعاوية من جدار رقيق من الخلايا، يتوسطها وعاء لمفاوي وأوعية دموية.

س 5: ضع رسمًا تخطيطيًّا للزغابة المعاوية عليه كافة البيانات.

ج 5: الرسم التخطيطي :

س 6: هل جميع المغذيات الممتصة تسلك نفس الطريق؟ اشرح.

ج 6: لا تسلك المغذيات نفس الطريق، إنما تنفصل وتسلك طريقين:

أ- **الطريق الدموي:** تسلكه كل من "الغلوکوز، الأحماض الأمينية،

الفيتامينات، الماء والأملاح المعدنية"، لتدخل في الدورة الدموية.

ب- **الطريق المفاوي:** تسلكه كل من "الأحماض الدسمة، الغليسيرول"، أين تتحول من جديد إلى ليبيدات، وتلتحق بعد ذلك الأوعية المفاوية بالدمية.

س 7: حدد بالتفصيل مقر حدوث الإمتصاص المعاوي للمغذيات.

ج 7: تعتبر المعي الدقيق المقر الرئيسي لحدث الإمتصاص المعاوي، وبالضبط على مستوى الزغابات المعاوية.

س 8: بين أن جدار المعي الدقيق يشكل سطح تبادل جيد بين محتوى المعي (المغذيات) و الوسط الداخلي للعضوية (الدم + المف + السائل البيني)

س 8: حدد خصائص المعي الدقيق التي تجعله مقراً جيداً للإمتصاص المعاوي = س 8: لماذا يعتبر المعي الدقيق سطح إمتصاص فعال؟

ج 8: يتميز المعي الدقيق ب :

- تعتبر المعي الدقيق سطح تماس واسع بين الوسط الخارجي (لمع المعي) و الوسط الداخلي : الإنثاعات، الزغابات و الميكروزغابات ترفع من المساحة الداخلية للمعي فتزد بذلك مساحة سطح الإمتصاص.

- تروية لمفاوية و دموية جد هامة (الزغابات المعاوية محاطة بأوعية دموية و لمفاوية)

- سمك جدار الزغابة المعاوية ضعيف، مما يسمح بالدخول السهل للمغذيات.

- التجدد المستمر للوسطين : * تجدد محتوى الوسط الخارجي (لمع المعي الذي يحتوي على المغذيات)، بفضل الهضم المستمر.

* تجدد محتوى الوسط الداخلي (الدم و المف و السائل البيني) بفضل الدورة الدموية.

3- أين دور الدم في النقل (نقل المغذيات والغازات التنفسية)

س1: كيف يمكن الكشف عن مكونات الدم؟


ج1: يتم التعرف على مكونات الدم بطريقتين هما: أ- فصل مكونات الدم بالترسيب: بعد نزع الدم و وضعه في أنبوب اختباري نضيف إليه مادة لمنع التخثر (أوكزالات الأمونيوم)، و يوضع في جهاز الطرد المركزي فصد فصل مكوناته بالترسيب (تثليل)

بـ- الملاحظة المجهرية لسحابة دموية: وضع قطرة دم طازج بين صفحة و ساترة زجاجية، بعدما تم تلوينها بالأيوzin و أزرق الميثيلين (الوثيقتين 2 و 3 صفحة 24 من الكتاب المدرسي) و يتم وضعها تحت المجهر.


س2: لخص في جدول مكونات الدم و بين دور كل منها.

مكونات الدم	دورها
الكريات الدموية الحمراء	- لها دور في نقل 97% غاز O_2 إنطلاقاً من الأنساخ الرئوية وصولاً إلى خلايا الجسم. لها دور في نقل غاز CO_2 إنطلاقاً من خلايا الجسم وصولاً إلى الأنساخ الرئوية، حين يطرح خارج الجسم عبر الزفير.
البلازمما (المصورة)	- له دور في نقل المغذيات من الأمعاء الدقيقة إلى خلايا الجسم - له دور في نقل الفضلات من خلايا الجسم إلى أجهزة الإطراح (مثل الكليتين) - له دور في نقل CO_2 إنطلاقاً من خلايا الجسم وصولاً إلى الأنساخ الرئوية، حين يطرح خارج الجسم عبر الزفير. - له دور في نقل 3% غاز O_2 في شكل منحل في البلازمما، إنطلاقاً من الأنساخ الرئوية وصولاً إلى خلايا الجسم.
الكريات الدموية البيضاء	لها دور في الدفاع عن العضوية ضد الأجسام الغريبة
الصفائح الدموية	لها دور في تخثر الدم (تساهم في تخثر الدم) فتوقف النزيف الدموي فور حدوثه

س3: ضع رسم تخطيطي لمكونات الدم بعد ترسيبه ، و رسم تخطيطي آخر لمكونات الدم كما تبدو تحت المجهر.



رسم تخطيطي لفصل مكونات الدم بالترسيب



رسم تخطيطي لمكونات الدم تحت المجهر

س4: يعرف الدم بكونه نسيج حي، ببرر هذا التعريف.

ج4: لأن الدم نسيج منظم مركب من سائل لزج يدعى البلازمما، الذي تسبح فيه 03 أنماط من الخلايا: الكريات الدموية الحمراء، الكريات الدموية البيضاء و الصفائح الدموية.

س5: مما تتكون الكريات الدموية الحمراء.

ج5: تتكون الكريات الدموية الحمراء من: البروتينات + الهيموغلوبين (خضاب الدم)

س6: مما يتكون الهيموغلوبين (خضاب الدم)؟

ج6: يتكون الهيموغلوبين من بروتينات + حديد

س7: ما دور الحديد المتواجد في الهيموغلوبين؟

ج7: للحديد قدرة الإرتباط بغاز O_2 : - عندما يرتبط الهيموغلوبين بغاز الـ O_2 ، يصبح لون الدم أحمر قاتم (فاتح)

- عندما يتخلّى الهيموغلوبين عن غاز الـ O_2 ، يصبح لون الدم أحمر قاتم (داكن)

س8: ما هو الغاز المسئول عن تغير لون الدم؟ مع الشرح.

ج8: عاز O_2 هو المسئول عن تغير لون الدم، بحيث: إذا كان الدم محلاً بغاز O_2 فيكون لونه أحمر قان، أما إن كان فقيراً منه فيصبح لونه أحر قاتم.

س9: ما دور الدم في النقل؟

ج9: يقوم الدم بنقل كل من المغذيات، الفضلات و الغازات التنفسية، بحيث:

- 97% من غاز O_2 يتم نقله بفضل هيموغلوبين الكريات الدموية الحمراء، أما 3% المتبقية فتكتفى باللازم ما بنقله في شكل منحل داخلها.

- كمية من غاز CO_2 تكتفى بنقله الهيموغلوبين، و كمية أخرى منه يتم نقله في سيتوبلازم الكريات الدموية الحمراء و اللازم.

- أما بالنسبة للمغذيات و الفضلات، فإن اللازم هو من يكتفى بنقلهما.

س10: صف سلوك الكبد تجاه الغلوكوز.

س10: إشرح الدور الذي يلعبه الكبد في الإمداد المستمر للأعضاء بالغلوكوز.

ج10: يقوم الكبد بتعديل نسبة السكر في الدم و جعلها تتراوح بين (0.9 إلى 1.2) غ / ل ، بحيث:

- عند إزدياد كمية الغلوكوز عقب وجبة غذائية: يعمل الكبد على تخزين الفائض منه في شكل غликوجين.

- عند نقص كمية الغلوكوز (في حالة الصيام مثلاً) : يقوم الكبد بإماهة (تفكيك) الغликوجين إلى

غلوكوز و يحرره في الدم.

س11: كيف تضمن العضوية الإمداد المستمر بالمغذيات؟

ج11: بفضل الأعضاء الإدخارية المتمثلة في : **الكبد** الذي ينظم نسبة السكر في الدم (أنظر ج 10).

النسبج الدهني: يتواجد في عدة أعضاء و هو عبارة عن خلايا دهنية متجمعة، تدخل فيها كميات كبيرة من الليبيدات (مصدر هذه الليبيدات يكون من الأحماض الدسمة و الغليسيرول و يكون كذلك من تحويل الغلوكوز الزائد في الدم إلى ليبيدات). و يتم هضم هذه الليبيدات إلى مغذيات لتطرح في الدم عند الحاجة (الصيام مثلاً).

س12: كيف يتم نقل المغذيات و ثاني الأكسجين إلى جميع الأعضاء؟

ج12: جهاز الدوران (دوران الدم بفضل الدورة الدموية الصغرى و الدورة الدموية الكبرى) هو الذي يضمن نقل المغذيات و ثاني الأكسجين إلى جميع الأعضاء.

س13: كيف يتم إمداد خلايا الجسم بالمغذيات و ثاني الأكسجين المنقولين من طرف الدم؟ و كذلك تخلصها من CO_2 و الفضلات؟ إشرح.

ج13: يتم التبادل (إمداد الخلايا بالمغذيات و ثاني الأكسجين و تخلصها من CO_2 و الفضلات) بفضل سوائل الجسم المتمثلة في الدم و السائل البيني .

الشرح: لا يكون الدم أبداً في تماس مباشر مع خلايا أعضائنا، إنما يحدث الإمداد على النحو التالي :

- يتشكل السائل البيني إنطلاقاً من ترشح بلازما الدم عبر جدران الشعيرات الدموية.

- يكون السائل البيني محملاً بالمغذيات و ثاني الأكسجين ، و أثناء حركته يقوم بإمداد خلايا الجسم بكل ما تحتاجه (مغذيات و O_2).

- في نفس الوقت تقوم خلايا الجسم بطرح فضلاتها و CO_2 إلى السائل البيني، فيخلصها منها.

- يدخل الفائض من السائل البيني داخل أووية لمفاوية فيتشكل بذلك اللمف، الذي يعود ليختلط بالدم من جديد

س14: ماذا نسمى كل من الدم، اللمف و السائل البيني؟

ج14: نسمى كل من الدم + اللمف + السائل البيني **بالوسط الداخلي** و الذي يكون في حركة مستمرة.

س15: ما العلاقة بين الدم و اللمف و السائل البيني؟

ج15: - السائل البيني يتشكل إنطلاقاً من الدم، بحيث تترشح (تنسلل و تخرج خارج الشعيرات الدموية) بلازما الدم عبر جدران الشعيرات الدموية، فتسرب بين خلايا الجسم مشكلة بذلك سائل بيني أو ما يسمى باللمف البيني.

- أما اللمف فهو يتشكل إنطلاقاً من السائل البيني، بحيث يتم دخول الفائض من السائل البيني داخل أووية لمفاوية، فيصبح إسمه لمف.

س16: ما دور السائل البيني (اللمف البيني)؟


ج16: يلعب السائل البيني دور وسيط بين الدم و خلايا الجسم، بحيث: يمدها بالمغذيات و ثاني الأكسجين المنقولان من طرف، و يخلصها من الفضلات و غاز O_2 .

4- إستعمال المغذيات

س1: قارن بين محتوى الدم الوارد (الذي يدخل) إلى العضلة و الدم الصادر (الذي يخرج) منها من حيث كل من الغلوكوز، O_2 , CO_2 .

ج1: * الدم الوارد إلى العضلة يحتوى على كميات كبيرة من الغلوكوز و O_2 ، أما CO_2 فكميته قليلة

* الدم الصادر منها فتقل كمية كل من الغلوكوز- O_2 ، أما CO_2 فترداد كميته .



س2: ماذا تستنتج من خلال هذه المقارنة؟

ج2: تستنتج أن العضلة تستعمل كل من الغلوكوز و O_2 ، و تطرح غاز CO_2 .

س3: ما هو مصدر الغلوكوز الذي تستعمله العضلة؟

ج3: مصدر الغلوكوز الذي تستعمله العضلة هو الغليوكجين المخزن فيها (العضلة تخزن الفائض من الغلوكوز على شكل غليوكجين)، لاستعماله عند الحاجة.

س4: إشرح العلاقة بين استهلاك ال O_2 ، الغلوكوز و إنتاج الطاقة؟

ج4: إن استعمال الغلوكوز في وجود O_2 يؤدي إلى إنتاج الطاقة.

س5: ما العلاقة بين استهلاك ال O_2 ، الغلوكوز، النشاط و الطاقة؟

ج5: كلما ازداد النشاط العضلي، تزداد الحاجة إنتاج الطاقة، وبالتالي تزداد الحاجة إلى إشتقاق ال O_2 و إستعمال الغلوكوز.

س6: كيف تتحصل عضويتنا على الطاقة التي تحتاجها ل القيام بوظائفها الحيوية؟


ج6: يتم إنتاج الطاقة بطريقتين هما:

- التنفس الخلوي: هو هدم كلٍ للمادة العضوية (مثل الغلوكوز) في وجود الأكسجين من أجل إنتاج طاقة كبيرة، ويرفق ذلك بطرح CO_2 و فضلات أخرى .
- ب - التخمر: هو هدم جزئي للمادة العضوية في غياب الأكسجين من أجل إنتاج طاقة ضئيلة، ويرفق ذلك بطرح CO_2 و كحول .

س7: ما هي المادة العضوية المستعملة لانتاج الطاقة؟

ج6: تعتبر الغلوكوسيدات و الليبيادات مواد عضوية طاقوية، دورها في الجسم هو إنتاج الطاقة.


س7: أكتب معادلة التنفس.



س8: قارن بين التخمر لدى الإنسان و التخمر لدى خميرة الخبز

- ج8: - التخمر لدى الإنسان: الفضلات الناتجة عبارة عن حمض اللبني، فيدعى بالتخمر اللبني
- التخمر لدى خميرة الخبز: الفضلات الناتجة عبارة عن كحول الإثانول، لذلك يدعى بالتخمر الإيثيلي

س9: أكتب معادلة التخمر الكحولي.



س10: قارن في جدول بين التنفس و التخمر.

ج10:

عملية التخمر	عملية التنفس	أو же المعاشرة
لا هوائي (غياب الأوكسجين)	هوائي (وجود الأوكسجين)	<u>الوسط</u>
هدم جزئي	هدم كلي	<u>هدم</u> <u>الجلوكوز</u>
قليلة	كبيرة	<u>طاقة</u> <u>الناتجة</u>
قليلة	كبيرة	<u>كمية غار</u> <u>الكريون</u> <u>المطروحة</u>
غاز الكريون و كحول إيثيلي	بخار الماء ، غاز الكريون	<u>البوتاج</u>

س11: ما هو دور البروتينات المتناولة (فيما تستعملها العضوية)؟

ج11: بعد تناولها، يتم هضمها و تحولها إلى أحماض أمينية، يعدها تمتّص، لتنقّل أخيراً عبر الدم إلى خلايا الجسم، فتفقوم العضوية بإعادة تركيبها إلى بروتينات جديدة تدخل في بناء الجسم ، فنقول أن دور الأحماض الأمينية هو النمو لدى الطفل و المراهق و البناء، الترميم و التجدد لدى البالغ.

س12: ما هو دور الماء، الأملام المعدنية و الفيتامينات في العضوية؟

ج12: بالنسبة للماء، يدخل في جميع وظائف الجسم، أما الأملام المعدنية و الفيتامينات فلها دور في الوساطة، الحماية و الوقاية من الأمراض، و الصيانة.

5- التوازن الغذائي

س1: مَا نَقْصِدُ بِالتَّوازِنِ الْغَذَائِيِّ؟

ج1: عبارة عن تغذية تخضع لمقاييس علمية، من حيث الكمية، النوعية، و التي تتغير من شخص إلى آخر حسب الحالة الفيزيولوجية لعضوية الشخص (الجنس، العمر و النشاط البدني).

س2: مَا أَهْمَى قِرَاءَةُ جَدَالِ الْقِيمِ الْغَذَائِيَّةِ عَلَى أَغْلِفَةِ الْمَوَادِ الْغَذَائِيَّةِ؟

ج2: جداول القيم الغذائية تعليمنا بكمية المغذيات و القيمة الطاقوية للمادة الغذائية، فيتمكن الشخص المستهلك من إحداث توازن في نظامه الغذائي، و تسيير وزنه و تحسين صحته.

س3: مَا الْعَوَاقِبُ الَّتِي تَتَجَرَّ مِنْ تَنَاهُلِ أَغْذِيَةٍ ذَاتِ قِيمَةٍ طَاقِوَيَّةٍ أَكْبَرَ مِنْ الطَّاقَةِ الَّتِي نَحْتَاجُهَا؟ وَ مَا عَوَاقِبُ تَنَاهُلِ أَغْذِيَةٍ ذَاتِ قِيمَةٍ طَاقِوَيَّةٍ أَقْلَ مِمَّا نَحْتَاجُهُ؟

ج3:- يؤدي تناول أغذية ذات قيمة طاقوية أكبر مما نحتاج إليه إلى تراكم هذه الأغذية في العضوية وبالتالي زيادة الكتلة الجسمية (زيادة الوزن) أو ربما يصل إلى السمنة. كما سيتسبب ذلك الإصابة بعدة أمراض قلبية ووعائية و السكري.

- أما تناول أغذية ذات قيمة طاقوية أقل من حاجيات عضويتنا، فيؤدي إلى نقص الكتلة الجسمية (نقص الوزن)، أو ربما يمكن أن يصل إلى التحافة . كما يؤدي كذلك في العياء، الدوار، صحة هشة بسبب نقص المغذيات و الذي يسبب أمراض خطيرة .

س4: مَا عَوَاقِبُ الْإِفْرَاطِ فِي التَّغْذِيَةِ: الْبَدَانَةُ (السَّمْنَةُ)، مَا أَسْبَابُهَا، مَا مَظَاهِرُهَا، مَا عَوَاقِبُهَا عَلَى صَحَّةِ الْفَرَدِ؟

ج4:- **أ- أَسْبَابُ الْبَدَانَةِ:** - الإفراط من تناول الأغذية خاصة الطاقوية منها - المكوث المطول أما شاشة الكمبيوتر أو الهاتف مع قلة الحركة البدنية - قلة أو إنعدام النشاط البدني و الرياضي - القضم خارج أوقات الوجبات الغذائية .

ب- مَظَاهِرُ الْبَدَانَةِ: نلاحظ عند الأشخاص المرضى بالبدانة أنه تزايد في عضويتهم عدد الخلايا الدهنية و أبعادها (عدد الخلايا الدهنية كثير و حجمها أكبر)

ج- عَوَاقِبُ الْبَدَانَةِ: *عَوَاقِبُ نَفْسِيَّةٍ: أَنْهِيَارُ عَصَبِيٍّ - فَقْدَانُ تَقْدِيرِ الذَّاتِ*

* عَوَاقِبُ إِجْتِمَاعِيَّةٍ: الإِنْطَوَاءُ، الْعَزْلَةُ

* عَوَاقِبُ فَيْزِيُولُوْجِيَّةٍ: تُسَبِّبُ الْبَدَانَةَ عَدَّةَ أَمْرَاضٍ وَخِيمَةً تَفَاكُّرَ بِصَحَّةِ الْفَرَدِ، ذُكْرُ مِنْهَا: (إِرْتَفَاعُ ضَغْطِ الدَّمِ، الشَّرِيَانِ التَّاجِيِّ، الْفَشْلُ الْقَلْبِيِّ، السَّكْرِيِّ، إِرْتَفَاعُ نَسْبَةِ الْكَوْلِسِتُرُولِ فِي الدَّمِ إلخ .

س5: مَا عَوَاقِبُ التَّفَرِيطِ (النَّقْصِ) مِنْ تَنَاهُلِ الْأَغْذِيَةِ؟

ج5: يمكن أن يكون النقص من حيث كمية الأغذية المتناولة، كما يمكن أن يكون النقص من حيث نوعية الأغذية المتناولة:

أ- عَوَاقِبُ النَّقْصِ الْكَمِيِّ لِلْأَغْذِيَةِ: إضافة إلى الشعور بالعياء و الدوار، يسبب كذلك الإصابة بمرض الهزال (النحافة).

ب- عَوَاقِبُ النَّقْصِ التَّوْعِيِّ لِلْأَغْذِيَةِ: إن نقص أو الإستفقاء عن تناول أي عنصر غذائي سيؤدي حتما إلى الإصابة بمرض معين (كل عنصر غذائي ناقص يسبب الإصابة بمرض معين): * نقص تناول الحديد يسبب مرض فقر الدم * نقص تناول الفيتامين C يسبب مرض الإسقربوط * نقص تناول اليود يسبب مرض السعلة الدرقية * نقص تناول البروتينات الحيوانية يسبب مرض الكواشيوركور .

س6: مَا هِيَ قَوَاعِدُ (شَرُوطُهُ) التَّغْذِيَةِ الْمُتَوَازِنَةِ؟

ج6:- يجب أن يكون الراتب الغذائي متوعدا، كاملا، نظيفا و موزعا في وجبات غذائية منتظمة، مع تجنب القضم المستمر بين الوجبات الرئيسية.

- يجب تدعيم كل وجبة غذائية بالألياف النباتية لتسهيل خروج الفضلات و ذلك تفاديا لمرض الإمساك و البواسير.

- يجب تناول كميات كافية من الماء و الأملاح المعدنية لتعويض ما تم فقدانه عبر التبول و التعرق .

- يجب قراءة تركيب الأغذية من أجل ضمان وجبات غذائية متوازنة

- يجب احترام الصيغة $GPL=421$ من أجل تفادى تناول نوع واحد من الأغذية كالغلوسيدات مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل "البدانة"

- يجب أن تكون كمية الراتب الغذائي المتناول تناسب الحالة الفيزيولوجية للعضوية فهي تتغير حسب: السن، الجنس و النشاط المبذول

- يجب ممارسة النشاط الريادي لتنشيط الدورة الدموية وبالتالي الإستعمال المستمر للمغذيات من أجل إنتاج الطاقة، إضافة إلى تفادي الأمراض القلبية و الوعائية.

س7: مَا نَقْصِدُ بِالصِّيَغَةِ $GPL=421$ ؟

ج7: يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية المتوازنة على: 4 حصص من الغلوسيدات (G)- حصتين (2) من البروتينات (P)- حصة واحدة (1) من الليبيدات (L)