

المقطع 3 : الحساب الحرفي

والمعادلات والمتراجحات من
الدرجة الأولى بمجهول واحد

الأستاذ : نوي عقبة

موقع المذكرة : mathcem.tk

متوسطة الإخوة فرادي الولاجة – بسكرة

2020/2019

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 01	2019/	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..

الميدان : أنشطة عددية

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الموضوع : المتطابقة الشهيرة (1) مربع مجموع

الكافأة المستهدفة: التعرف على التعرّف على المتطابقة الشهيرة الأولى

المرافق	وضعيات المتطابقة	الاهداف				
ما هي الطريقة المتبعة لنشر و تبسيط عبارة من الشكل $(a+b)(c+d)$)	<p>استعد : أحسب ما يلي :</p> $2 \times (9-7) , 3 \times (4+5)$ <p>أنشر ما يلي :</p> $(2x+3)(4+5x) , 3x(4x+5)$ <p>الوضعية التعليمية (2) ص 32 :</p> <p>أ-حساب بطرفيتين كلا من $(3+0,5)^2$ ، $(8+2)^2$ - طريقة 1 : - طريقة 2 :</p> <table border="1"> <tr> <td>$(8+2)^2 = (10)^2 = 10 \times 10 = 100$</td><td>$(8+2)^2 = (8+2)(8+2) = 8 \times (8+2) + 2 \times (8+2) = 8 \times 10 + 2 \times 10 = 100$</td></tr> <tr> <td>$(3+0,5)^2 = (3,5)^2 = 3,5 \times 3,5 = 12,25$</td><td>$(3+0,5)^2 = (3+0,5)(3+0,5) = 3 \times (3+0,5) + 0,5 \times (3+0,5) = 12,25$</td></tr> </table>	$(8+2)^2 = (10)^2 = 10 \times 10 = 100$	$(8+2)^2 = (8+2)(8+2) = 8 \times (8+2) + 2 \times (8+2) = 8 \times 10 + 2 \times 10 = 100$	$(3+0,5)^2 = (3,5)^2 = 3,5 \times 3,5 = 12,25$	$(3+0,5)^2 = (3+0,5)(3+0,5) = 3 \times (3+0,5) + 0,5 \times (3+0,5) = 12,25$	تهيئة
$(8+2)^2 = (10)^2 = 10 \times 10 = 100$	$(8+2)^2 = (8+2)(8+2) = 8 \times (8+2) + 2 \times (8+2) = 8 \times 10 + 2 \times 10 = 100$					
$(3+0,5)^2 = (3,5)^2 = 3,5 \times 3,5 = 12,25$	$(3+0,5)^2 = (3+0,5)(3+0,5) = 3 \times (3+0,5) + 0,5 \times (3+0,5) = 12,25$					
ما هي الطريقة المتبعة لنشر العبارة $(a+b)^2$		وضعية التعلم				
- كيف نحسب مساحة مربع؟	<p>✓ التعبير عن مساحة المربع $MNPQ$ بدلالة طول ضلعه $a+b$:</p> $A_{MNPQ} = (a+b)(a+b) = (a+b)^2$ <p>✓ بإستعمال مساحات الرباعيات :</p> $A_{MNPQ} = A_{MRLV} + A_{LSPT} + A_{RNSL} + A_{VLTQ}$ $A_{MNPQ} = a^2 + b^2 + ab + ab$ $A_{MNPQ} = a^2 + 2ab + b^2$ <p>المساوية الناتجة :</p> $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ <p>ج- إتمام :</p> $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$ <p>العبارة المبسطة للعدد $(a+b)^2$ هي :</p> $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ <p>د- نشر العبارتين :</p> $(2x+3)^2 = (2x)^2 + 2(2x \times 3) + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$	ـ				

هـ - حساب ذهنيا:

$$21^2 = (20+1)^2 = 20^2 + 2(20 \times 1) + 1^2 = 400 + 40 + 1 = 441$$

$$53^2 = (50+3)^2 = 50^2 + 2(50 \times 3) + 3^2 = 2500 + 300 + 9 = 2809$$

حصلة:

a و b عددين حقيقيان، تسمى المساواة :

المتطابقة الشهيرة الأولى $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

أوْظَفْ تَعْلِمَاتِي 9 ص 37

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 02	2019/	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..

الميدان : أنشطة عدديه

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الموضوع : المتطابقة الشهيره (2) مربع فرق

الكافأة المستهدفة: التعرف على التعرّف على المتطابقة الشهيره الأولى

المرافق	وضعيات التعلم	المرافق
التقويم		تهيئة
من يذكرنا بقاعدة مربع مجموع ؟	<p>استعد : مراجعة المتطابقة الشهيره الأولى الوضعية التعليمية (2) ص 32 :</p> <p>(2) مربع فرق :</p> <p>أحساب بطريقتين كلا من $(3-9)^2$</p> <p>- طريقة 1:</p> $(9-3)^2 = 6^2 = 6 \times 6 = 36$ <p>- طريقة 2:</p> $(9-3)^2 = (9-3)(9-3) = 9 \times (9-3) - 3 \times (9-3) = 9 \times 6 - 3 \times 6 = 54 - 18 = 36$ <p>ب- التعبير عن مساحة المربع (1) بدلالة طول ضلعه $a-b$:</p> $A_1 = (a-b)(a-b) = (a-b)^2$ <p>✓ بإستعمال مساحات الرباعيات :</p> <p>مساحة المستطيل (1) هي S_1 :</p> <p>- مساحة المستطيل (2) هي S_2 :</p> $A_1 = A_{KLMN} - (A_2 + S_1 + S_2)$ $A_1 = a^2 - [b^2 + (a-b) \times b + (a-b) \times b]$ $A_1 = a^2 - (b^2 + ab - b^2 + ab - b^2)$ $A_1 = a^2 - 2ab + b^2$ <p>المساوية الناتجة :</p> $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ <p>ج- إتمام :</p> $(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$ <p>العبارة المبسطة للعدد $(a-b)^2$ هي :</p> <p>د- نشر العبارتين :</p> $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$ $(5-2x)^2 = 5^2 - 2(5 \times 2x) + (2x)^2 = 25 - 20x + 4x^2 = 4x^2 - 20x + 25$ <p>هـ - حساب ذهنيا:</p> $19^2 = (20-1)^2 = 20^2 - 2(20 \times 1) + 1^2 = 400 - 40 + 1 = 361$ $37^2 = (40-3)^2 = 40^2 - 2(40 \times 3) + 3^2 = 1600 - 240 + 9 = 1369$	وضعية التعلم

a و b عددين حقيقيين، تسمى المساواة :

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

المتطابقة الشهيرة الثانية

إعادة
الاستثمار

أو ظف تعلماتي مقترح :

$$\begin{aligned} 99^2 &= (100-1)^2 = 100^2 + 1^2 - 2 \times 100 \times 1 \\ &= 10000 + 1 - 200 \\ &= 9801 \end{aligned}$$

أو ظف تعلماتي 13 ص 38

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 03	2019/	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..

الميدان : أنشطة عدديه

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الموضوع : المتطابقة الشهيره (3) جداء مجموع حدّين و فرقهما

الكفاءة المستهدفة: التعرف على التعرّف على المتطابقة الشهيره الثالثة

المرافق	وضعيات التعلم	التدوين
من يذكرنا بقاعدة مربع مجموع ؟	<p>استعد : مراجعة المتطابقة الشهيره الأولى الوضعية التعليمية (2) ص 32 : (3) جداء مجموع حدّين و فرقهما: أ- التعبير عن مساحة المستطيل (1) $a-b$ و $a+b$ ✓ $A_1 = (a+b)(a-b)$ ✓ بدلالة مساحة المربع KLMN و المستطيل (2): $A_1 = A_{KLMN} - A_2$ $A_1 = (a+b)(a+b) - 2b(a+b)$ $A_1 = a^2 + b^2 + 2ab - 2ab - 2b^2$ $A_1 = a^2 - b^2$ المساواة الناتجة : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ $(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2$ $= a^2 - b^2$ ج- نشر العبارتين : $(x-3)(x+3) = x^2 - 3^2 = x^2 - 9$ $(2x-5)(2x+5) = (2x)^2 - 5^2 = 4x^2 - 25$ د- حساب ذهنيا: $95 \times 105 = (100-5)(100+5) = 100^2 - 5^2 = 9975$ ✓ $97^2 - 3^2 = (97-3)(97+3) = 94 \times 100 = 9400$ ✓ حوصلة: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> a و b عددان حقيقيان ، تسمى المساواة : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ </div> </p>	<p>تهيئة</p> <p>وضعية التعلم</p> <p>معارف</p> <p>إعادة الإستثمار</p>

أوّل تعلماتي مقترح :

$$\begin{aligned}
 101 \times 99 &= (100 + 1) (100 - 1) \\
 &= 100^2 - 1^2 \\
 &= 10000 - 1 \\
 &= 9999
 \end{aligned}$$

أوّل تعلماتي 38 ص 17

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 04	2019	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..

الميدان : أنشطة عدديه

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الموضوع : تحليل عبارة جبرية

الكفاءة المستهدفة: التعرف على كيفية كتابة مجموع على شكل جداء يسمى التحليل.

المرافق	وضعيات التعلم	المرافق						
الكتاب	استعد : أحسب ثم قارن : • $3 \times 4 + 3 \times 7$ ؛ $3(4+7)$ • $9 \times 5 - 5 \times 3$ ؛ $5(9-3)$	تهيئة						
الكتاب	الوضعية التعليمية (3) ص 32 :	وضعية التعلم						
الكتاب	<p>1- أ) شرح مافعلته إيمان : و ضعت إيمان العدد 3,5 كعامل مشترك ثم أنجزت الحساب . ب) الحساب :</p> <ul style="list-style-type: none"> $2,9 \times 87 + 2,9 \times 13 = 2,9(87+13)$ $= 2,9 \times 100 = 290$ $2,35 \times 176 - 2,35 \times 76 = 2,35(176-76)$ $= 2,35 \times 100 = 235$ <p>2- كتابة العبارات على شكل جداء :</p> <ul style="list-style-type: none"> $9x + 3 = 3 \times 3x + 3 \times 1 = 3(3x+1)$ $(x-2)(x+4) - 3(x-2) = (x-2)[(x+4)-3]$ $= (x-2)(x+4-3)$ $= (x-2)(x+1)$ $(x-1) - (x-1)^2 = (x-1) \times 1 - (x-1)(x-1)$ $= (x-1)[1 - (x-1)]$ $= (x-1)(1-x+1)$ $= (x-1)(2-x)$ <p>3- نعم تصريح إيمان صحيح</p>	معارف						
الكتاب		إعادة الإستثمار						
	<p>تحليل العبارات :</p> <table border="1"> <tr> <td>$x^2 + 6x + 9 = (x)^2 + 2(x \times 3) + (3)^2 = (x+3)^2$</td> <td>المتطابقة الشهيره 1</td> </tr> <tr> <td>$x^2 - 4x + 4 = (x)^2 - 2(x \times 2) + (2)^2 = (x-2)^2$</td> <td>المتطابقة الشهيره 2</td> </tr> <tr> <td>$x^2 - 16 = (x)^2 - (4)^2 = (x+4)(x-4)$</td> <td>المتطابقة الشهيره 3</td> </tr> </table> <p>الحوصلة :</p> <p>تحليل عبارة جبرية هو كتابتها على شكل جداء</p>	$x^2 + 6x + 9 = (x)^2 + 2(x \times 3) + (3)^2 = (x+3)^2$	المتطابقة الشهيره 1	$x^2 - 4x + 4 = (x)^2 - 2(x \times 2) + (2)^2 = (x-2)^2$	المتطابقة الشهيره 2	$x^2 - 16 = (x)^2 - (4)^2 = (x+4)(x-4)$	المتطابقة الشهيره 3	
$x^2 + 6x + 9 = (x)^2 + 2(x \times 3) + (3)^2 = (x+3)^2$	المتطابقة الشهيره 1							
$x^2 - 4x + 4 = (x)^2 - 2(x \times 2) + (2)^2 = (x-2)^2$	المتطابقة الشهيره 2							
$x^2 - 16 = (x)^2 - (4)^2 = (x+4)(x-4)$	المتطابقة الشهيره 3							

خواص :

باستعمال المتتابقات الشهيرة :

- $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$
- $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$
- $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

التحليل باستعمال الخاصية التوزيعية :

- $ka + kb = k(a+b)$
- $ka - kb = k(a-b)$

أوظف تعلماتي مقترح :

$$\begin{aligned}(2x + 1)(x - 4) + (2x + 1) &= \\&= (2x + 1)[(x - 4) + 1] \\&= (2x + 1)(x - 4 + 1) \\&= (2x + 1)(x - 3) \\x(5x - 2) - 3(5x - 2) &= (5x - 2)(x - 3) ***** &***** \\x^2 - 49 &= x^2 - 7^2 \\&= (x - 7)(x + 7) ***** &***** \\25x^2 - 30x + 9 &= (5x)^2 + 3^2 - 2 \times 5x \times 3 \\&= (5x - 3)^2 ***** &***** \\4 + 49x^2 + 28x &= 2^2 + (7x)^2 + 2 \times 2 \times 7x \\&= (2 + 7x)^2 ***** &*****\end{aligned}$$

أوظف تعلماتي 26 و 27 و 32 ص 39

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 01	2019/	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..

الميدان : أنشطة عدديه

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد
الموضوع: المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد .

الكفاءة المستهدفة: التعرف على كيفية حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد.

المرافق	وضعيات التعلم	التفوييم																								
تهيئة	<p>استعد 1 ص 43 : الوضعية التعليمية (1) ص 44 : 1-تحقق عند اختيار العدد 2 في البداية :</p> <table border="1"> <tr> <td>2</td><td>❖ اختر عددا</td></tr> <tr> <td>$2 \times 3 + 2$</td><td>❖ اضربه في 3 و أضف 2</td></tr> <tr> <td>8×3</td><td>❖ اضرب الناتج في 3</td></tr> <tr> <td>$24 - 5$</td><td>❖ اطرح 5</td></tr> <tr> <td>19</td><td>❖ أعلن الناتج</td></tr> </table> <p>2-تبين أن عند اختيار العدد x في البداية :</p> $(3x + 2) \times 3 - 5$ $= 9x + 6 - 5$ $= 9x + 1$ <p>3-العدد الذي اختاره كل من :</p> <table> <tr> <td>فاطمة :</td> <td>$9x + 1 = -26$</td> </tr> <tr> <td>مصطفى :</td> <td>$9x + 1 = 2x$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$9x - 2x = -1$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$7x = -1$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$x = \frac{-1}{7}$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$9x = -27$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$x = \frac{-27}{9} = -3$</td> </tr> </table>	2	❖ اختر عددا	$2 \times 3 + 2$	❖ اضربه في 3 و أضف 2	8×3	❖ اضرب الناتج في 3	$24 - 5$	❖ اطرح 5	19	❖ أعلن الناتج	فاطمة :	$9x + 1 = -26$	مصطفى :	$9x + 1 = 2x$		$9x - 2x = -1$		$7x = -1$		$x = \frac{-1}{7}$		$9x = -27$		$x = \frac{-27}{9} = -3$	كيف نحل معادلة من الدرجة الأولى و بمجهول واحد
2	❖ اختر عددا																									
$2 \times 3 + 2$	❖ اضربه في 3 و أضف 2																									
8×3	❖ اضرب الناتج في 3																									
$24 - 5$	❖ اطرح 5																									
19	❖ أعلن الناتج																									
فاطمة :	$9x + 1 = -26$																									
مصطفى :	$9x + 1 = 2x$																									
	$9x - 2x = -1$																									
	$7x = -1$																									
	$x = \frac{-1}{7}$																									
	$9x = -27$																									
	$x = \frac{-27}{9} = -3$																									
معارف	<p>حصلة:</p> <p>يؤول حل كل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد إلى حل معادلة من الشكل : $ax = b$ حيث $a \neq 0$</p> <p>الحل الوحيد لهذه المعادلة هو العدد :</p> $\frac{b}{a}$																									

مثال :

واجب منزلي
ص 50 7

$$4x - 3 = 2x + 6$$

$$4x - 2x = 6 + 3$$

$$2x = 9$$

$$x = \frac{9}{2}$$

العدد $\frac{9}{2}$ هو الحل الوحيد للمعادلة: 6

أو ظف تعلماتي 4 ص 50

$$2x - 3 = 3x + 1$$

-2

$$5x + 6 = 11$$

-1

$$2x - 3x = 1 + 3$$

$$5x = 11 - 6$$

$$-x = 4$$

$$5x = 5$$

$$x = 4$$

$$x = \frac{5}{5} = 1$$

إعادة
الاستثمار

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 02	2019/	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..

الميدان : أنشطة عدديه

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الموضوع: الجداء المعدوم

الكفاءة المستهدفة: التعرف على معادلة الجداء المعدوم وحلها .

المرافق	وضعيات التعلم	التفوييم										
تهيئة	<p>استعد 2 ص 43 :</p> <p>الجاء المعدوم :</p> <p>1- إكمال مايلي :</p> <p>$2 \times 0 = 0$ ، $0 \times \sqrt{3} = 0$ ، $-\frac{3}{7} \times 0 = 0$ ، $0 \times 5 = 0$ ، $2 \times 0 = 0$</p> <p>2- a و b عددان ، إذا كان $a \times b = 0$ فإن : $a = 0$ أو $b = 0$.</p> <p>3- تعبير لغوي عن خاصية الجداء المعدوم:</p> <p>جداء عاملين معدوم يعني أحد هذين العاملين على الأقل معدوم</p>	<p>كيف نحل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد</p> <p>ما معنى جداء معدوم</p> <p>ما معنى معادلة جداء معدوم ؟</p> <p>كيف نحل معادلة جداء معدوم ؟</p>										
وضعية التعلم	<p>حل معادلة من الشكل : $(ax+b)(cx+d) = 0$</p> <p>1- أمين يستعمل الجداء المعدوم ، أما بالنسبة لإلياس فإنه استعمل التشر</p> <p>2- حل المعادلة : $-1,2(3x+2,7) = 0$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>طريقة أمين</th> <th>طريقة إلياس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$-1,2(3x+2,7) = 0$</td> <td>$-1,2(3x+2,7) = 0$</td></tr> <tr> <td>بما أن : $-1,2 \neq 0$</td> <td>$-3,6x - 3,24 = 0$</td></tr> <tr> <td>فإن $3x + 2,7 = 0$</td> <td>$-3,6x = 3,24$</td></tr> <tr> <td>ومنه $x = -\frac{2,7}{3,6} = -0,9$</td> <td>$x = -\frac{3,24}{3,6} = -0,9$</td></tr> </tbody> </table>	طريقة أمين	طريقة إلياس	$-1,2(3x+2,7) = 0$	$-1,2(3x+2,7) = 0$	بما أن : $-1,2 \neq 0$	$-3,6x - 3,24 = 0$	فإن $3x + 2,7 = 0$	$-3,6x = 3,24$	ومنه $x = -\frac{2,7}{3,6} = -0,9$	$x = -\frac{3,24}{3,6} = -0,9$	<p>$(x-2)(x+5) = 0$</p> <p>$x = 2$ أي $x-2 = 0$ ومنه $(x-2)(x+5) = 0$</p> <p>أو $x+5 = 0$ أي $x = -5$ ومنه للمعادلة حلان هما 2 و -5</p> <p>حصلة:</p> <p>لحل المعادلة من النوع $(ax+b)(cx+d) = 0$ حيث أن a و b و c و d أعداد حقيقة معلومة نحل المعادلتين : $ax+b = 0$ و $cx+d = 0$</p>
طريقة أمين	طريقة إلياس											
$-1,2(3x+2,7) = 0$	$-1,2(3x+2,7) = 0$											
بما أن : $-1,2 \neq 0$	$-3,6x - 3,24 = 0$											
فإن $3x + 2,7 = 0$	$-3,6x = 3,24$											
ومنه $x = -\frac{2,7}{3,6} = -0,9$	$x = -\frac{3,24}{3,6} = -0,9$											
إعادة	معارف											

أو ظف تعلماتي مقتراح :

$$x = 3 \quad \text{أي} \quad x - 3 = 0 \quad \text{ومنه} \quad (x - 3)(x + 1) = 0 *$$

$$x = -1 \quad \text{ومنه} \quad x + 1 = 0$$

ومنه للمعادلة حلان هما 3 و -1

أو ظف تعلماتي 14 ص 50

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 03	2019/	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..

الميدان : أنشطة عدديه

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الموضوع: المعادلة التي تؤول إلى الجداء المعدوم

الكفاءة المستهدفة: توظيف التحليل في حل معادلات التي تؤول إلى الجداء المعدوم

المرافق	وضعيات التعلم	الاهداف
ماهي الخطوات المتبعة لحل معادلة جداء ؟	<p>استعد 5 ص 43 : حل معادلة يؤول لها إلى حل معادلة جداء معدوم:</p> <p>الوضعية التعليمية (2) ص 44 :</p> <p>ب / التحقق من أن : $(1-4x)(x+3) + 7(x+3) = (x+3)(8-4x)$</p> <p>نقوم بتحليل العبارة : $(1-4x)(x+3) + 7(x+3) = (x+3)[(1-4x) + 7]$</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $(1-4x)(x+3) + 7(x+3) = (x+3)(1-4x+7)$ ▪ $(1-4x)(x+3) + 7(x+3) = (x+3)(1-4x+7)$ ▪ $(1-4x)(x+3) + 7(x+3) = (x+3)(8-4x)$ <p>- حل المعادلة (E) :</p> $x = -3 \quad \text{إما} \quad x+3 = 0 \quad \text{أي} \quad x = 2 \quad \text{أو} \quad 8-4x = 0 \quad \text{أي} \quad \text{المعادلة (E) لها حلان هما -3 و 2}$	تهيئة
ماهي الخطوات المتبعة لحل معادلة ليست من الدرجة الأولى ؟	<p>حوصلة:</p> <p>لحل معادلة ليست من الدرجة الأولى نتبع الخطوات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - نقوم بتحليل الطرف الأيسر لهذه المعادلة ، نتحصل عنده على معادلة جداء معدوم من الدرجة الأولى . - نحل المعادلة الأخيرة . - نستنتج حلول المعادلة الأولى 	وضعية التعلم
	<p>أوifice تعليمي مقترح :</p> <p>حل المعادلة $(x+1)^2 - 25 = 0$</p> <p>تحليل العبارة $(x+1)^2 - 25$</p> $(x+1)^2 - 25 = (x+1)^2 - 5^2$ $= [(x-1)+5][(x+1)+5]$	إعادة الإستثمار

$$\begin{aligned} &= (x + 1 - 5)(x + 1 + 5) \\ &= (x - 4)(x + 6) \\ (3) \text{ حل المعادلة } &= 0 \\ x = -6 \text{ أو } x = 4 \text{ أو } x = 0 &\text{ أي } x - 4 = 0 \\ \text{المعادلة لها حلان هما } &4 \text{ و } -6 \end{aligned}$$

أوْظَفْ تَعْلِمَاتِي 19 ص 51

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 04	2019/	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..

الميدان : أنشطة عدديه

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الموضوع : المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الكفاءة المستهدفة: التعرف على كيفية حل مشكل باستعمال المتراجحات

المرافق	وضعيات التعلم	التفوييم
تهيئة	<p>استعد:</p> <p>الوضعية التعليمية (3) ص 45 :</p> <p>1- يمكن يونس القيام بارسال : 20 رسالة و 16 رسالة .</p> <p>2- المتباعدة التي توافق رغبة يونس هي : $2,5x + 100 \leq 150$</p> <p>ب- اقتراح قيمة x توافق رغبة يونس :</p> <ul style="list-style-type: none"> هي كل قيم x الأصغر أو تساوي 20 أي: $x \leq 20$ اقتراح قيمة x لاتوافق رغبة يونس : <p>هي كل قيم x الأكبر تماما من 20 أي : $x > 20$</p> <p>ج- من أجل $x = 2$ لدينا $2,5x + 100 \leq 150$</p> $2,5 \times 2 + 100 \leq 150$ $105 \leq 150$ <p>المتباعدة صحيحة ومنه 2 حل للمتراجحة .</p> <p>من أجل $x = 21$:</p> $2,5 \times 21 + 100 \leq 150$ $152 \leq 150$ <p>المتباعدة خاطئة ومنه 21 ليس حل للمتراجحة .</p> <p>وصلة:</p> <p>المتراجحة بمجهول واحد x هي متباعدة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة و هذا حسب قيم x .</p> <p>قيمة x التي من أجلها تكون المتباعدة صحيحة هي حلول المتراجحة</p>	<p>ما هي المتباعدة؟</p> <p>إذا أضفنا أو طرحنا نفس العدد من طرف في متباعدة هل المتباعدة تتغير ؟</p> <p>إذا ضربنا أو قسمنا طرف في متباعدة في أو (على) عدد موجب هل المتباعدة تتغير ؟</p> <p>إذا ضربنا أو قسمنا طرف في متباعدة في أو (على) عدد سالب هل المتباعدة تتغير ؟</p>
وضعية التعلم	<p>أو اوظف تعلماتي 22 ص 51</p> <p>أو اوظف تعلماتي 25 ص 51 سؤال الأول فقط</p>	
معارف		

واجب منزلي
50 ص 7

بطاقة فنية	عقبة نوي	أستاذ المادة	الرابعة	المستوى
رقم : 05	2019/	السنة الدراسية	رياضيات	المادة

الداعم : ك.المدرسي + و.المرافقه ..


الميدان : أنشطة عددية

المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد
الموضوع : حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد و تمثيل حلولها على مستقيم عددي مدرج.
الكفاءة المستهدفة: التعرف على كيفية حل متراجحة و تمثيل حلولها .


المراحل	وضعيات التعلم	التفوييم													
تهيئة	<p>استعد:</p> <p>الوضعية التعليمية (3) ص 45 : حل متراجحة :</p> <p>ما هي الخطوات المتبعة لحل متراجحة من الدرجة الأولى ذات مجهول ؟</p> <p>ما هي الخطوات المتبعة في تمثيل مجموعة حلول متراجحة بيانيا ؟</p> <p>الخطوة 1 : نطرح 5 من طرفى المتراجحة :</p> $-3x + 5 \leq 20$ <p>الخطوة 2 : نقسم على -3 مع تغيير اتجاه المتراجحة :</p> $x \geq -5$ <p>2- اتمام السطر الأخير :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المراجحة</th> <th>حلول المتراجحة لغريا</th> <th>الممثل البياني لحلولها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$-3x + 5 \leq 20$</td> <td>كل قيم x الأكبر من أو تساوي -5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>وصلة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حل متراجحة هو ايجاد كل القيم الممكنة للمجهول حتى تكون المتباينة صحيحة . هذه القيم هي حلول المتراجحة <p>ملاحظة :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ حل متراجحة تتبع نفس خوارزمية حل معادلة مع مراعاة خواص المتعلقة بضرب أو قسمة طرفى المتباينة في عدد سالب . 	المراجحة	حلول المتراجحة لغريا	الممثل البياني لحلولها	$-3x + 5 \leq 20$	كل قيم x الأكبر من أو تساوي -5		<p>الخطوة 1 : نطرح 5 من طرفى المتراجحة :</p> $-3x + 5 \leq 20$ <p>الخطوة 2 : نقسم على -3 مع تغيير اتجاه المتراجحة :</p> $x \geq -5$ <p>2- اتمام السطر الأخير :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المراجحة</th> <th>حلول المتراجحة لغريا</th> <th>الممثل البياني لحلولها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$-3x + 5 \leq 20$</td> <td>كل قيم x الأكبر من أو تساوي -5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>وصلة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حل متراجحة هو ايجاد كل القيم الممكنة للمجهول حتى تكون المتباينة صحيحة . هذه القيم هي حلول المتراجحة <p>ملاحظة :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ حل متراجحة تتبع نفس خوارزمية حل معادلة مع مراعاة خواص المتعلقة بضرب أو قسمة طرفى المتباينة في عدد سالب . 	المراجحة	حلول المتراجحة لغريا	الممثل البياني لحلولها	$-3x + 5 \leq 20$	كل قيم x الأكبر من أو تساوي -5		<p>الميدان : أنشطة عددية</p> <p>المقطع التعليمي 3: الحساب الحرفي و المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد الموضوع : حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد و تمثيل حلولها على مستقيم عددي مدرج. الكفاءة المستهدفة: التعرف على كيفية حل متراجحة و تمثيل حلولها .</p>
المراجحة	حلول المتراجحة لغريا	الممثل البياني لحلولها													
$-3x + 5 \leq 20$	كل قيم x الأكبر من أو تساوي -5														
المراجحة	حلول المتراجحة لغريا	الممثل البياني لحلولها													
$-3x + 5 \leq 20$	كل قيم x الأكبر من أو تساوي -5														
إعادة الإستثمار															

□ تمثل حلول المتراجحة على مستقيم عددي .

حلول المتراجحة $x > a$ تمثل بيانا :



حلول المتراجحة $x \leq a$ تمثل بيانا :



واجب منزلي
7 ص 50