

## "الجزء الثاني" الاستجابة المناعية

**الخط الدفاعي الأول:** تمثله الحاجز الطبيعية التي تعمل على منع الأجسام الغريبة من غزو العضوية، وتصنف إلى نوعين:  
**ال الحاجز المكانكية:** تثبت وتمتنع دخول الأجسام الغريبة للعضوية مثل: الجلد، الأهداب، الرموش...

**ال الحاجز الكيميائي:** تفرز مواد محللة (تقضى) على الأجسام الغريبة مثل: الدموع، اللعاب، المخاط، الحمض المعدي....  
**الجسم الغريب:** كل عنصر دخيل قادر على تحريض إستجابة مناعية عند دخوله للعضوية.

**الميكروبات:** كائنات حية مجهرية (لا ترى بالعين المجردة) منها الضارة (مرضية) والنافعة (غير مرضية) ومن أنواعها: البكتيريات، الفيروسات، الطفيليات وحيدة الخلية والفطريات المجهرية.

ميكروبات ممراضة	ميكروبات غير ممراضة
بكتيريا القولون-فطر	عصيات كوك-فيروس
كورونا-البنسيليوم	الخميرة-البنسيليوم

-تميز الميكروبات بقدرتها على التكاثر السريع وذلك عند توفر الظروف المناسبة من: حرارة، غذاء، رطوبة كما تتميز بقدرتها على غزو العضوية بعد إخراق الخط الدفاعي الأول.


بعد إخراق الخط الدفاعي الأول إما طبيعياً (على مستوى المجرى التنفسية والهضمية) أو بسبب حادث (جرح، خروج شوكة، لدغة...) تتجدد العضوية إستجابة محلية فورية في منطقة الإصابة تتميز بالأعراض التالية: الإحمرار - الإنتفاخ - الحرارة - الشعور بالألم وتشكل القرح وتعرف هذه الاستجابة المناعية **بالتفاعل الالتهابي** الذي يمثل الخط الدفاعي الثاني للعضوية.

### مراحل حدوث الاستجابة الالتهابية:

- إخراق الجسم الغريب الخط الدفاعي الأول، تكاثره السريع وبداية غزوه للعضوية.
- تمدد الشعيرات الدموية، وخروج البلازما.
- إنسلاط نوع من كريات الدم البيضاء (البلعميات) عبر جدران

الشعيرات الدموية لتحاصر الميكروبات في منطقة الإصابة ويتم القضاء عليها بعملية البلعمة.

**البلعمة:** عملية تقوم بها البلعميات من أجل القضاء على العناصر الغريبة وتم وفق المراحل التالية:  
**الإنجداب والإلتصاق - الإحاطة - البلع - الهضم والإطراح.**



### تعرف الاستجابات المناعية للخطين الدفاعيين الأول والثاني:

**بالإستجابة المناعية اللا النوعية** لأنها فيها يتم القضاء على العناصر الغريبة دون تخصيص (تحدث لكل الأجسام الغريبة).

- عند فشل الخط الدفاعي الثاني تجأ العضوية إلى **خط دفاعي**

**ثالث** يتدخل فيه نوع من كريات الدم البيضاء تعرف **بالمقاويات**

وهي نوعان: مقاويات بائية "LB" - مقاويات تائية "LT"

### مصطلحات هامة:

**مولد الضد مستضد:** كل جسم غريب يؤدي لتحريض إستجابة مناعية ضده عند دخوله للعضوية.

**جسم مضاد:** مادة خلطية تسري في أخلاط العضوية - الدم واللمف - تنتجه المقاويات البائية.

**آلية تعرف المقاويات على مولد الضد:** تتعزز المقاويات على مولدات الضد نتيجة وجود تكامل بيني بين المستقبلات الغشائية للمقاويات ومحدد مولد الضد.


- تعرف الإستجابة التي تتدخل فيها المقاويات **بالإستجابة المناعية النوعية** لأنها تخص مولد ضد محدد وهي نمطان:  
**الاستجابة المناعية النوعية الخلطية:** تتدخل فيها المقاويات البائية، حيث بعد تعرفها على مولد الضد تتكاثر ثم تتميز إلى مقاويات منتجة لأجسام مضادة نوعية "LB<sub>m</sub>" تخص مولد الضد الذي حرض على إنتاجها ولمقاويات بائية ذات ذاكرة LB<sub>m</sub> تتدخل بسرعة عند دخول نفس مولد الضد مرة أخرى.

**الاستجابة المناعية النوعية الخلوية:** تتدخل فيها المقاويات التائية، بعد تعرفها على الخلايا المصابة تتكاثر ثم تتميز إلى مقاويات سامة "LT<sub>m</sub>" التي تخرب الخلايا المصابة (بواسطة مواد كيميائية)، ولمقاويات ذات ذاكرة LT<sub>m</sub> تتدخل بسرعة عند دخول نفس مولد الضد مرة أخرى.

**- خصائص الاستجابة المناعية النوعية:** متخصصة - تشكل ذاكرة مناعية - بطيئة - قابلة للنقل.

**- المعقد المناعي:** ارتباط نوعي بين جسم مضاد - مولد ضد.

**أهميته:** إبطال مفعول مولد الضد (منع تكاثره وانتشاره) وتسهيل القضاء عليه من طرف البلعميات.



(مجموع الخلايا التي لها محددات مماثلة لمحددات العضوية) فيتم قبولها أثناء عمليات النقل" مثل (نقل الدم أو زرع الطعوم الجلدية).

## اللقالات والأمصال:

-التلقق: هو حقن شخص بميكروب أو سم غير فعال مما يكسب العضوية مناعة ضد الأمراض لمدة طويلة قادرة على رد فعل سريع وقوى عند التماس الثاني مع نفس الميكروب.

-العلاج بالمصل: حقن المريض بمصل يحوي أجسام مضادة جاهزة ونوعية تعدل مولد الضد وتحمي الجسم لفترة قصيرة.

## المقارنة بين خصائص كل من المصل واللقال:


المصل	اللقال
مفعول نوعي	مفعول نوعي
نقل مناعة	إكتساب مناعة نشطة
مناعة منقولة فوراً	مناعة مكتسبة ببطء
مفعول مؤقت (عدة أسابيع)	مفعول طويل المدى (عدة شهور أو عدة سنوات)
يستعمل للعلاج	يستعمل للوقاية

وبين اللذات وهي: (مجموع الخلايا التي لها محددات غير مماثلة لمحددات العضوية) فيتم رفضها عند النقل.

الزمر الدموية: تحدد الزمر الدموية على حسب مولدات الضد المحمولة على أغشية كريات الدم الحمراء على النحو التالي:  
حسب نظام الـ ABO: يوجد مولدي ضد A و B يحددان نوع الزمر (A-B-AB-O) كما هو موضح في الجدول التالي:

مكوناتها	الزمرة
المصل (الأجسام المضادة)	كريات الدم الحمراء (مولد ضد)
B مضاد	A مولد ضد
A مضاد	B مولد ضد
لا شيء	A/B مولد ضد
A/B مضاد	لا شيء
	O

حسب نظام الريزوس Rh: يحدد الزمرة الموجبة والسلبية (وجود مولد الضد D يعني أن الزمرة موجبة)  
نقل الدم: ليكون النقل ناجحا يجب تجنب حدوث إرتصاص بين الشخص المتبرع والشخص المستقبل.



مخطط نقل الدم حسب نظامي ال ABO و الريزوس

- تدعى الزمرة O بالمعطي العام لأنها تعطي الدم لكل الزمر.
- تدعى الزمرة AB بالمستقبل العام لأنها تستقبل الدم من كل الزمر الأخرى.


الحساسية: إستجابة مناعية مفرطة تجاه عوامل غير ضارة تدعى بالمحسّسات متواجدة في محيط الإنسان مثل: الغبار-حبوب الطلع-بعض الأغذية-أدوية.....

-بعض أعراض الحساسية: الطفح الجلدي-التهاب الأنف-الربو- العطس المتكرر ...

## مراحل حدوث الحساسية:

مرحلة التحسس (التماس الأول مع المحسس): عند دخوله للعضوية تتعرف عليه المقاوميات البائية كمولد ضد و تنتج له أجسام خاصة نوعية تدعى IgE تثبت على الخلايا الصاربة وتحرضها على إنتاج الهيستامين الذي يبقى داخل حويصلات.

مرحلة الإستجابة (التماس الثاني مع نفس المحسس): عند دخوله للعضو مرة أخرى يرتبط مع الأجسام المضادة IgE المثبتة على أغشية الخلايا الصاربة فتفرز الهيستامين (مادة كيميائية) يؤدي لظهور أعراض الحساسية.



## بعض الإجراءات لتجنب الحساسية:

- الإبتعاد عن كل مسببات الحساسية، إرتداء كمامات، التنظيف الدوري للأفرشة، حقن مسبب الحساسية بجرعات متزايدة حتى تتكيف العضوية معه، حقن مضادات للهيستامين.

من إنجاز الأستاذ: سعدي محمد الوزين