

I. الشاردة والمحلول الشاردي:


- الأجسام الصلبة الجزيئية ومحاليلها غير ناقلة للتيار الكهربائي مثل السكر صلب أو محلوله غير ناقل للتيار الكهربائي.
- الأجسام الصلبة الشاردية غير ناقلة للتيار الكهربائي بينما محاليلها ناقلة للتيار الكهربائي مثل ملح الطعام NaCl
- المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي بينما محلول الجزيئي غير ناقل للتيار.
- المحلول الشاردي متعادل كهربائياً... أمثلة: $(\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-)$, $(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$, $(\text{Na}^+ + \text{Cl}^-)$
- الشاردة هي ذرة اكتسبت أو فقدت إلكتروناً أو أكثر، وهي نوعان:
 - شاردة موجبة وهي ذرة فقدت إلكتروناً أو أكثر و يمكن ان تكون بسيطة أو مركبة مثل: Zn^{2+} , Sn^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , $\text{.....}, \text{Na}^+$, Ag^+ , Al^{3+} , Fe^{3+} , NH_4^+
 - شاردة سالبة وهي ذرة اكتسبت إلكتروناً أو أكثر و يمكن ان تكون بسيطة أو مركبة مثل: Cl^- , F^- , O^{2-} , NO_3^- , OH^- , $\text{.....}, \text{SO}_4^{2-}$, CO_3^{2-} ,

❖ الكشف عن بعض الشوارد:

اسم ورمز الشاردة	الكلور Cl^-	الألミニوم Al^{3+}	الحديد الثاني Fe^{2+}	الحديد الثلاثي Fe^{3+}	النحاس Cu^{2+}	الزنك Zn^{2+}	ال الكبريتات SO_4^{2-}	الكريبونات CO_3^{2-}
نترات الفضة $(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)$	الكافش	هيدروكسيد الصوديوم $(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)$	كلور الباريوم $(\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$	حمض كلور الماء $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$				
الملاحظة (لون وصيغة الراسب)	راسب أبيض AgCl	راسب أحمر Fe(OH)_3	راسب أخضر Fe(OH)_2	راسب أزرق Cu(OH)_2	راسب أبيض Zn(OH)_2	راسب أبيض BaSO_4	انطلاق غاز CO_2	حمض كلور الماء $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$

II. التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي:

يمر التيار الكهربائي في محلول الشاردي نتيجة هجرة الشوارد المتواجدة فيه حيث تتنقل الشوارد الموجبة نحو المهدب (-) وتتنقل الشوارد السالبة نحو المصعد (+).



- تنتج شوارد الكلور Cl^- السالبة نحو المصعد (+) لتخلي كل منها على إلكترون واحد فتصبح ذرة للكلور، ثم تتحدد كل ذرتين لتشكل جزيء غاز الكلور Cl_2 .
- تنتج شوارد "المعدن" الموجبة نحو المهدب (-) لاكتسب كل منها إلكتروناتها الناقصة لتصبح ذرات (ترسب معدن).


التحليل الكهربائي البسيط

المعادلة الإجمالية	عند المهدب	عند المصعد	المحلول الشاردي
غاز الكلور + ترسب المعدن \rightarrow كلور معدن	ترسب المعدن	غاز الكلور	كلور معدن
$(\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$(\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$
$(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Sn}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$	$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Sn}$	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$
$(\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$(\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$
$(\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Fe}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$(\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$
$2(\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow 2\text{Fe}_{(\text{s})} + 3\text{Cl}_{2(\text{g})}$	$2\text{Fe}^{3+} + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Fe}$	$6\text{Cl}^- \rightarrow 3\text{Cl}_2 + 6\text{e}^-$	$(\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-)$
غاز الكلور + غز الهيدروجين \rightarrow حمض كلور الماء	غاز الهيدروجين	غاز الكلور	حمض كلور الماء
$2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$
$2(\text{Na}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow 2\text{Na}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$	$2\text{Na}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Na}$	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$(\text{Na}^+ + \text{Cl}^-)$

III. التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية

تذكير

الفرد الكيميائي: تدعى كل حبيبات المادة المجهرية (الغير مرئية بالعين المجهرة) أفرادا كيميائية مثل الذرة، الجزيء، الشاردة، النواة، الإلكترون ...
النوع الكيميائي: تدعى مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة (المرئية بالعين) أنواعا كيميائية مثل كمية من الماء، غاز الأكسجين...
محلول الكلور الحديد الثنائي + غاز الهيدروجين + **الحديد** مثال



(1) تفاعل محلول حمضي مع معدن:
تفاعل حمض كلور الماء مع معدن:

المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)	المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية	تفاعل حمض كلور الماء مع معدن: ↓ (H ⁺ +Cl ⁻)
Fe _(s) + 2HCl _(aq) → H _{2(g)} + FeCl _{2(aq)}	Fe _(s) + 2(H ⁺ +Cl ⁻) _(aq) → H _{2(g)} + (Fe ²⁺ +2Cl ⁻) _(aq)	الحديد
Zn _(s) + 2HCl _(aq) → H _{2(g)} + ZnCl _{2(aq)}	Zn + 2(H ⁺ +Cl ⁻) _(aq) → H _{2(g)} + (Zn ²⁺ +2Cl ⁻) _(aq)	الزنك
Sn _(s) + 2HCl _(aq) → H _{2(g)} + SnCl _{2(aq)}	Sn + 2(H ⁺ +Cl ⁻) _(aq) → H _{2(g)} + (Sn ²⁺ +2Cl ⁻) _(aq)	القصدير
2 Al _(s) + 6HCl _(aq) → 3 H _{2(g)} + 2AlCl _{3(aq)}	2Al _(s) + 6(H ⁺ +Cl ⁻) _(aq) → 3H _{2(g)} + 2 (Al ³⁺ +3Cl ⁻) _(aq)	الألومنيوم Al
" لاتفاعل مع حمض كلور الماء (H ⁺ +Cl ⁻)"		النحاس Cu ، الذهب Au والفضة Ag

ملاحظة 1: غاز الهيدروجين H₂ يحدث فرقعة خفيفة مع لهب أزرق عند تقريره من لهب النار " وهي طريقة الكشف عنه."

(2) تفاعل محلول ملح مع معدن (تفاعل شاردة مع معدن):


- تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن:

المعادلة الكيميائية بالصيغتين الشاردية والجزئية (الإحصائية)	المعادلة الكيميائية للأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط	تفاعل ملح مع معدن: ↓
Fe _(s) + (Cu ²⁺ +SO ₄ ²⁻) _(aq) → Cu _(s) + (Fe ²⁺ + SO ₄ ²⁻) _(aq) Fe _(s) + CuSO _{4(aq)} → Cu _(s) + FeSO _{4(aq)}	Fe _(s) + Cu ²⁺ _(aq) → Cu _(s) + Fe ²⁺ _(aq)	كبريتات النحاس مع الحديد
Zn _(s) + (Cu ²⁺ +SO ₄ ²⁻) _(aq) → Cu _(s) + (Zn ²⁺ + SO ₄ ²⁻) _(aq) Zn _(s) + CuSO _{4(aq)} → Cu _(s) + ZnSO _{4(aq)}	Zn _(s) + Cu ²⁺ _(aq) → Cu _(s) + Zn ²⁺ _(aq)	كبريتات النحاس مع الزنك
2 Al _(s) + 3(Cu ²⁺ +SO ₄ ²⁻) _(aq) + → 3 Cu _(s) +(2Al ³⁺ +3SO ₄ ²⁻) _(aq) 2 Al _(s) + 3CuSO _{4(aq)} → 3 Cu _(s) + Al ₂ (SO ₄) _{3(aq)}	2 Al _(s) + 3Cu ²⁺ _(aq) → 3 Cu _(s) + 2Al ³⁺ _(aq)	كبريتات النحاس مع الألومنيوم

ملاحظة 2: - تأكل الجزء المغمور في محلول الشاردي - ترسب معدن على الجزء المغمور - اختفاء أو تغير لون محلول الشاردي.

(3) تفاعل محلول حمضي مع ملح (تفاعل حمض كلور الماء (H⁺+Cl⁻) مع ملح كربونات الكالسيوم (CaCO₃)

نجد كربونات الكالسيوم (CaCO₃) في الطباشير، رخام ، الكلس (الجير).....
المعادلة الكيميائية: كلور الكالسيوم + الماء + ثاني أكسيد الكربون → حمض كلور الماء + كربونات الكالسيوم



ملاحظة 3: ثاني أكسيد الكربون CO₂ يعكس رائق (ماء) الكلس وهي طريقة الكشف عنه.